

临床护士应知应会及三基理论知识测试题与答案

1、营养性巨幼细胞贫血, 缺乏最多的物质是()

- A、内因子
- B、蛋白质
- C、铁剂
- D、维生素 B12
- E、叶酸

答案: E

2、下列关于提示上消化道大量出血病人出血在继续的描述不正确的是:()

- A、黑便次数增多
- B、呕吐物为鲜红色
- C、血压继续下降
- D、血红蛋白计数继续下降
- E、网织红细胞计数继续下降

答案: E

3、对成人进行心肺复苏时胸外心脏按压的正确部位是()

- A、胸骨中上 1/3 交界处
- B、胸骨中下 1/3 交界处
- C、胸骨上段
- D、胸骨右侧
- E、心尖区

答案: B

4、曾某, 男, 55 岁。1 年内出现 3 次突然说话不流利, 每次持续 30 分钟左右, 第 3 次发作时伴右侧肢体麻木, 神经系统检查正常, 有动脉硬化病史 2 年。最可能的诊断是()

- A、癫痫部分性发作
- B、偏头痛
- C、颈椎病
- D、顶叶肿瘤
- E、短暂性脑缺血发作

答案: E

5、下述皮试剂量(0.1ml 内含量)叙述错误的是

- A、TAT 15U
- B、普鲁卡因 0.25mg
- C、青霉素 20~50U

- D、链霉素 250U
- E、细胞色素 C 0.75mg

答案：E

6、陈先生,42岁,因持续中上腹疼痛6小时急诊入院。体格检查:T38℃,P90次/分,R24次/分,BP105/75mmHg,上腹部有压痛,腹痛向腰背部放射。辅助检查:血清白细胞计数 $12.0 \times 10^9/L$,血清淀粉酶1020U/dl(Somogyi法),尿淀粉酶220U/dl(Somogyi法),血清钙2.5mmol/L,血糖12.0mmol/L。病人既往有乙型肝炎、胆囊结石病史。临床初步诊断为急性胰腺炎。该病人发生急性胰腺炎最可能的病因是()

- A、暴饮暴食
- B、高脂血症
- C、过量饮酒
- D、胆道疾病
- E、胰腺外伤

答案：D

7、禁用高压蒸汽灭菌的物品是()

- A、化纤织物
- B、金属类
- C、搪瓷类
- D、棉织品
- E、橡胶类

答案：A

8、患者,男,40岁,因外伤导致左下肢毁损伤,予以急诊截肢手术,截肢术后安装假肢时间为()

- A、术后1周
- B、术后即装临时假肢
- C、术后15天
- D、术后20天
- E、术后1个月

答案：B

9、病人,女,55岁。行甲状腺大部切除手术后,出现失声、呼吸困难,是因为手术损伤了()

- A、单侧喉返神经
- B、双侧喉返神经
- C、喉上神经内支

D、喉上神经外支

E、甲状旁腺

答案：D

10、有关尿液检查正确的是()

A、镜下血尿>3个红细胞/高倍视野

B、镜下脓尿>3个白细胞/高倍视野

C、管型不可含有细胞

D、正常成人尿量为500~1000ml/24h

E、尿液一般为弱碱性

答案：A

11、患者有自杀倾向时,应立即采取的措施不包括()

A、报告主管医生

B、报告科主任、护士长

C、没收锐利的物品、锁好门窗

D、报告保卫科

E、及时与家属沟通

答案：D

12、大面积烧伤后2天内,最主要的全身改变是

A、急性呼吸衰竭

B、脓毒血症

C、低血容量性休克

D、急性肾衰竭

E、应激性溃疡

答案：C

13、王先生,37岁,因肝硬化合并食管静脉曲张破裂出血用三腔管压迫后,发现抽出胃内容物有鲜红色血液,病人血压不稳定,应采用()

A、加大三腔管压力

B、加大输血、输液量

C、口服去甲肾上腺素

D、大剂量静脉点滴垂体后叶素

E、立即行胃底贲门周围血管离断术

答案：E

14、患儿,女,5岁,以恶心呕吐、腹痛4天,昏迷3小时急诊入院。患儿呼吸深长,可闻及烂水果味。经检测,血糖29mmol/L、尿糖3+、尿酮体3+。患儿昏迷的最可能原因是()

- A、低血糖
- B、脑膜炎
- C、急性胃肠炎
- D、糖尿病酮症酸中毒
- E、高渗性非酮症糖尿病昏迷

答案：D

15、某病人因发热、胸痛、咳痰 2 天人院, 护理体检: 体温 40℃, 右下肺闻及湿啰音, 血白细胞 $12.0 \times 10^9/L$, 入院诊断: 发热待查(肺炎)。下列哪项可作为该病人的护理问题()

- A、发热待查
- B、肺炎
- C、体温过高
- D、肺部啰音
- E、白细胞增高

答案：C

16、患者男性, 67 岁, 失血性休克, 护士遵医嘱为病人实施留置导尿术, 其主要目的是()

- A、记录尿量, 观察病情变化
- B、保持会阴部清洁干燥
- C、训练膀胱功能
- D、引流潴留的尿液
- E、进行尿培养检查

答案：A

17、下列哪些病人不需要重点交接班()

- A、手术后第 1 天患者
- B、分娩 20 分钟后的产妇
- C、危重患者
- D、一般的三级护理患者
- E、病情特殊患者

答案：D

18、倪某, 男, 45 岁。因反复关节疼痛 4 年, 加重 3 天收入院。身体评估: 急性痛苦面容, 双足多处趾关节红肿、皮温升高、活动障碍。诊断为痛风。对该病人的护理措施中, 正确的是()

- A、待关节疼痛缓解后立即进行关节活动指导, 防止关节失用
- B、给予双足热敷, 以缓解疼痛

- C、限制饮水, 避免加重关节肿胀
- D、观察病人体温变化
- E、指导多进食酸性食物

答案: D

19、护士备药时检查药品, 下列哪一项不妥()

- A、是否在有效期内、标签是否清晰
- B、高危警示药品是否标识
- C、安瓿、注射液瓶有无裂痕
- D、密封铝盖有无松动
- E、输液瓶袋有无漏水

答案: B

20、我国法定的甲类传染病包括()

- A、鼠疫、霍乱
- B、鼠疫、霍乱、天花
- C、鼠疫、霍乱、爱滋病
- D、天花、霍乱
- E、鼠疫、霍乱、天花、爱滋病

答案: A

21、陈某, 男, 60岁。体态肥胖, “三多一少”症状不明显。长期采用饮食治疗及口服降血糖药控制血糖, 但血糖控制不理想。对此应首先考虑诊断为()

- A、改用胰岛素治疗
- B、增加运动疗法
- C、加大降血糖药剂量
- D、调整用药时间
- E、住院进一步检查

答案: B

22、医护人员执行抢救时, 抢救时间记录不正确的是()

- A、记录家属到达时间
- B、记录医生到达时间
- C、患者病情变化时间
- D、抢救措施落实时间
- E、抢救开始和结束时间

答案: A

23、患者, 男性, 37岁。有溃疡病史, 中午饱餐后, 出现上腹部剧烈疼痛, 伴恶心呕吐, 腹肌紧张, 出冷汗, 休克。首先应考虑的是: ()

- A、癌变
- B、感染
- C、大出血
- D、急性穿孔
- E、幽门梗阻

答案：D

24、关于口罩的处理不正确的是()

- A、随时用完随时丢弃
- B、有发热症状时需要消毒后密封丢弃
- C、处理完口罩后要洗手
- D、口罩要定期更换
- E、佩戴时口罩应仔细遮盖嘴和鼻子

答案：A

25、患者女性,56岁,因心肌缺血、心绞痛发作卧床4周,护士为其进行床上洗发时,病人突感胸痛、心悸,面色苍白,出冷汗,护士应立即采取的措施是()

- A、请家属协助洗发,嘱病人深呼吸
- B、加快操作速度,尽快完成洗发操作
- C、注意保暖,为病人添加衣物后继续洗发
- D、短暂休息,鼓励病人坚持片刻
- E、立即停止操作,平卧,吸氧,通知医生

答案：E

26、血源性病原体职业暴露的防护措施,正确的是()

- A、洗手
- B、戴手套、口罩、护目镜及穿隔离衣等
- C、安全注射
- D、正确处理医疗废物
- E、以上都是

答案：E

27、治疗肺心病心力衰竭的首要措施是()

- A、卧床休息,低盐饮食
- B、使用小剂量强心剂
- C、使用小剂量作用缓和的利尿剂
- D、使用血管扩张剂减轻心脏负荷
- E、积极控制感染和改善呼吸功能

答案：E

28、隔离区的设立正确的是

- A、 隔离区域的设立应包括清洁区和污染区
- B、 清洁区和污染区之间可不设立缓冲区
- C、 缓冲区域应备有洗手设施、口罩、隔离衣、帽子、手套等防护用物
- D、 隔离区的设立要符合洁污统一的原则
- E、 各区域应用同一颜色的标识

答案：C

29、抗癌药物最常见的严重不良反应是()

- A、 肝脏损害
- B、 神经毒性
- C、 胃肠道反应
- D、 抑制骨髓
- E、 脱发

答案：D

30、协助病人向平车挪动的顺序为()

- A、 上身、臀部、下肢
- B、 上身、下肢、臀部
- C、 下肢、臀部、上身
- D、 臀部、下肢、上身
- E、 臀部、上身、下肢

答案：A

31、患者女性, 24 岁。误服有机磷农药 1605 (对硫磷) 一口, 急送医院就诊, 当时测定胆碱酯酶活力为 54%。对该患者应用氯解磷定静脉滴注治疗, 其目的是

- A、 恢复胆碱酯酶活力
- B、 减少毒物吸收
- C、 对抗烟碱样症状
- D、 对抗毒覃碱样症状
- E、 减少毒物吸收

答案：A

32、王先生, 36 岁, 右股股沟肿块 1 个月余, 肿块于咳嗽、用力时出现, 平卧休息后可消失, 体格检查: 肿块突入阴囊, 回纳后压住深环肿块不突出, 则其目前最可能的病情是()

- A、 易复性腹股沟直疝
- B、 易复性腹股沟斜疝
- C、 难复性腹股沟直疝

D、难复性腹股沟斜疝

E、绞窄性腹股沟直疝

答案：B

33、静脉注射消毒时应以穿刺点为中心用力擦拭,至少消毒()

A、1遍

B、2遍

C、3遍

D、4遍

E、不要消毒

答案：B

34、阴道灌洗液的温度为多少度适宜:()

A、40-43℃

B、39-42℃

C、40-42℃

D、41-43℃

E、41-44℃

答案：D

35、患者男,60岁。车祸导致颈椎骨折、脾破裂。手术后,护士为患者更换卧位做法不正确的是

A、更换卧位前应检查伤口敷料,先换药再翻身

B、动作轻,不拖拉

C、先放松颈椎骨折牵引处,更换卧位后继续牵引

D、2小时翻身一次

E、应先将导管放置稳妥,再更换卧位

答案：C

36、男,15岁,破伤风患者,抽搐时引起窒息,急救处理首先应是()

A、口服水合氯醛

B、肌注鲁米那

C、立即气管切开

D、静脉滴注TAT

E、气管插管

答案：C

37、完成输血后,受血者血液标本保存(),以备必要时查对。

A、6h

B、12h

C、24h

D、3天

答案：C

38、张某,男,48岁,破伤风病人,频繁抽搐,呼吸道分泌物多,有窒息的可能。应首先采取的措施是()

A、肌注苯巴比妥

B、立即气管切开

C、输液,应用青霉素

D、口服水合氯醛

E、静脉滴注甲硝唑

答案：B

39、我国急性胰腺炎最常见的病因是()

A、胆道疾病

B、酗酒

C、暴饮暴食

D、腹腔手术

E、十二指肠乳头病变

答案：A

40、Delta 变异株病毒载量较() (CT 值平均 21,相当于 10×10^6 拷贝数,长沙最低值为 14),远()于先前发现的新冠病毒株(CT 值平均 28,相当于 7×10^4 拷贝数)。转阴时间(),目前长沙已出院的第一例 Delta 变异株感染患者转阴天数为 37 天,远()于普通株平均 14 天。

A、低

低

短

短

B、高

高

长

长

C、高

低

长

短

D、低

高

短

长

E、高

低

短

长

答案：B

41、患者男, 22 岁。登山时不慎被毒蛇咬伤, 现场急救首先要

A、尖刀挑开咬痕处排毒

B、伤口近端用止血带

C、服用蛇药

D、局部封闭

E、过氧化氢溶液冲洗

答案：B

42、ITP 病人, 血常规结果显示红细胞 $3.6 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 $90g/L$, 白细胞 $6.8 \times 10^9/L$, 血小板 $15 \times 10^9/L$ 。目前该病人最大的危险是()

A、贫血

B、继续感染

C、颅内出血

D、贫血性心衰

E、牙龈出血

答案：C

43、患儿男, 6 岁。滑旱冰时摔倒, 手掌撑地。提示患儿出现 Colles 骨折的情况是()

A、猿手畸形

B、垂腕畸形

C、爪形手畸形

D、枪刺刀畸形

E、天鹅颈畸形

答案：D

44、患者男, 50 岁。有机磷农药中毒。患者意识不清, 躁动不安, 护士在使用保护具时不正确的是

A、一般只能短期使用, 做好记录

B、患者意识不清, 不需要保护其自尊

- C、密切观察受约束部位的末梢循环
- D、约束时松紧要适宜,一般以能伸入 1 或 2 根手指为宜
- E、骨隆突处应先垫棉垫,再用约束带,以免磨伤皮肤

答案: B

45、下列病人中,需要特别护理的是()

- A、年老体弱者
- B、需严格卧床休息,生活不能自理者
- C、高热病人
- D、颅脑术后患者,病情危重
- E、瘫痪病人

答案: D

46、直肠测温,肛表插入肛门()cm。

- A、2-3cm
- B、2-4cm
- C、3-4cm
- D、3-5cm
- E、3-6cm

答案: C

47、甲亢危象最常见的诱发因素是:()

- A、外科手术
- B、精神创伤
- C、感染
- D、妊娠
- E、中断治疗

答案: C

48、简易呼吸器挤压一次入肺的空气量约为()

- A、200~300ml
- B、300~400ml
- C、400~600ml
- D、600~800ml
- E、800~1000ml

答案: C

49、乙醇拭浴降温的主要机制是()

- A、传导
- B、蒸发

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/626052220120010045>