

2022～2023 初级护师考试题库及答案

1. 患儿，女，9岁。急性扁桃体炎，医嘱给予青霉素治疗，用药数天后出现发热、皮肤瘙痒、关节肿痛、淋巴结肿大、腹痛等症状。考虑该患儿出现的情况可能是

- A. 淋巴结炎
- B. 风湿性关节炎
- C. 皮肤过敏反应
- D. 血清病型反应
- E. 消化道过敏反应

正确答案：

D

2. 患者女，19岁。爬山时左踝部扭伤，导致局部肿胀、疼痛，立即来医院就诊，正确的处理措施是

- A. 按摩患处
- B. 热湿敷
- C. 局部用冰块冷敷
- D. 局部用热水袋热敷
- E. 用红外线烤灯照射

正确答案：

C

3. 患者男，65岁。因直肠癌入院。患者步入病房，精神和睡眠较差。3天后在全麻下行直肠癌根治术。有腹部人工肛门。经治疗和护理于手术后第十天出院。患者术前主要的护理问题是

- A. 自理缺陷
- B. 完全性尿失禁
- C. 排便失禁
- D. 有受伤的危险
- E. 焦虑

正确答案：

E

4. 属于肿瘤二级措施是

- A. 环境保护
- B. 积极治疗癌前病变
- C. 手术
- D. 放疗
- E. 化疗

正确答案：

B

5. 患儿男，10个月，诊断为“化脓性脑膜炎”。今晨出现烦躁不安，喷射性呕吐，右眼斜视，前囟饱满，肌张力增高，呼吸节律不整，遵医嘱使用甘露醇降低颅内压，下列护理措施不正确的是

- A. 发现甘露醇药液有结晶，不能使用
- B. 15分钟内快速静脉输完药液
- C. 可与其他药液经静脉通道同时输入
- D. 20%甘露醇一般4-8小时给药一次
- E. 不能静脉推注

正确答案：

C

6. 观察病人的病情应注意观察生命体征。生命体征包括

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 以上四项均是

正确答案：

E

7. 中期妊娠引产，羊膜穿刺应

- A. 不超过 2 次
- B. 不超过 3 次
- C. 不超过 4 次
- D. 不超过 5 次
- E. 不超过 6 次

正确答案：

B

8. 患者男，50岁。确诊乙型肝炎20年，长期需要家人照顾其生活起居，今日该患者因食欲不振、厌油、腹胀3个月。加重1个月入院，查体：全身散在皮肤紫癜，腹部胀痛，叩诊移动性浊音阳性，肝脏触诊质硬有结节感，边缘较薄，无压痛。实验室检查：ALT(GPT)显著升高，AFP正常。若该患者腹水诊断明确，每日摄入的钠盐应控制在

- A. 1~2、g/d
- B. 2~3、g/d
- C. 3~4、g/d
- D. 4~5、g/d
- E. 5~6、g/d

正确答案：

A

9. 避孕失败后最常用的补救措施是

- A. 服用避孕药
- B. 放置宫内节育器
- C. 人工流产
- D. 引产
- E. 绝育术

正确答案：

C

10. 护士的首要职责是

- A. 提供健康照顾
- B. 协调护理工作
- C. 传授健康知识
- D. 护理研究工作
- E. 进行沟通交流

正确答案：

A

11. 女， 16 岁。月经周期 7～ 9 天 /20～25 天。本次月经期 10 余天未止，量多，测基础体温单相型。其首要的治疗是

- A. 止血药加镇静剂
- B. 孕激素加雌激素
- C. 雌激素加周期治疗
- D. 雄激素加孕激素
- E. 雄激素

正确答案：

C

12. 胆囊或胰腺超声检查前应禁食

- A. 4 小时
- B. 6 小时
- C. 8 小时
- D. 10 小时
- E. 12 小时

正确答案：

E

13. 有机磷农药中毒后患者呼出的气体气味是

- A. 蒜臭味
- B. 烂苹果味
- C. 苦杏仁味
- D. 酒味
- E. 粪臭味

正确答案：

E

14. 胰关癌的主要临床特点是

- A. 进行性无痛性黄疸
- B. 肝脏肿大
- C. 胆囊肿大
- D. 上腹部隐痛
- E. 厌食消瘦乏力

正确答案：

A

15. 护士在执行医嘱的过程中，做法错误的是

- A. 不可修改医嘱
- B. 一般不执行口头医嘱
- C. 患者对医嘱提出疑问时，护士应 核实医嘱
- D. 发现医嘱有明显错误时，护士有权不执行医 嘱
- E. 护士向医生指出医嘱中的错误后，医生仍执意要求 护士执行时，护士应遵医嘱执行

正确答案：

E

16. 血标本溶血对哪项检验的准确性影响最大

- A. 钾
- B. 肌酐
- C. 尿素氮
- D. 葡萄糖
- E. 淀粉酶

正确答案：

A

17. 支气管扩张患者在施行体位引流时，错误的护理是

- A. 引流在晚间睡前进行
- B. 根据病变部位选择体位
- C. 引流时鼓励患者深呼吸
- D. 引流时间每次 30min 以上
- E. 引流完毕后给予漱口

正确答案：

D

18. 糖尿病患者运动治疗的最佳时间是

- A. 晨起锻炼
- B. 餐后 2 小时
- C. 睡前
- D. 餐后 1 小时
- E. 餐前 1 小时

正确答案：

D

19. 对人类健康保障起决定作用的因素是优良的

- A. 生理环境
- B. 心理环境
- C. 自然环境
- D. 社会环境
- E. 治疗性环境

正确答案：

D

20. 老年男性泌尿系梗阻常见的病因

- A. 包皮过长
- B. 结石损伤
- C. 盆腔内疾病
- D. 先天畸形
- E. 前列腺增生症

正确答案：

E

21. 判定肺结核临床类型的主要依据是

- A. 痰菌检查
- B. 肺部体征
- C. 结核菌素试验
- D. 全身中毒症状
- E. 胸部 x 线检查

正确答案：

E

22. 治疗新生儿破伤风用 TAT 的目的是

- A. 减少外毒素的产生
- B. 中和游离 的外毒素
- C. 使机体产生免疫力
- D. 对抗破伤风杆菌的生长
- E. 抑制 破伤风芽孢杆菌的繁殖

正确答案：

B

23. 口服第一片短效口服避孕药的时间是

- A. 月经来潮的第 3 天
- B. 月经来潮的第 5 天
- C. 月经来潮的第 10 天
- D. 月经来潮的第 14 天
- E. 月经来潮的第 21 天

正确答案：

B

24. 构成甲状腺素的主要成分是

- A. 磷
- B. 碘
- C. 锌
- D. 铁
- E. 钙

正确答案：

B

25. 超声雾化吸入的目的不包括

- A. 稀化痰液
- B. 增加吸入氧浓度
- C. 解除支 气管痉挛
- D. 减轻呼吸道的炎症
- E. 间歇吸入抗癌药物 治疗肺癌

正确答案：

B

26. 冠心病最常见的病因是

- A. 重度主动脉瓣病变
- B. 冠状动脉栓塞
- C. 冠状 动脉粥样硬化
- D. 肥厚型心肌病
- E. 冠脉痉挛

正确答案：

C

27. 葡萄胎的随访时间是

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 5 年
- E. 5 年以上

正确答案：

A

28. 有关铁剂治疗缺铁性贫血的叙述，下列哪项不正确

- A. 症状纠正后继续服药 3~6 个月
- B. 网织红细胞数增加是治疗有效的指标
- C. 于饭后服用
- D. 服药后可出现黑粪
- E. 可防止缺铁性贫血的复发

正确答案：

E

29. 肾病性肾功能正常者错误的护理是

- A. 低蛋白饮食
- B. 限制钠盐摄入
- C. 保持皮肤清洁
- D. 静脉输液需控制滴速和总量
- E. 病室定期清洁、消毒

正确答案：

A

30. 哪项检查可测胎儿肺成熟度

- A. 血清胎盘生乳素
- B. 卵磷脂与鞘 磷脂比值
- C. 无应激试验
- D. 催产素激惹试验
- E. 胆红素测定

正确答案：

B

31. 引起风湿性心瓣膜病患者死亡的主要原因是

- A. 栓塞
- B. 心律失常

- C. 心源性休克
- D. 充血性心力衰竭
- E. 亚急性感染性心内膜炎

正确答案：

D

32. 以下提示膀胱损伤的表现是

- A. 排尿障碍而膀胱空虚
- B. 导尿管不易插入
- C. 假性尿失禁
- D. 血尿
- E. 下腹部腹膜刺激征

正确答案：

A

33. 闭合性多根多处骨折病人首要的急救措施是

- A. 输液
- B. 吸氧
- C. 镇静止痛
- D. 应用抗生素
- E. 局部加压包扎固定

正确答案：

E

34. 某医院对恢复中病情轻微的患者，为保证其睡眠质量夜间查房采用窗口查看方式 A 患者入院后因其不适应病房环境而常失眠，由此发现有时夜间护士不查房，遂向护士长投诉护士偷懒，护士应该怎样回应：

- A. 认为该患者事多，不予理睬
- B. 直接让该患者服用安定片
- C. 夜里象征性打开门看一眼
- D. 及时与该患者沟通交流，解释在何种情况下为减少打扰患者，夜间不入户查房，并针对患者的失眠问题提出解决方法
- E. 再次夜间查房时，即使该患者睡着了也将其叫醒，嘘寒问暖。

正确答案：

D

35. 引起原发性肝癌的原因不包括：

- A. 乙型病毒性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 饮食中含多量粗纤维
- D. 长期饮用蓝绿藻污染水
- E. 黄曲霉

正确答案：

C

36. 慢性胃炎的主要病因是

- A. 自身免疫反应

- B. 十二指肠液反应
- C. 幽门螺杆菌感染
- D. 理化因素
- E. 机械损伤

正确答案：

E

37. 患者男 65 岁，突发急性广泛心肌梗死，咳大量粉红色泡沫痰，其咳痰病因是

- A. 急性气胸
- B. 急性肺气肿
- C. 肺囊肿
- D. 急性 肺水肿
- E. 肺不张

正确答案：

D

38. 肌肉等长练习的正确描述是

- A. 因肌肉长度改变而肢 体运动
- B. 伴有明显的关节运动
- C. 增加肌肉的张力而 不改变肌肉的长度
- D. 增加肌肉的张力且改变肌肉的 长度
- E. 等长运动又称动力运动

正确答案：

C

39. 破伤风患者最早发生痉挛的肌肉是

- A. 面肌
- B. 咀嚼肌
- C. 颈背肌
- D. 膈肌
- E. 四肢肌

正确答案：

B

40. 肠蠕动时，肠腔内液体与气体亦随之流动，产生一种断断续续的咕噜声是

- A. 湿啰音外语学习 网
- B. 胸膜摩擦音
- C. 移动性浊音
- D. 肠鸣音
- E. 胃振水 音

正确答案：

D

41. 患者女， 2 岁。发热、盗汗，食欲不振、消瘦、无力来诊。胸部 X 线片见两侧肺野有分布均匀、大小一致粟粒状阴影，结核菌素试验阳性。该患儿正确的诊断是

- A. 浸润性肺结核
- B. 急性粟粒型肺结核

- C. 支气管淋巴结
- D. 原发性肺结核
- E. 结核性胸膜炎

正确答案：

B

42. 病房湿度过低时，患者可表现为

- A. 呼吸道黏膜干燥、咽痛
- B. 憋气、闷热
- C. 肌肉紧张
- D. 食欲不振、耳鸣
- E. 尿量增多

正确答案：

A

43. 无菌持物钳的湿式保存法，消毒液应浸泡达到的深度为

- A. 持物钳轴关节
- B. 持物钳轴下 2~3m
- C. 持物钳轴上 2~3m
- D. 持物钳的 1/2
- E. 没过整钳

正确答案：

C

44. 恶性肿瘤术后第 1 年，随访的时间是

- A. 每半个月 1 次
- B. 每 1~2 个月 1 次
- C. 每 3 个月 1 次
- D. 每 4~5 个月 1 次
- E. 每 6 个月 1 次

正确答案：

C

45. 食道癌手术病人的护理过程中，错误的一项是

- A. 注意口腔
- B. 术前做胃肠道准备
- C. 术后保持胃肠减压通畅
- D. 术后胃肠蠕动恢复后即可进食
- E. 注意并发吻合口瘘

正确答案：

D

46. 患者女，61 岁。因头昏摔倒致腰椎 L2 右侧横突骨折而急诊入院，经积极治疗，现病情已稳定。护士协助患者改变体位的方法正确的是

- A. 一人协助患者取半坐卧位法
- B. 两人协助患者取半坐卧位法
- C. 一人协助患者取端坐位法

- D. 一人协助患者轴线翻身法
- E. 两人协助患者轴线翻身法

正确答案：

E

47. 对低钾患者静脉补钾，最重要的参考指标是

- A. 给药速度
- B. 药液浓度
- C. 患者尿量
- D. 用药总量
- E. 患者精神状态

正确答案：

C

48. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是

- A. 腹痛性质
- B. 有无腹膜刺激征
- C. 腹腔内有无 原病发灶
- D. 腹腔是否与外界相通
- E. 病原菌种 类

正确答案：

C

49. 孕 40 周，初产，宫口开全 2 小时，胎头棘下 2cm，宫缩较前减弱，胎膜已破，胎心 120 次/分，产妇一般情况较好、操作中应避免的错误是

- A. 术前导尿
- B. 阴道检查
- C. 放置吸引器
- D. 抽成 20—30Kpa 的负压
- E. 沿产轴方向牵拉

正确答案：

D

50. 患者，男性， 28 岁，检查发现器官向左侧移位，右侧胸廓饱满，触觉语颤减弱，叩诊浊音，应考虑最可能的原因是

- A. 肺气肿
- B. 气胸
- C. 胸腔积液
- D. 肺炎
- E. 肺脓肿

正确答案：

C

51. 腹部损伤患者为尽早明确诊断，错误的治疗是

- A. 不随便拖动患者
- B. 积极补充血容量
- C. 剧烈 疼痛时，可注射镇痛药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/626122002033010044>