

2024 湖北省来凤县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试完整版（名校卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合，可导致（）

- A: 溶液变色
- B: 产生胶状不溶物
- C: 产生气体
- D: 微浑浊或沉淀

答案：D

2. 在治疗蛔虫病的药物中，可能引起"蛔虫游走而口吐蛔虫"的是

- A: 噻嘧啶
- B: 甲苯咪唑
- C: 枸橼酸哌嗪
- D: 三苯双脒

答案：B

3. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人 $<40\text{U/L}$
- B: 男性 $11\sim50\text{U/L}$
- C: 男性 $<40\text{U/L}$
- D: 成人 $<50\text{U/L}$

答案：A

4. 患者，女，67 岁，有高血压病史，右手抖动行走缓慢 4 年，诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗，症状一度好转后又反复加重，随后采用加大复方左旋多巴剂量，并加用苯海索。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压近日出现运动症状波动，伴有异动症。导致该不良反应的药物是（）

- A: 苧丝肼
- B: 左旋多巴
- C: 氨氯地平
- D: 苯海索

答案：B

5. （2017 年真题）高血压治疗药物选择时，ACEI 类药物禁用于（）

- A: 胃溃疡患者
- B: 心力衰竭患者
- C: 双侧肾动脉狭窄患者
- D: 痛风患者

答案：C

6. 女，30 岁。G2P1 既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

- A: 阻止精子与卵子相遇
- B: 抑制卵巢排卵
- C: 改变宫颈黏液性状
- D: 影响受精卵着床

答案：D

7. 长期服用可加重消化道溃疡风险，不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

- A: 多奈哌齐
- B: 美金刚
- C: 铝碳酸镁
- D: 匹伐他汀

答案：A

8. 服药期间饮酒可致药效增强、引发风险的药物是

- A: 泼尼松
- B: 格列本脲
- C: 维生素
- D: 维生素

答案：B

9. 有肾炎、风湿病伴有心脏损害、高血压患者不宜

- A: 高盐饮食
- B: 吸烟
- C: 咖啡
- D: 饮茶

答案：A

10. 因体内肝酶不足，易发生灰婴综合征

- A: 庆大霉素
- B: 氯霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 米诺环素

答案：B

11. 成年男性的血尿酸正常参考范围是

A: $208 \sim 428 \mu\text{mol} / \text{L}$

B: $550 \sim 650 \mu\text{mol} / \text{L}$

C: $120 \sim 160 \mu\text{mol} / \text{L}$

D: $155 \sim 357 \mu\text{mol} / \text{L}$

答案：A

12. 药名词干为"-penem"的药品是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

13. 同时患有滴虫及念珠菌性阴道炎应首选的药品是

A: 硝酸咪康唑

B: 甲硝唑

C: 曲古霉素

D: 制霉菌素

答案：C

14. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

A: 精神刺激剂

B: 利尿剂

C: 钙通道阻断剂

D: β 受体阻断剂

答案：C

15. 静注的缩写为

A: pc

B: q4h

C: iv

D: qid

答案：C

16. (妊娠的危险性分级)在有对照组的早期妊娠妇女中未显示对胎儿有危险(并在中、晚期妊娠中亦无危险的证据)，可能对胎儿的伤害极小

A: C 级

B: A 级

C: B 级

D: D 级

答案：B

17. 属于癌痛治疗第三阶梯的止痛药物为

A: 曲马多

B: 羟考酮

C: 可待因

D: 对乙酰氨基酚

答案：B

18. 影响核酸合成的药物是

A: 依托泊苷

B: 顺铂

C: 放线菌

D: 培美曲塞

答案：D

19. 吩噻嗪类抗精神病药中毒出现

- A: 肌肉震颤、抽搐
- B: 明显的锥体外系症状
- C: 心血管毒性
- D: 谵妄、躁狂、幻觉

答案：B

20. (2021 年真题) 为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L, 需要次氯酸钠溶液 (有效氯浓度为 6. 0%) 和纯化水的量分别是 ()

- A: 83mL 和 9917mL
- B: 150mL 和 9850mL
- C: 120mL 和 9880mL
- D: 830mL 和 9170mL

答案：A

21. 他汀类与贝特类药物联合使用时，最容易出现的毒性风险是

- A: 横纹肌溶解
- B: 输尿管结石
- C: 急性心肌梗死
- D: 十二指肠溃疡

答案：A

22. 给予非甾体解热镇痛药的依据是

- A: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- B: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- C: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- D: 有助于合成红细胞

答案：C

23. 患者，女，30 岁。患先兆子痫，以硫酸镁治疗，适宜的给药途径是

- A: 直肠给药
- B: 吸入给药
- C: 静脉注射
- D: 口服给药

答案：C

24. 用于治疗氰化物中毒的解救药物是

- A: 谷胱甘肽
- B: 盐酸烯丙吗啡
- C: 双解磷
- D: 亚硝酸钠

答案：D

25. 患者，女，76 岁，患阿尔茨海默病，伴严重的肾功能不全，该患者禁用的药物为，

- A: 多奈哌齐
- B: 加兰他敏
- C: 卡巴拉汀
- D: 美金刚

答案：B

26. 以下所列处方书写的各项要求中，最正确的是

- A: 每张处方不得超过 3 日用量
- B: 每张处方不得超过 5 种药品
- C: 每张处方不得合开中西药品
- D: 处方中不得使用药品缩写名称

答案：B

27. 结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎等传染病可呈现

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 淋巴细胞增多

C: 单核细胞增多

D: 中性粒细胞增多

答案：B

28. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 维生素 C

B: 维生素 D

C: 维生素 B12

D: 维生素 A

答案：B

29. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$

A: 急性膀胱炎

B: 急性肾盂肾炎

C: 急性肾小球肾炎

D: 慢性肾盂肾炎

答案：B

30. 新生儿应用氯霉素可引起

A: 高胆红素血症

- B: 核黄疸
- C: 灰婴综合征
- D: 新生儿溶血

答案：C

31. 一患者的肝功能检查结果是 ALT 与 AST 超过正常值，且 AST/ALT 之比值大于 1。此结果提示病人可能患

- A: 肝硬化
- B: 糖尿病
- C: 急性胰腺炎
- D: 缺铁性贫血

答案：A

32. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,长期服用阿司匹林

- A: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血
- B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- C: 可能致胎儿畸形
- D: 导致新生儿血钙过高

答案：A

33. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系)，正常人对铁剂的吸收率为

- A: 20%~40%
- B: 20%~60%
- C: 15%~20%
- D: 10%~20%

答案：D

34. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 用药原因

B: 不良反应 / 事件的结果

C: ADR/ADE 过程描述

D: 用药起止时间

答案：A

35. 下列关于抗失眠药物治疗策略的说法，正确的是

A: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮革类抗失眠药

B: 失眠继发于或伴发于其他疾病时，应同时治疗原发或伴发疾病

C: 焦虑障碍患者存在失眠时，以抗失眠药物治疗为主

D: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

答案：B

36. 以下药物中，可能导致尿沉渣管型异常的是

A: 多黏菌素

B: 氯丙嗪

C: 巯嘌呤

D: 扑米酮

答案：A

37. “沟通医、药、患的重要纽带”的工作是

A: 参与临床药物治疗

B: 治疗药物监测

C: 静脉药物配置

D: 处方调剂

答案：D

38. 治疗反复性偏头痛推荐应用的处方药是

- A: 阿司匹林
- B: 麦角胺咖啡因
- C: 苯妥英钠
- D: 谷维素

答案：B

39. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

- A: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素
- B: 右美沙芬可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用
- C: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰
- D: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多者应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果

答案：A

40. （2019 年真题）艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗，俗称“鸡尾酒疗法”，目前国内免费治疗的一线方案是

- A: 拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定
- B: 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦
- C: 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平
- D: 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦

答案：C

41. 弱酸性药物离子化减少

- A: 肾小球滤过减少
- B: 肾小管分泌减少
- C: 肾小管重吸收增加
- D: 肾血流量减少

答案：C

42. 表现为疲劳、软弱、全身不适、颅内压增高、皮肤干燥瘙痒、四肢痛为哪种维生素滥用的危害

- A: 维生素 B
- B: 维生素 C
- C: 维生素 D
- D: 维生素 A

答案：D

43. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 卡托普利
- B: 甲氧多巴
- C: 硫酸镁
- D: 缬沙坦

答案：C

44. 患者，男，50 岁，临床诊断为“焦虑障碍”，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者的用药指导，错误的是

- A: 氟西汀应于睡前服用
- B: 不能突然停止服用氟西汀

C: 不得随意自行调整氟西汀剂量

D: 服用氟西汀期间不能饮酒

答案: A

45. 肾脏有效循环血量与肾小球滤过率较成人低 30%~40%可影响

A: 药物中毒

B: 药物代谢

C: 药物吸收

D: 药物排泄

答案: D

46. 患者女, 80 岁高血压病史 28 年近日自觉憋气昨夜出现呼吸困难, 不能平躺喘憋咳粉红色泡沫样痰诊断为心力衰竭应选用的药物是 ()

A: 呋塞米

B: 胺碘酮

C: 氟桂利嗪

D: 硝酸异山梨酯

答案: A

47. 有机磷农药重度中毒时, 血胆碱酯酶的活力下降至

A: 70%~50%

B: 0.7

C: 30%以下

D: 50%~30%

答案: C

48. 患者, 男, 65 岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林, 正确的用量与用法是

A: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg; 随后 75~100mgqd, 长期维持

B: 25~50mgqd, 长期维持

C: 100-150mgqd, 长期维持

D: 75~100mgbid, 长期维持

答案: A

49. 一般情况下, 容易透过透析膜被清除的药物是

A: 血浆蛋白结合率高的药物

B: 低水溶性的药物

C: 分子量>500 的药物

D: 分布容积小的药物

答案: D

50. 巴比妥类药物重度中毒的表现是

A: 抽搐反复发作

B: 意识障碍、昏迷

C: 恶心、呕吐、视力模糊

D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案: B

51. 饮食对粪外观的影响, 食巧克力、咖啡

A: 黑褐色

B: 酱色

C: 红色

D: 暗绿色

答案: B

52. 制定新药新知识培训制度，归属于用药错误预防策略中的

- A: 管理规范到位
- B: 科学发展
- C: 人员培训
- D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：C

53. 再感染

- A: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml
- B: 宜选用毒性小的抗菌药物
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同

答案：C

54. 促使儿茶酚胺释放，减少药物吸收

- A: 呋塞米
- B: 地西泮
- C: 胰岛素
- D: 氨茶碱

答案：C

55. 对 5 岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是

- A: 20%阿司匹林溶液滴鼻
- B: 布洛芬混悬液
- C: 贝诺酯混悬液

D: 20%安乃近溶液滴鼻

答案: D

56. 患者，女，65岁，间断腹胀、纳差6年，因病情加重伴精神恍惚3天为主诉入院，实验室检查:ALT200UL，AST320UL，诊断为肝硬化失代偿期、肝性脑病。患者乙肝病史20年，间断服用中药（具体不详）治疗。糖尿病史10年，便秘多年，3~4天排便一次。

A: 维生素 B1

B: 水溶性维生素

C: 辅酶 A

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案: D

57. 高血压治疗药物选择时,ACEI 类药物禁用于()

A: 胃溃疡患者

B: 心力衰竭患者

C: 双侧肾动脉狭窄患者

D: 痛风患者

答案: C

58. 杨某，女，19岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性罗音；WBC $>13\times 10^9/L$ 。

A: 支气管炎

B: 社区获得性肺炎

C: 肺结核

D: 哮喘

答案: B

59. 氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是（）

- A: 维生素 K1
- B: 青霉胺
- C: 乙酰胺
- D: 纳洛酮

答案：C

60. 处方审核是处方调配的重要环节，药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方，不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

- A: 中药饮片和化学药物在同一处方中开写
- B: 无正当理由超药品说明书用药
- C: 处方字迹模糊不易辨识
- D: 处方中使用了“遵医嘱”字样

答案：B

61. 含有解热镇痛药的抗感冒药应慎用或禁用于

- A: 疲劳和生活规律紊乱者
- B: 妊娠初期及哺乳期妇女
- C: 有血小板减少症、有出血倾向者、上消化道出血和(或)穿孔病史者
- D: 患有心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、青光眼、前列腺增生的患者

答案：C

62. 用药错误定义为药物在临床使用全过程中出现的、任何可以防范的用药不当。临床用药的过程一般是指开写处方、转抄医嘱、药师调剂发药、护士或患者给药以及监测用药结果等。

- A: 药品位置凌乱

B: 药品包装外观相似

C: 患者自行选购药品

D: 新手值班

答案: B

63. 以下药品中，最容易受湿度影响而变质的是

A: 水溶性基质栓

B: 肝素等生物制品

C: 胰岛素制剂

D: 滴眼剂

答案: A

64. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

A: 淡橙色

B: 淡红色

C: 淡黄色

D: 淡绿色

答案: C

65. 对由甲氨蝶呤所引发的贫血者，宜应用的药物是

A: 维生素 B12

B: 富马酸亚铁

C: 叶酸+维生素 B12

D: 烟酸

答案: C

66. 患者，男，48 岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: 刺激性干咳
- B: 心律失常
- C: 水电解质失衡
- D: 二重感染

答案：A

67. 首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

- A: 氯苯那敏胶囊
- B: 异丙嗪片
- C: 醋酸氟轻松软膏
- D: 西替利嗪片

答案：D

68. 冠心病患者入不能耐受 ACEI，可考虑给予（）

- A: β 受体激动剂
- B: α 受体拮抗剂
- C: 地高辛
- D: AR

答案：D

69. 严重烧伤患者尿常规检查可发现

- A: 尿血红蛋白阳性
- B: 尿胆红素阳性
- C: 尿葡萄糖阳性
- D: 尿淀粉酶增高

答案：A

70. 关于嗜酸性粒细胞叙述正确的是

- A: 嗜酸性粒细胞无吞噬功能
- B: 嗜酸性粒细胞可释放组胺酶
- C: 嗜酸性粒细胞不能吞噬抗原-抗体复合物
- D: 支气管哮喘患者的嗜酸性粒细胞减少

答案：B

71. 把重心集中在监控高频发生错误的药物使用上，归属

- A: 环境与流程的优化与持续改进
- B: 社会进步
- C: 知识培训
- D: 管理规范到位

答案：D

72. （2018 年真题）患者，男，65 岁，临床诊断：2 型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

- A: 瑞格列奈片用量不合理
- B: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理
- C: 选用美托洛尔缓释片不合理
- D: 选用阿卡波糖片不合理

答案：B

73. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 食醋
- B: 酒
- C: 浓茶

D: 烟

答案: B

74. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

A: 90~120g / L

B: 120~160g / L

C: 30~60g / L

D: 60~90g / L

答案: A

75. (抗高血压药物的不良反应)，服用哌唑嗪可能引起

A: 免疫失调

B: 房室传导阻滞

C: 多毛症

D: 直立性低血压

答案: D

76. 用于糖尿病患者可出现低血糖或高血糖的药物是

A: 氟西汀

B: 加替沙星

C: 头孢菌素类

D: 培高利特

答案: B

77. I 类手术切口应用第三代头孢菌素

A: 盲目联合用药

B: 无适应证用药

C: 过度治疗用药

D: 超适应证用药

答案: B

78. 可作为紧急避孕药，性生活后 72h 内必须服用的药物是

A: 甲羟孕酮 150mg 肌内注射

B: 口服左炔诺孕酮(1.5mg)

C: 口服低剂量孕激素避孕药(炔诺酮 0.35mg)

D: 短效复方口服避孕药

答案: B

79. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

A: 黏液便

B: 米泔水样便

C: 稀糊状或水样粪便

D: 冻状便

答案: D

80. 为血液中的主要吞噬细胞，在白细胞中所占比例最高，且在急性感染中起重要作用的细胞为

A: 嗜酸性粒细胞

B: 淋巴细胞

C: 中性粒细胞

D: 嗜碱性粒细胞

答案: C

81. 抑制细菌核酸合成的药物是

A: 磺胺嘧啶

B: 头孢哌酮

C: 头孢米诺

D: 利福喷汀

答案: D

82. 是前药，其活性代谢产物是强效的选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂，通常用于甲型或乙型流感病毒治疗的是

A: 奥司他韦

B: 氟胞嘧啶

C: 干扰素

D: 更昔洛韦

答案: A

83. (2019 年真题) 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是

A: C 级

B: X 级

C: A 级

D: B 级

答案: D

84. ADR 报告表内容填写不齐全、等待补充后再评价，或因果关系难以定论、缺乏文献资料佐证；ADR 因果关系可评价为

A: 可能

B: 很可能

C: 待评价

D: 可能无关

答案: C

85. 主要用于抗真菌的药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 氟胞嘧啶
- C: 阿糖胞苷
- D: 阿糖腺苷

答案：B

86. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 硝苯地平
- B: 多索茶碱
- C: 西地兰
- D: 硝普钠

答案：C

87. 易受湿度影响而变质的药品为

- A: 肝素
- B: 安乃近
- C: 冰硼散
- D: 氰化钾

答案：C

88. 利尿药呋达帕胺引起的主要不良反应是

- A: 低钾血症
- B: 多毛症
- C: 高钾血症

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 水肿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/626140140054011030>