

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、抢救脊柱骨折的伤员时，应 0。

- A、采取保暖措施
- B、用软板担架运送
- C、用三角巾固定
- D、扶持伤者移动
- E、以上方法均正确

【答案】： C

2、初期复苏所讲 ABC 中，通常 A 是指 0

- A、开放气道
- B、口对口(鼻)人工呼吸
- C、胸外心脏按压
- D、药物治疗
- E、病情观察

【答案】： A

3、关于急性应激障碍的陈述，正确的是 0

- A、一般在刺激后 1 天内发病
- B、以急剧、严重的精神打击为直接原因
- C、表现平静
- D、应激消除者症状历时 20 天左右
- E、通常 6 个月内症状缓解

【答案】： B

4、王女士，30岁，颅脑损伤住院治疗行冬眠降温疗法错误的护理是 0

- A、用药前量体温、脉搏、呼吸、血压
- B、物理降温后用冬眠药物
- C、病人在注射冬眠药物后半小时内不宜翻身或搬运
- D、维持直肠内温度在 32-34℃
- E、维持、电解质及酸碱平衡

【答案】： D

5、现场急救电击伤最首要的措施是 0

- A、切断电源
- B、胸外心脏按压
- C、包扎创面
- D、预防感染
- E、TAT

【答案】： A

6、院前急救的原则错误的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤，后轻伤
- C、急救与呼救并重
- D、转运与救护相结合

【答案】： A

7、下面禁止转运的指征不正确的是)

- A、心跳、呼吸停止；
- B、有气管插管指征，但未插管的；
- C、血流动力学不稳定；
- D、血压偏高

【答案】： D

8、对蛛网膜下腔出血病因的诊断，最具有意义的辅助检查是 0

- A、脑脊液检查
- B、脑血管造影

C、脑部 Ct 检查

D、脑部 MRI 检查

E、血常规

【答案】： B

9、患者，女，28岁，看电视时突觉右侧上下肢不能活动，不能言语，无呕吐，无抽搐，有风湿性心脏病十年。最可能的诊断是 0

- A、脑出血
- B、TIA
- C、脑血栓形成
- D、脑栓塞
- E、蛛网膜下腔出血

【答案】： D

10、诊断心跳骤停的简捷依据是 0

- A、血压测不到
- B、神志突然消失
- C、呼吸突然停止
- D、大动脉搏动消失

【答案】： D

11、患者，男，50岁。某日在烈日下劳动4小时后感到头昏乏力，随后昏倒在地，神志不清，急送医院，头颅CT检查未见异常。查体：体温41℃，心率135次/分，律齐，血压90/60mmHg，深昏迷，双下肢阵发性抽搐，大、小便失禁。该患者属于中暑的哪一类型()

- A、热射病
- B、热痉挛
- C、热衰竭
- D、先兆中暑
- E、轻度中暑

【答案】： A

12、高危药品效期管理要做到以下 0

- A、先进先出
- B、近效期先用
- C、严格储藏
- D、严格保养
- E、以上全都是

【答案】： E

13、锐器伤的职业防护措施中有错的是 0

- A、在有可能接触病人血、体液时必须戴手套
- B、手术中用弯盘存放锐器后再传递
- C、抽吸药液后必须立即用双手操作套上针帽
- D、锐器不可与其他医疗垃圾混放
- E、用砂轮划痕后垫纱布再掰安瓿

【答案】： C

14、严重创伤性休克后，首先应预防的是 0

- A、感染
- B、输血并发症
- C、急性心力衰竭
- D、肠麻痹
- E、急性呼吸窘迫综合征

【答案】： A

15、对成人进行胸外心脏按压时，双手应该 0

- A、双手掌根重叠
- B、双手指重叠
- C、掌心紧贴胸壁
- D、手指紧贴胸壁
- E、掌根压胸壁

【答案】： A

16、休克时正确的补液原则是 0

A、

补液“宁多勿少”

- B、需多少补多少
- C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D、失多少补多少
- E、如血压正常不必补液

【答案】： B

17、抢救地震幸存者时，要先使其 0

- A、全身都暴露出来，以便检查受伤情况
- B、手脚暴露出来，以便协助抢救
- C、头部暴露出来，并迅速清除口鼻内的灰土，防止窒息
- D、胸部暴露出来

【答案】： C

18、男，12岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如

下哪种抢救措施外，其余措施均可采取 0

- A、胸外按压
- B、人工呼吸
- C、电除颤
- D、心脏起搏

【答案】： D

19、高血压分为几级 0

- A、1级
- B、2级
- C、3级
- D、4级

【答案】： C

20、最容易发生急性肾衰竭的是 0

- A、严重颅脑外伤
- B、严重挤压伤
- C、大面积烧伤
- D、外伤致脾破裂
- E、骨盆骨折

【答案】： B

21、环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。环甲膜穿刺点是)

- A、甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。
- B、甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘交界处。
- C、甲状软骨下缘与颈部正中线交界处。
- D、甲状软骨下缘与软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。
- E、环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。

【答案】： A

22、下列哪项是多发伤初级评估的目的 0

- A、明确诊断
- B、判定处理伤员的优先次序
- C、确认是否需要手术
- D、明确收治的科室
- E、决定后续的治疗方案及优先次序

【答案】： B

23、张力性气胸的紧急处理是 0

- A、剖胸探查修补损伤
- B、胸腔闭式引流
- C、吸氧
- D、气管插管
- E、尽快于伤侧锁骨中线第 2 肋间插入带有活瓣的穿刺针排气减压

【答案】： E

24、地震发生现场，某患者出现大量肠管脱出，此时首先要做的是 0

- A、进行保护性包扎
- B、把肠管回纳腹腔
- C、暂时不予处理
- D、马上紧急处理
- E、给予止痛药

【答案】： A

25、II型呼吸衰竭是指动脉血气显示 0

- A、仅有缺氧
- B、仅有二氧化碳潴留
- C、仅有二氧化碳降低
- D、既有缺氧，又有二氧化碳降低
- E、既有缺氧，又有二氧化碳潴留

【答案】： E

26、高原病的诱因不包括 0

- A、登高速度过急
- B、体力活动过大
- C、寒冷或气候改变
- D、饥饿、疲劳、失眠
- E、慢性胃炎

【答案】： E

27、开放性腹部损伤中，致伤物有入口、出口的是 0

- A、贯通伤
- B、盲管伤
- C、挤压伤
- D、穿透伤
- E、扭挫伤

【答案】： B

28、双下肢骨折的伤病员，应首选 0

- A、杠轿式搬运
- B、担架搬运
- C、拖行搬运
- D、扶持搬运
- E、横抱搬运

【答案】： B

29、患者，女性，55岁。因高速车祸4小时入院，伤后当时浅昏迷，GCS评分5分，呼吸急促(38次/分)伴口严重发绀，面部严重肿胀，脉搏摸不到，手足发冷，血压5

0/30mmHg。假如你是现场救护人员，首先实施的抢救措施是 0

- A、立即建立静脉通路、抗休克治疗
- B、进行创伤严重度评分
- C、立即送往医院
- D、气管插管、给氧
- E、仔细检查，明确诊断

【答案】： D

30、用于动脉出血的止血方法为 0

- A、加加压包扎止血法
- B、指压止血法
- C、屈肢加垫止血法
- D、填塞止血法

【答案】： B

31、糖尿病昏迷患者使用胰岛素时应注意补充 0

- A、Na⁺
- B、Cl⁻
- C、Ca²⁺
- D、K⁺

E、 Mg^{2+}

【答案】： D

32、患者，男性 32 岁，因支气管扩张合并感染入院，昨日出现大咯血，提示患者 24 小时咯血量超过()

- A、100ml
- B、300ml
- C、500ml
- D、700ml
- E、1000ml

【答案】： C

33、气道异物梗阻患者胸部冲击法用力的部位在患者的 0

- A、胸骨上部
- B、胸骨中部
- C、胸骨下部
- D、剑突部

【答案】： B

34、腹部检查下列哪项错误 0

- A、振水音见于幽门梗阻
- B、肋下扪及肝脏提示肝大
- C、脾脏正常时不能扪及
- D、肠鸣音消失可见于肠麻痹
- E、腹主动脉搏动正常人可触到

【答案】： B

35、有机磷农药中毒最早出现的临床表现是 0

- A、平滑肌痉挛和腺体分泌增加
- B、全身肌肉发生强直性痉挛
- C、头痛、头晕、乏力
- D、共济失调
- E、谵妄、意识障碍

【答案】： A

36、危重症患者家属最主要的心理需求为 0

- A、病情保障与获取信息
- B、照顾患者
- C、接近患者
- D、获得支持
- E、自身舒适

【答案】： A

37、判断甲状腺功能亢进程度的主要依据是 0

- A、体温、呼吸
- B、血压、脉搏
- C、体重、食欲
- D、突眼程度
- E、睡眠时间

【答案】： B

38、适用于卷轴带开始及终了的包扎方法是 0

- A、蛇形
- B、螺旋形
- C、“8”字形
- D、环形
- E、螺旋反折形

【答案】： D

39、气道异物梗阻腹部冲击法用力的方向为 0

- A、向内向上
- B、向内向下
- C、向外向上
- D、向外向下

【答案】： A

40、风湿性心瓣膜病最易累及的是 0

- A、二尖瓣
- B、主动脉瓣
- C、三尖瓣
- D、二尖瓣+三尖瓣
- E、主动脉+肺动脉瓣

【答案】： A

41、发生火灾逃生时，错误的选项是 0

- A、走安全通道
- B、用湿毛巾捂住口鼻
- C、最低姿势匍匐前进
- D、乘坐电梯

【答案】： D

42、患者，女性，58岁，慢性支气管炎病史10年，慢阻肺病史5年。护士在夜间查房时发现患者剧烈咳嗽后突感上胸刺痛、胸闷、呼吸困难，不能平卧，查体：左侧胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音，听诊左肺呼吸音明显减弱，应考虑为 0

- A、肺梗死
- B、急性心肌梗塞
- C、自发性气胸
- D、支气管哮喘
- E、胸腔积液

【答案】： C

43、气管插管的适应症为 0

- A、颈椎骨折脱位
- B、主动脉瘤压迫气管
- C、喉头水肿
- D、呼吸道分泌物过多

【答案】： D

44、最简单、有效的临时止血方法为 0

- A、加压包扎止血法
- B、指压止血法
- C、屈肢加垫止血法
- D、填塞止血法

【答案】： A

45、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颏法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

46、以下患者可以立即转送的是 0

- A、腹腔内出血未控制
- B、休克患者
- C、大腿骨折未固定
- D、急性左心素竭
- E、肠膨出已行腹部包扎

【答案】： E

47、急救婴儿现场判断意识的方法为 0

- A、呼唤婴儿
- B、拍打肩部
- C、指压人中
- D、摇晃头部

【答案】： C

48、血红蛋白低于或等于?时，应嘱患者卧床休息，活动时动作要缓慢，避免突然体位改变()

- A、30g/L
- B、40g/L
- C、60g/L
- D、80g/L
- E、100g/L

【答案】： C

49、下列哪一项是多发伤的临床特点)

- A、创伤后全身反应较轻，死亡率不高
- B、较少发生休克
- C、低氧血症发生率高
- D、多发伤等同于多处伤
- E、不易发生漏诊和误诊

【答案】： C

50、下面措施中，最能有效改善早期肺气肿症状的是 0

- A、促进痰液排出
- B、保证睡眠质量
- C、去除外界刺激因素
- D、呼吸功能锻炼
- E、处理并发症

【答案】： D

51、休克早期微循环灌流的特点是 0

- A、少灌少流
- B、多灌少流
- C、不灌不流
- D、少灌多流

E、多灌多流

【答案】： A

52、如果一次注入洗胃液过多会引起 0

A、胃内压升高引起反射性心跳加快

B、胃内压降低引起反射性心跳廉停

G、胃内压升高毒物吸收增加

D、胃内压降低毒物吸收增加

【答案】： C

53、休克代偿期血压的变化)

- A、收缩压下降，脉压正常
- B、血压无变化
- C、收缩压正常，脉压小
- D、收缩压正常，脉压大
- E、收缩压升高，脉压大

【答案】： C

54、见尿补钾要求成人每小时尿量不少于()

- A、10ml
- B、30ml
- C、50ml
- D、70ml
- E、90ml

【答案】： B

55、患者，男性，30岁。 一小时前5米高处坠落，由同事送至医院，根据创伤机制

能量来源分类，该创伤能量成分为0

- A、热力学能量
- B、电力学能量
- C、机械能量(√)
- D、化学能量
- E、放射学能量

【答案】： C

56、对清除肠内毒物有积极意义的洗胃时限是 0

- A、食物中毒 3 小时内
- B、食物中毒 4 小时内
- C、食物中毒 6 小时内
- D、食物中毒 8 小时内
- E、食物中毒 10 小时内

【答案】： C

57、抢救病人中护士进行的工作下列哪项不正确 0

- A、口头医嘱复诵后再执行
- B、用完的空安瓿应及时处理
- C、抢救后应及时请医生补写医嘱
- D、抢救记录字迹清晰及时准确
- E、医生未到时可先建立静脉通道

【答案】： B

58、溺水者控水，不正确的方法是 0

- A、在溺水者腹部放一小锅，然后按压背部排水
- B、利用地面的自然斜坡排水
- C、将溺水者放在牛背上，让牛奔跑将水排出
- D、倒立法

【答案】： C

59、电动吸引器吸痰每次插入导管吸引不超过 0

- A、5s
- B、10s
- C、15s
- D 、20s
- E 、25s

【答案】： C

60、患者男性，45 岁。护士为其测得的血压值为 145\95mmHg,该患者的血压属于

0

- A、理想血压
- B、正常血压
- C、临界高血压
- D、高血压
- E、单纯收缩期高血压

【答案】： D

61、EC 手法 E 的作用是 0

- A、触摸颈动脉
- B、按压颈部
- C、固定面罩
- D、开放气道

【答案】： D

62、膀胱刺激征是指 0

- A、尿失禁、尿多
- B、排尿困难、尿滴沥
- C、尿痛、尿急
- D、夜尿增多、尿频
- E、尿频、尿急、尿痛

【答案】： E

63、药品冰箱温度应维持在什么范围?0

- A、2-6℃
- B、2-8℃
- C、3-8℃
- D、4-6℃

【答案】： B

64、一旦心搏骤停患者恢复自主循环，理想的目标是以最低的 FiO₂

将血氧饱和度
水平维持在 0

- A、80%以下
- B、85%~100%
- C、90%~100%
- D、94%~100%
- E、100%以上

【答案】： D

65、现场心肺复苏操作首要步骤是 0

- A、心前区叩击
- B、心脏按压
- C、口对口人工呼吸
- D、按额托项，保持呼吸道通畅
- E、心内注射

【答案】： D

66、呕吐、头痛、嗜睡、深快呼吸，
呼气可闻烂苹果。患者出现的可能情况是 0

- A、糖尿病酮症酸中毒
- B、呼吸衰竭
- C、颅内压升高
- D、低血糖
- E、脑血管意外

【答案】： A

67、对火灾抢救出来的伤员，应首先 0

- A、给予充足的饮食再送医院
- B、询问火灾原因
- C、采取各种适当的方法进行现场救护再送医院
- D、得到亲友的陪伴在进行抢救治疗

【答案】： C

68、心绞痛发作的主要原因 0

- A、主动脉狭窄
- B、主动脉关闭不全
- C、全身小动脉痉挛
- D、冠状动脉狭窄或畸形
- E、肺动脉痉挛

【答案】： D

69、患者患有心脏病但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸

困难或心绞痛。其心功能分级应为 0

- A、心功 1 能级
- B、 心功能 2 级
- C、 心功能 3 级
- D、 心功能 4 级
- E、以上都不是

【答案】： A

70、胸部冲击伤最严重的并发症是 0

- A、血胸
- B、气胸
- C、ARDS
- D、肺不张
- E、肺破裂

【答案】： C

71、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 0

- A、脉快，呼吸急促
- B、脉快，血压降低
- C、脉快，血压高
- D、脉慢，呼吸慢

E、脉慢，血压低

【答案】： D

72、患者女性，43 岁。中午饱餐后出现上腹部绞痛，同时向腰背部呈带状放射，已持续 6 小时。怀疑为急性胰腺炎，此时最具诊断意义的实验室检查为 0
A、

白细胞计数

- B、血清淀粉酶测定
- C、尿液淀粉酶测定
- D、血清脂肪酶测定
- E、血清谷丙转氨酶

【答案】： B

73、心脏骤停首选的治疗措施是 0

- A、心肺复苏
- B、安置起搏器
- C、开通静脉输液
- D、通畅呼吸道
- E、高浓度吸氧

【答案】： A

74、地震被埋时如果一时不能脱险，应如何自救?0

- A、设法将手脚挣脱出来，推开压在身上的物体，使呼吸通畅
- B、不管是否受伤，都要用力向外抽拉身体
- C、使用明火求救
- D、搬开身边杂物，扩大活动空间

【答案】： A

75、中暑时最容易发生肌肉痉挛的是 0

- A、腹直肌
- B、腓肠肌
- C、胸大肌
- D、咀嚼肌
- E、面肌

【答案】： B

76、有关骨折急救处理，下列哪项错误)

- A、

首先应止血及包扎伤口

- B、无夹板时，可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架
- C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定
- D、脊椎骨折患者不可采取手法复位
- E、搬动脊椎骨折患者时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法

【答案】： E

77、电流击伤对人的致命作用是 0

- A、引起心室颤
- B、诱发心动过速
- C、导致心室血流减慢
- D、造成心肌缺血

【答案】： A

78、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颊法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

79、火灾急救处理“三防”是指 0

- A、防休克、防中毒、防窒息
- B、防窒息、防跳楼、防奔跑
- C、防休克、防感染、防中毒
- D、防休克、防窒息、防感染

【答案】： D

80、下列止血方法中，最后在万不得已的情况下选用的是 0

- A、指压止血
- B、加垫屈肢止血
- C、填塞止血

D、止血带止血

E、 穴道止血

【答案】： D

81、病人心肺复苏后，脑复苏的主要措施是 0

- A、维持有效的循环
- B、确保呼吸道通畅
- C、降温和脱水疗法
- D、加强基础护理
- E、治疗原发疾病

【答案】： C

82、消化性溃疡最常见的并发症是 0

- A、穿孔
- B、出血
- C、幽门梗阻
- D、感染
- E、癌变

【答案】： B

83、患者，男性，70 岁，突发急性广泛心肌梗死，经治疗疼痛有所好转，继而出现

呼吸困难、咳嗽、发绀、咳大量粉红色泡沫痰，其咳嗽病因是 0

- A、急性肺淤血
- B、急性肺不张
- C、急性肺水肿
- D、急性肺炎
- E、急性胸膜炎

【答案】： C

84、四肢大动脉出血或采用加压包扎后不能有效控制的大出血应采用 0

- A、加压包扎止血法
- B、按压止血法
- C、指压止血法
- D、止血带止血法
- E、用止血钳直接夹闭血管的断端

【答案】： D

85、被目击的非创伤心跳骤停患者中最常见的心律为 0

- A、心脏停搏
- B、无脉性室颤
- C、室颤
- D、电-机械分离
- E、室上性心动过速

【答案】： C

86、患者，女性，40 岁，车祸时头部受伤，出现头痛、呕吐而急诊入院。为预防脑水

肿，降低颅内压，应采取的体位是 0

- A、端坐卧位
- B、头高足低位
- C、半坐卧位
- D、头低足高位
- E、中凹卧位

【答案】： B

87、高血压脑出血的主要发病机制是 0

- A、小动脉壁受损出血
- B、微动脉瘤的形成与破裂
- C、脑淀粉样血管病
- D、脑软化后出血

E、脑动脉结构异常

【答案】： B

88、有机磷农药中毒的中毒机理是 0

- A、麻醉作用
- B、抑制酶的活力作用
- C、局部刺激、腐蚀作用
- D、干扰细胞膜和细胞器的生理功能

【答案】： B

89、患者，女性，35 岁。因头部外伤报诊为”脑挫裂伤”急诊入院。接诊时发现， 患者神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。该患者目前最确切的首要护理诊断是 0

- A、有窒息的危险
- B、气体交换受损
- C、有受伤的危险
- D、有感染的危险
- E、有脑疝的危险

【答案】： A

90、患者，男性，52 岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量 血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清， BP75/46mmHg R38 次/分，心率 126 次/分，律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、 循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

91、脑出血患者降低颅内压，控制脑水肿时应使用 0

- A、复方氯化钠
- B、碳酸氢钠

C、甘露醇

D、葡萄糖

E、氯化钠

【答案】： C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/626142025221010143>