

## 2024 年广西壮族自治区大新县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库大全含答案【综合题】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 氯霉素的抗菌作用机制是()

- A: 抑制细菌的 DNA 合成
- B: 干扰细菌的 RNA 转录
- C: 干扰细菌的细胞壁合成
- D: 抑制细菌的蛋白质合成

答案：D

2. 适用于肠道菌群失调引起腹泻的药物是

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 酪酸菌
- C: 乳酶生
- D: 乳酸菌

答案：A

3. (2020 年真题) 可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

- A: 乳酸钠注射液
- B: 门冬氨酸钾镁注射液
- C: 葡萄糖注射液
- D: 二磷酸果糖注射液

答案：D

4. 下列硝酸酯药物相互作用中，可以合用的是

- A: 与硝普钠合用
- B: 与西地那非合用
- C: 与他汀类药物合用
- D: 与麻黄碱合用

**答案：C**

5. 服用地西泮后病情不会加重的是

- A: COPD
- B: 高血压
- C: 重症肌无力
- D: 抑郁症

**答案：B**

6. 在骨组织中分布浓度高，可用于骨和关节的感染的是

- A: 红霉素
- B: 万古霉素
- C: 替硝唑
- D: 克林霉素

**答案：D**

7. 下述保肝药中属于解毒类的是()

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 硫普罗宁
- C: 甘草酸二铵
- D: 复方甘草酸苷

**答案：B**

8. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

- A: 环氧酶抑制剂
- B: 整合素受体阻断剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 二磷酸腺苷 P2Y<sub>12</sub> 受体阻断剂

**答案：A**

9. 属于核苷(酸)类抗肝炎病毒药的是

- A: 阿昔洛韦
- B: 司他夫定
- C: 恩替卡韦
- D: 奥司他韦

**答案：C**

10. 下列不属于双膦酸盐类药物的是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 帕米膦酸二钠
- C: 依替膦酸二钠
- D: 阿法骨化醇

**答案：D**

11. 糖皮质激素对血液系统的影响不包括

- A: 提高纤维蛋白原浓度
- B: 使红细胞含量增加
- C: 减少淋巴细胞
- D: 使血小板数量下降

**答案：D**

12. 治疗立克次体感染所致斑疹伤寒应首选

- A: 庆大霉素
- B: 链霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

**答案：C**

13. 红霉素的作用机制是()

- A: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程
- B: 与核糖体 70S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- D: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

**答案：D**

14. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶IV的药物是()

- A: 异烟肼
- B: 红霉素
- C: 氧氟沙星
- D: 阿莫西林

**答案：C**

15. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

- A: 氯霉素眼膏
- B: 左氧氟沙星滴眼剂
- C: 红霉素眼膏
- D: 阿托品滴眼剂

**答案：B**

16. 属于第三代头孢菌素的药物是()。

- A: 头孢氨苄
- B: 头孢拉定
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢吡肟

**答案：C**

17. 体内缺乏维生素 B1 会导致

- A: 贫血
- B: 不孕症
- C: 脚气病
- D: 脂溢性皮炎

**答案：C**

18. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m<sup>2</sup>，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

- A: 呋塞米
- B: 阿托伐他汀
- C: 贝那普利
- D: 氨氯地平

**答案：A**

19. 易引起吉海反应的药物是()

- A: 庆大霉素
- B: 青霉素
- C: 诺氟沙星
- D: 四环素

**答案: B**

20. 羟基脲属于()

- A: DNA 多聚酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

**答案: D**

21. 下列哪类药物属于快速杀菌药()

- A: 红霉素
- B: 氯霉素类
- C: 多黏菌素 B
- D: 氨基糖苷类

**答案: D**

22. 不作为高血压治疗的首选药，临床适用于伴前列腺增生症的高血压患者或与其他药物联合用于顽固性高血压治疗的药物是()

- A: 可乐定
- B: 肾素抑制剂
- C: 甲基多巴
- D: 特拉唑嗪

**答案：D**

23. 属于胃黏膜保护剂的是()

- A: 奥美拉唑
- B: 胃蛋白酶
- C: 莫沙必利
- D: 胶体果胶铋

**答案：D**

24. 氨基苷类抗生素的抗菌机制是

- A: 抑制细菌细胞壁的合成
- B: 影响胞浆膜的通透性
- C: 抑制蛋白质合成的全过程
- D: 影响叶酸代谢

**答案：C**

25. 风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

- A: 常规剂量的洋地黄
- B: 停用洋地黄
- C: 快速洋地黄化
- D: 不宜使用洋地黄

**答案：D**

26. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用()

- A: 2%过氧化氢溶液
- B: 3%过氧化氢溶液
- C: 2%酚甘油滴耳液
- D: 3%酚甘油滴耳液

**答案：B**

27.  $\beta$ -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

- A: 影响胞浆膜的通透性
- B: 抑制细菌细胞壁的合成
- C: 抑制蛋白质合成的全过程
- D: 影响叶酸代谢

**答案：B**

28. 关于青霉素不良反应的说法不正确的是

- A: 可引起接触性皮炎、血清病样反应等
- B: 有明显的肾毒性和耳毒性
- C: 可发生过敏性休克、荨麻疹、血管神经性水肿等
- D: 局部刺激症状如注射部位疼痛、硬结较常发生

**答案：B**

29. 属于抗流感病毒药的是

- A: 恩替卡韦
- B: 司他夫定
- C: 阿昔洛韦
- D: 奥司他韦

**答案：D**

30. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

- A: 低氯碱血症
- B: 血小板增多
- C: 低血糖
- D: 高钾血症

**答案：D**

31. 通过阻断血管紧张素 II 受体而治疗慢性心功能不全的药物是()

- A: 美托洛尔
- B: 地高辛
- C: 氨力农
- D: 氯沙坦

**答案：D**

32. 可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是

- A: 过氧苯甲酰
- B: 异维 A 酸
- C: 克林霉素
- D: 阿达帕林

**答案：B**

33. 属于治疗中枢性尿崩症用药的是

- A: 左甲状腺素
- B: 甲巯咪唑
- C: 醋酸去氨加压素
- D: 生长抑素

**答案：C**

34. 应用雌激素时需要停药的指征是

- A: 肝功异常
- B: 性欲改变
- C: 突破性出血
- D: 乳房胀痛

**答案：C**

35. 关于万古霉素，描述错误的是

- A: 肾功能不全者无需调整剂量
- B: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染
- C: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- D: 属于杀菌剂

**答案：A**

36. (2019 年真题) 选择性沉积在牙齿和骨骼中，不可用于 8 岁以下患儿的药物是 ( )

- A: 氟喹诺酮类
- B: 氨基糖苷类
- C: 四环素类
- D: 大环内酯类

**答案：C**

37. (2015 年真题) 具有心脏毒性的抗肿瘤药是 ( )。

- A: 博来霉素
- B: 柔红霉素
- C: 长春新碱
- D: 紫杉醇

**答案：B**

38. 属于 IC 类抗心律失常药的是

- A: 普罗帕酮
- B: 奎尼丁
- C: 普鲁卡因胺

D: 胺碘酮

**答案：A**

39. 服用时必须坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是

A: 阿仑膦酸钠

B: 依降钙素

C: 雷洛昔芬

D: 依普黄酮

**答案：A**

40. 可以与青霉素 G 混合的是

A: 维生素 C

B: 维生素 B 族

C: 生理盐水

D: 葡萄糖注射液

**答案：C**

41. 喷托维林为中枢性镇咳药。

A: 沙丁胺醇

B: 噻托溴铵

C: 氨溴索

D: 喷托维林

**答案：D**

42. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

A: M 受体拮抗剂

B: 白三烯受体阻断剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D:  $\beta_2$  受体激动剂

**答案: B**

43. 具有低毒，可用于对青霉素类、头孢菌素类过敏的患者的药物是()

A: 亚胺培南

B: 氨曲南

C: 克拉维酸

D: 阿莫西林

**答案: B**

44. 5-羟色胺再摄取抑制剂与单胺氧化酶制剂合用，出现不安、肌阵挛、多汗、震颤、腹泻、高热、抽搐和精神错乱等不良反应，严重者可导致死亡的现象称为

A: 戒断反应

B: 5-HT 综合征

C: 锥体外系反应

D: “宿醉”现象

**答案: B**

45. (2016 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是

A: 肌酸激酶

B: 碱性磷酸酶

C: 乳酸脱氢酶

D: 尿淀粉酶

**答案: A**

46. (2019 年真题) 同时抑制 5-HT 及去甲肾上腺素 (NE) 再摄取而起到抗抑郁作用的药物是 ( )

- A: 度洛西汀
- B: 马普替林
- C: 帕罗西汀
- D: 吗氯贝胺

**答案: A**

47. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是 ( )。

- A: 头孢他啶
- B: 利奈唑胺
- C: 头孢曲松
- D: 罗红霉素

**答案: A**

48. 以下不属于抗雌激素类药物的是

- A: 来曲唑
- B: 氟他胺
- C: 托瑞米芬
- D: 他莫昔芬

**答案: B**

49. 过量引起严重心脏毒性的是

- A: 哌唑嗪
- B: 卡托普利
- C: 氨氯地平
- D: 地高辛

**答案：D**

50. 用于高钾血症或普鲁卡因胺引起的心律失常伴有酸血症者的药品是  
( )

- A: 氯化钾
- B: 乳酸钠
- C: 硫酸镁
- D: 谷氨酸

**答案：B**

51. 下列说法中错误的是

- A: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药
- B: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑
- C: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬
- D: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者

**答案：D**

52. 可引起眼睛疼痛不适的是

- A: 氨溴索
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 异丙托溴铵
- D: 茶碱

**答案：C**

53. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

- A: 更昔洛韦
- B: 恩替卡韦
- C: 阿昔洛韦

D: 金刚烷胺

**答案: B**

54. 与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A: 右雷佐生月德

B: 甲氨蝶呤

C: 阿糖胞苷

D: 柔红霉素

**答案: D**

55. 氯霉素类

A: 禁用于早产儿、新生儿

B: 禁用于 8 岁以下儿童

C: 禁用于胆道阻塞患者

D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

**答案: A**

56. 中毒后可用等剂量维生素 B

A: 利福平

B: 对氨基水杨酸

C: 异烟肼

D: 乙胺丁醇

**答案: C**

57. 可用于吗啡中毒解救的药物是

A: 纳洛酮

B: 苯甲酸钠咖啡因

C: 阿托品

D: 氟马西尼

**答案: A**

58. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 长期应用者突然停药可发生反跳现象

B: 糖脂代谢异常时首选  $\beta$  受体阻断剂

C: 老年高血压患者一般首选  $\beta$  受体阻断剂

D: 作为一级预防，降低心肌梗死死亡率

**答案: A**

59. 可能导致耳蜗神经和肾损害的抗菌药物是

A: 庆大霉素

B: 多西环素

C: 加替沙星

D: 甲砒霉素

**答案: A**

60. (2021 年真题) 用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是 ( )

A: 毛果芸香碱滴眼液

B: 聚乙二醇滴眼液

C: 雷珠单抗注射液

D: 硫酸阿托品眼用凝胶

**答案: D**

61. 巨幼细胞贫血可选用

A: 香豆素类

- B: 维生素 K1
- C: 维生素 B12
- D: 肝素

**答案：C**

62. 叶酸可用于治疗

- A: 妊娠期巨幼细胞贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 小细胞低色素性贫血
- D: 甲氨蝶呤、乙胺嘧啶所致巨幼细胞贫血

**答案：A**

63. 糖尿病和胰腺炎血症患者应慎用的药物是

- A: 螺内酯
- B: 甘露醇
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

**答案：C**

64. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12 小时以上间歇期的药物是  
( )

- A: 依那普利
- B: 哌唑嗪
- C: 硝酸甘油
- D: 氨氯地平

**答案：C**

65. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

- A: 氯化钾
- B: 氯化钙
- C: 枸橼酸钾
- D: 氯化钠

**答案：D**

66. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下, 请结合问题作答。

- A: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- B: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时, 应停用 ACEI 36 小时后方可转换
- C: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- D: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

**答案：C**

67. 属于容积性泻药的是()

- A: 番泻叶
- B: 欧车前
- C: 利那洛肽
- D: 多库酯钠

**答案：B**

68. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌引起的肺炎宜选用()

- A: 氟康唑
- B: 克林霉素
- C: 万古霉素
- D: 阿奇霉素

**答案：C**

69. 抑制胃酸分泌作用最强的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 西咪替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 尼扎替丁

**答案：C**

70. 恶性性祛痰药尤其适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰患者的药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氯化铵
- C: 氨溴索
- D: 溴己新

**答案：B**

71. 寻常痤疮、鱼鳞病及银屑病可选用()

- A: 维 A 酸
- B: 林旦霜
- C: 酮康唑
- D: 阿达帕林

**答案：A**

72. 维生素 D 缺乏时会导致()

- A: 角膜软化症
- B: 成人佝偻病
- C: 脚气病
- D: 坏血病

**答案：B**

73. 主要结构与雄激素颇为相似，但雄性化作用甚弱，蛋白同化作用很强，临床上可作为升白药物使用的是

- A: 维生素 B<sub>4</sub>
- B: 丙酸诺龙
- C: 小檗胺
- D: 鲨肝醇

**答案：B**

74. 治疗黏液性水肿的药物是

- A: 硫脲类
- B: 普萘洛尔
- C: 甲状腺片
- D: 硫脲类+大剂量碘

**答案：C**

75. 下述药物中长期使用易产生耐受性的药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C:  $\beta$
- D: M 受体拮抗剂

**答案：C**

76. 以下维生素在注射前需要进行皮肤敏感试验的是

- A: 维生素 B<sub>1</sub>
- B: 维生素 B<sub>2</sub>
- C: 维生素 B<sub>6</sub>
- D: 维生素

**答案：A**

77. 慢性充血性心力衰竭宜

- A: 常规剂量的洋地黄
- B: 停用洋地黄
- C: 快速洋地黄化
- D: 不宜使用洋地黄

**答案：A**

78. 假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生态制剂是()

- A: 枯草杆菌
- B: 双歧三联活菌
- C: 粪肠球菌
- D: 酪酸菌

**答案：D**

79. 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 血压升高或降低、心率加快调
- B: 头痛、胸闷、气急、出汗
- C: 发热、血管扩张、面色潮红
- D: 喉头水肿、尿潴留

**答案：D**

80. 通过刺激胰岛  $\beta$  细胞分泌胰岛素，存在“继发失效”问题的降血糖药()

- A: 艾塞那肽
- B: 阿卡波糖
- C: 格列本脲

D: 二甲双胍

**答案: C**

81. 糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

A: 甘油

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 聚乙二醇 4000

**答案: A**

82. (2017 年真题) 具有磺胺类药物结构, 作用于近曲小管的利尿药是  
( )

A: 螺内酯

B: 乙酰唑胺

C: 呋达帕胺

D: 氢氯噻嗪

**答案: B**

83. 儿童使用强效激素制剂, 连续不应超过

A: 3~5 天

B: 5~7 天

C: 3 天

D: 2 周

**答案: D**

84. 对军团菌有效的药物是

A: 阿奇霉素

B: 链霉素

C: 两性霉素 B

D: 甲硝唑

**答案: A**

85. 对于万古霉素，描述错误的是

A: 快速静滴会出现红人综合征

B: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用

C: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

D: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

**答案: B**

86. (2021 年真题) 关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法，错误的是 ( )

A: 与血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 合用具有协同作用

B: 血钾水平  $>5$

C: 通过抑制脑啡肽酶，同时阻断血管紧张素 II 的 1 型受体 (AT1) 起效

D: 适用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV 级，LVEF  $\leq 40\%$ ) 成年患者

**答案: A**

87. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

A: 地尔硫?

B: 氨氯地平

C: 依那普利

D: 比索洛尔

**答案: D**

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/626150010101011030>