

2022~2023 四小证考试题库及答案

1. 救生艇上额定乘员每人配备淡水 3 升，救生筏每人配备 1.5 升。

正确答案：

正确

2. 舱内装载散装粮食，又未进行通风而发生火灾是属于\_\_\_\_\_。

A. 燃烧

B. 受热自燃

C. 自热自热

正确答案：

C

3. 联邦止咳露不属于镇咳药

正确答案：

错误

4. 救生艇内应装有额定乘员每人 1.5 升的淡水。

正确答案：

错误

5. 遇险者在无其他饮水来源的情况下，第一天不供给淡水和进食。

正确答案：

正确

6. 船舶在港内发生火灾，船方应先自力灭火，再向港口消防队报警。

正确答案：

错误

7. 治疗冻伤应尽快脱离寒冷环境，做好全身或局部保暖

正确答案：

正确

8. 建议改成“紧急逃生呼吸器（EEBD）是一个自给式压缩空气呼吸保护装置，至少使用\_\_\_\_\_分钟以上

A. 10

B. 20

C. 30

正确答案：

A

9. 当人体的体温下降到多少摄氏度以下时，就会昏迷：

A. 35°C以下

B. 28°C以下

C. 24°C以下

正确答案：

A

10. 胸廓由胸椎，12 对肋骨和一个胸骨构成。

正确答案：

正确

11. 胃属于内分泌系统。

正确答案：

错误

12. 心律平不是广谱抗心律失常药。

正确答案：

错误

13. 倍他洛克也适用于治疗各型高血压及心绞痛。

正确答案：

正确

14. 低温水中，对落水人员最大的威胁是过冷现象。

正确答案：

正确

15. 根据 MSC/Cir850 通函，船舶消防设备检查保养体系文件不包括

A. 消防设备的操作使用说明书

B. 设备保养与修理指导书

C. 设备备件项目表

正确答案：

A

16. III度烧伤是指皮肤全层烧伤，有时甚至深达皮下组织及肌肉，骨骼，伤员常有局部感觉

A. 过敏

B. 减弱

C. 丧失

正确答案：

C

17. 落水者被迅速冻死是由于 \_\_\_\_\_因素决定的。①人体体表隔热保温能力差②水的导热速度很快

A. ①

B. ②

C. ①②

正确答案：

B

18. 心痛定是治疗高血压的药

正确答案：

正确

19. 船上医疗手术操作中，手术人员双手及前臂消毒，浸泡于85%的酒精相比75%的酒精效果好。

正确答案：

错误

20. 地高辛不属于强心药。

正确答案：

错误

21. 高压二氧化碳灭火系统是多数船舶配备的固定灭火设备。负责船员应注意

A. 遥控释放箱被打开，整个二氧化碳系统就会被启动

B. 遥控释放箱被打开时，只是启动了报警及通风停止等辅助功能；此时二氧化碳气瓶并未被启动

C. 经常打开遥控释放箱的门，以检查其报警功能是否正常

正确答案：

B

22. 易燃液体溢出时，会扩散很大面积，释放出大量的蒸汽，一旦被点燃，燃烧猛烈，放出大量的热

正确答案：

正确

23. II度以上烧伤创面应予伤口清创，用碘伏或洗必泰外涂。

正确答案：

正确

24. 必嗽平不是祛痰药。

正确答案：

错误

25. 为了增加获救机会，艇筏应停留在失事地点的附近：

A. 1~ 2 天

B. 2~3 天

C. 5~6 天

正确答案：

B

26. 消化系统由食管，胃，小肠，大肠组成。

正确答案：

错误

27. 火箭降落伞火焰信号，垂直的发射高度可达：

A. 500 米以上

B. 300 米以上

C. 100 米以上

正确答案：

B

28. 估计烧伤的面积可采用（）

A. 九分法，手掌法

B. 新九分法，九分法和手掌法

C. 新九分法和手掌法

正确答案：

C

29. 落水者体温下降的速度取决于

- A. 水流速度
- B. 水深
- C. 水温

正确答案：

C

30. 呼吸器每次使用后，应清洁消毒并补充氧气，为消除异味，可放在日光下晾晒。

正确答案：

错误

31. 无线电示位标，当其处于 2 米~4 米深的静水压下，将自动释放信号。

正确答案：

错误

32. 海面上有油火，落水者需换气时，应先将手探出水面旋转拨开油火，头出水后立即转身面向 \_\_\_\_ 作深呼吸。

- A. 上风
- B. 横风
- C. 下风

正确答案：

C

33. 无菌盐水及酒精棉球每周灭菌一次。

正确答案：

错误

34. 橙黄色烟雾信号在引燃后应抛向：

- A. 上风舷外
- B. 下风舷外
- C. 艇尾后

正确答案：

B

35. 灭火情报决策是火场指挥官指挥活动中最重要, 最复杂的决策

正确答案：

错误

36. 复方甘草剂属于祛痰药

正确答案：  
正确

37. 应变部署表由大副按要求在开航前填写, 并交船长审查签字

正确答案：  
错误

38. 脊柱损伤后, 容易造成肢体瘫痪, 大小便失禁。

正确答案：  
正确

39. 弃船后使求生者丧生的主要原因是

- A. 缺水
- B. 缺食物
- C. 身体暴露在寒冷水中

正确答案：  
C

40. 卫星应急示位标是船舶在遇险时的通信工具之一。

正确答案：  
正确

41. 对有毒物品中的氰化钾火灾最适宜的灭火剂是\_\_\_\_\_

- A. 二氧化碳
- B. 泡沫
- C. 水或沙土

正确答案：  
C

42. II度以上烧伤创面应予伤口清创, 用碘伏或洗必泰涂

正确答案：  
错误

43. 只要怀疑肾绞痛就可注射杜冷丁, 以减轻病人的痛苦。

正确答案：  
错误

44. 下列不属于船舶消防设备的是

- A. 各种固定式灭火系统和灭火器
- B. 自动探火设备
- C. 各种泵

正确答案:

C

45. 联邦止咳露不属于镇咳药。

正确答案:

错误

46. 用水枪扑救关闭着的门后大火, 首先要把充满水的水龙带配置在门外, 然后\_\_\_\_\_

- A. 把门全部敞开, 用水雾喷扫
- B. 把门半开, 用直水流喷射
- C. 把门稍微打开, 用水雾喷扫

正确答案:

C

47. 心绞痛可含服硝酸甘油止痛

正确答案:

正确

48. 一旦某个航次船员的组成情况有所变更, 则应急时的任务及各岗位职责也随之变更

正确答案:

错误

49. 在系泊期间发生火灾, 当岸方消防队到达现场后, 船方应积极协助消防队选择进攻路线

正确答案:

错误

50. 人发生死亡的体温是\_\_\_\_\_ 以下。

- A. 24 °C ~26 °C
- B. 26 °C ~28 °C
- C. 28 °C ~30 °C

正确答案:

A

51. 电影, 幻灯, 录像及多媒体课件等可作为防火教育中对船员进行正式训练的一种方式

正确答案:

正确

52. 肛门体温 38.5 °C属于 ( )

A. 正常

B. 低热

C. 高热

正确答案:

B

53. 对头颈部, 会阴部创面宜用暴露法, 另外大面积创伤也用暴露法。

正确答案:

正确

54. 二氧化碳也可扑灭金属火, 只是效果不佳, 通常不采用

正确答案:

错误

55. 形成蓄热自燃的热的热能都是由于本身物理作用, 化学反应或生物效能产生的

正确答案:

正确

56. 一旦找出隐藏的火灾位置, 在救助人缘和水龙带未就绪之前, 不要打开通往这个地区的门, 以防火势迅速扩大

正确答案:

正确

57. 船在系泊期间发生火灾, 有时为了灭火的需要, 消防队员要进行破拆, 应征得船长的同意。

正确答案:

正确

58. 只要怀疑肾绞痛就可注射杜冷丁, 以减轻病人的痛苦

正确答案:

错误

59. 误食铝化合物中毒时,可用 1% 硫酸镁洗胃,后口服硫酸镁 30 克导泻

正确答案:

正确

60. 西地兰一般口服给药。

正确答案:

错误

61. 在船舶灭火指挥决策中,组织决策只能在灭火战斗之前进行

正确答案:

错误

62. 具备了三要素不一定会发生燃烧,只有当三个条件相互结合相互作用才有可能形成燃烧

正确答案:

正确

63. 对于海上求生者来说食物比淡水更为重要。

正确答案:

错误

64. “船舶高级消防”培训的重点内容是

- A. 灭火战术和指挥和消防器材的使用
- B. 消防应变组织与协调和灭火战术和指挥
- C. 船舶日常消防管理

正确答案:

B

65. 西地兰属于强心药。

正确答案:

正确

66. 不燃材料是指某种材料被加热至 \_\_\_\_度时,既不燃烧,也不发生足量的能造成自燃气体的材料

A. 925

B. 750

C. 821

正确答案：

B

67. 船舶常见的液体燃料包括燃油、润滑油、柴油、煤油、油漆及其他溶剂等。

正确答案：

正确

68. 在装有白糖货物的舱门进行装卸货时，可以在舱内吸烟

正确答案：

错误

69. 船舶应\_\_\_\_\_定期进行防火检查，对检查出的问题应尽快进行整改。

A. 每天

B. 每月

C. 每年

正确答案：

B

70. 无线电话的工作频率为 2 1 8 1 KHZ 。

正确答案：

正确

71. 体循环动脉内流动的血液含氧量和营养物质

A. 少

B. 多

C. 不确定

正确答案：

B

72. 应急无线电设有手动或自动发射装置。

正确答案：

正确

73. 船在系泊期间发生火灾，有时为了灭火的需要，消防队员要进行破拆，应征得船长同意

正确答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/626150210025010050>