

2024 年河北省望都县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整版附参考答案（A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 妊娠期应用可引起胎儿性发育异常的药物是

- A: 雌孕激素、雄激素
- B: 阿司匹林
- C: 沙利度胺
- D: 叶酸拮抗剂

答案：A

2. 下列足癣类型中，以冬季多见或加重的是

- A: 鳞屑型
- B: 角化型
- C: 间擦型
- D: 水疱型

答案：B

3. 治疗心力衰竭时，可抑制心肌重构和心肌纤维化的治疗药物不包括

- A: 血管紧张素转换酶抑制剂
- B: 血管紧张素 II 受体阻断剂
- C: 强心苷类药物
- D: 醛固酮受体阻断剂

答案：C

4. 过敏性结膜炎者宜选用的滴眼液是

- A: 色甘酸钠
- B: 磺胺醋酰钠
- C: 碘苷
- D: 维生素 B2

答案：A

5. (2018 年真题) 为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性, 将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估, 此药物经济学评价方法是 ()

- A: 成本-效益分析
- B: 成本-效用分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效果分析

答案：A

6. 对目标适应证患者治疗作用的初步评价是指

- A: III期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: 临床预试验
- D: II 期临床试验

答案：D

7. 脑出血

- A: 2~4 周
- B: 1~2 周
- C: 4~5 周
- D: 2~3 周

答案：A

8. 急性胰腺炎发病几小时，血清淀粉酶开始升高

- A: 2~12
- B: 12~72
- C: 1
- D: 48~72

答案：A

9. 以快速、准确地获得问题的答案是指

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 对文献进行评价、分析和整理
- C: 确立有效的检索方法、查阅文献
- D: 对问题进行确定并归类

答案：C

10. 促动力药

- A: 铝碳酸镁
- B: 多潘立酮
- C: 法莫替丁
- D: 埃索美拉唑

答案：B

11. 有关氰化物中毒的解救措施，错误的是

- A: 注射亚硝酸钠
- B: 给予亚硝酸异戊酯吸入
- C: 使用活性炭吸附
- D: 注射硫代硫酸钠

答案：C

12. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

A: C 级

B: X 级

C: A 级

D: D 级

答案：D

13. 药源性疾病是由药物诱发的疾病,是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

A: 药物制剂因素

B: 药理作用

C: 药动学相互作用

D: 药物的使用

答案：A

14. 医师开具处方应当使用

A: 通用名、新活性化合物的专利药品名称、卫计委公布的药品习惯名称

B: 通用名、商品名、卫计委公布的药品习惯名称

C: 通用名、商标名、新活性化合物的专利药品名称

D: 通用名、商标名、商品名

答案：A

15. 患者，男，72 岁，因“冠心病、高血压、2 型糖尿病”长期用药治疗，服用药物包括阿司匹林肠溶片、马来酸依那普利片、辛伐他汀片、富马酸比索洛尔片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片、硝酸甘油片。近日患者出现一些药物不良反应症状，前来药店咨询药师。

- A: ①②④⑤
- B: ①②③
- C: ①③⑤
- D: ①②③④⑤

答案：A

16. 阿莫西林片的适宜服药时间是

- A: 餐后
- B: 清晨
- C: 餐中
- D: 餐前

答案：D

17. 易吸湿的药品

- A: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧
- B: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装
- C: 可贮存于严密的药箱内
- D: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

答案：A

18. （2018 年真题）患者，男，65 岁，因腹胀，呕吐就诊，医生处方，甲氧氯普胺片 20mg tid po 该处方属于（）

- A: 有配伍禁忌
- B: 无适应证用药

C: 有禁忌证用药

D: 用法、用量不适宜

答案: D

19. 药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致血清总胆固醇升高的药物是

A: 氯氮平

B: 苯妥英钠

C: 阿司匹林

D: 胰岛素

答案: A

20. 消化性溃疡的注意事项中,服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者,长期服用 PPI,需补充

A: 维生素 C?

B: 维生素 B₁₂?

C: 维生素 E?

D: 维生素 D₃?

答案: B

21. 患者,女,24岁,患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻,实验室检查:Hb55g/L,血清铁 12 μg/L,首选的治疗方案是()

A: 注射维生素 B

B: 口服铁剂及维生素 C

C: 静脉滴注铁剂

D: 雄性激素治疗

答案: C

22. 饮茶可减少其吸收的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 去氨加压素
- D: 硫酸亚铁

答案：D

23. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用量为

- A: 0.1gtid
- B: 0.5gtid
- C: 0.2gqd
- D: 0.5gqd

答案：C

24. （2018 年真题）下列药物中，可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是（）

- A: 口服避孕药
- B: 阿司匹林
- C: 叶酸
- D: 银杏叶片

答案：A

25. 属于润滑性泻药的是

- A: 硫酸镁
- B: 乳果糖
- C: 开塞露
- D: 番泻叶

答案：C

26. I 类手术切口应用第三代头孢菌素，属于

- A: 过度治疗用药
- B: 无适应证用药
- C: 超适应证用药
- D: 不合理联合用药

答案：B

27. I 期临床试验

- A: 以特殊人群为给药对象
- B: 以患者为给药对象
- C: 以目标适应证患者为给药对象
- D: 以健康志愿者为给药对象

答案：D

28. 包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

- A: 三级信息源资料
- B: 二级信息源资料
- C: 网站信息
- D: 期刊论文

答案：B

29. (2017 年真题) 处方中外文缩写 OS. 代表 ()

- A: 左耳
- B: 左眼
- C: 右耳
- D: 双眼

答案：B

30. 严重烧伤患者尿常规检查可发现

- A: 尿血红蛋白阳性
- B: 尿葡萄糖阳性
- C: 尿胆红素阳性
- D: 尿淀粉酶增高

答案：A

31. 禁用阿朴吗啡催吐的毒物是()。

- A: 磷化锌
- B: 麻黄碱
- C: 麦角胺
- D: 阿片类药物

答案：D

32. 慢性肾小球肾炎常见

- A: 细胞管型
- B: 白细胞管型
- C: 颗粒管型、透明管型
- D: 蜡样管型

答案：C

33. 儿童空腹血糖检查（邻甲苯胺法）的正常参考区间是

- A: 3.9~6.1mmol/L
- B: 4.2~6.5mmol/L
- C: 3.3~5.0mmol/L
- D: 3.3~5.5mmol/L

答案：D

34. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 没有临床症状，无需治疗

B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

答案：D

35. 具有临床耐受性良好、无戒断效应特点的治疗失眠症药物为（）

A: 阿戈美拉汀

B: 小剂量米氮平

C: 艾司唑仑

D: 低剂量的多塞平

答案：D

36. 主要用于哮喘合并慢阻肺以及慢阻肺长期治疗的药品是

A: 噻托溴铵

B: 异丙托溴铵

C: 氨茶碱

D: 孟鲁司特

答案：A

37. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少头孢拉定主要会造成

A: 嗜酸性粒细胞减少

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 嗜碱性粒细胞增多

D: 中性粒细胞减少

答案：B

38. 人体贮存能量的形式为

A: 糖化血红蛋白

B: 三酰甘油

C: 高密度脂蛋白胆固醇

D: 胆固醇

答案：B

39. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

B: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

C: 瑞格列奈片应于餐前服用

D: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

答案：B

40. 心衰导致药物经肾排泄减少

A: 肾血流量减少

B: 肾小管重吸收增加

C: 肾小管分泌减少

D: 肾小球滤过减少

答案：A

41. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务重要人群的是

- A: 社区患者
- B: 住院患者
- C: 过敏体质者
- D: 门诊患者

答案：C

42. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

- A: 右美沙芬可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用
- B: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多者应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果
- C: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素
- D: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰

答案：C

43. 尤其适用于胸膜炎伴胸痛的干咳患者的药品是

- A: 苯丙哌林
- B: 羧甲司坦
- C: 可待因
- D: 右美沙芬

答案：C

44. 计算儿童用药剂量的方法中比较合理的是

- A: 根据儿童体重计算

- B: 根据儿童年龄计算
- C: 根据儿童病情计算
- D: 根据体表面积计算

答案：D

45. 常用的抗肿瘤药给药途径有:动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径用于某些晚期不宜手术或复发的局限性肿瘤

- A: 静脉注射
- B: 腔内注射
- C: 肌内注射
- D: 动脉注射

答案：D

46. 患者，女，77岁，53kg，既往糖尿病病史10年，因“反复尿路感染4个月，加重3天”来院就诊。4个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在37.2℃~37.5℃之间，自服左氧氟沙星片0.29bid治疗5天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星0.29bid治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数463.2 / g1，细菌计数1262.1 / μ1。查体：T37.9℃P86次 / 分R21次 / 分BP132 / 77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数12.35×10⁹ / L、中性粒细胞百分比86.5%，CRP69.5mg / L。血生化：AST15U / L，ALT11U / L，ALB43.29 / L，Scr669mol / L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数>10⁵cfu / ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

- A: CTP 评分
- B: HAS—BLED 评分

C: 计算肌酐清除率

D: CAT 评分

答案：C

47. 宜于清晨服用的药品是

A: 甲氧氯普胺

B: 洛伐他汀

C: 阿卡波糖

D: 糖皮质激素

答案：D

48. 可治疗男性性功能障碍的药物是

A: 维生素 E

B: 度洛西汀

C: 沙美特罗

D: 西地那非

答案：D

49. 枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

A: 皮炎

B: 神经毒性

C: 性功能减退

D: 腹痛

答案：B

50. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

A: 敏感化作用

B: 协同作用

C: 减少不良反应

D: 竞争性拮抗作用

答案：A

51. 用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

B: 链霉素

C: 利福平

D: 吡嗪酰胺

答案：D

52. 长期大剂量应用头孢哌酮治疗慢性感染，需要监测的临床指标是

A: 血压

B: 血糖

C: 凝血功能

D: 血脂

答案：C

53. 透析患者宜在两餐中间服用的药物是

A: 维生素 D

B: 磷结合剂

C: 促红细胞生成素

D: 铁剂

答案：D

54. 以下用于治疗寻常型痤疮的药物中，属于非处方药的是

A: 过氧苯甲酰

B: 维胺酯

C: 阿达帕林

D: 异维 A 酸

答案: A

55. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是

A: 依非韦伦

B: 齐多夫定

C: 利托那韦

D: 利巴韦林

答案: A

56. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 μ mol / L(正常参考区间 45~84 μ mol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 减少脂肪摄入

B: 适当运动

C: 不必限盐

D: 控制体重

答案: C

57. 由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物

A: 必须减量应用

B: 须谨慎使用，必要时减量给药

C: 尽可能避免使用

D: 一般无须调整剂量

答案: B

58. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

A: 利巴韦林

B: 甲氨蝶呤

C: 阿洛司琼

D: 阿昔洛韦

答案: B

59. MHT 具体治疗方案,有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女宜选用

A: 雌孕激素间隔用药

B: 单纯雌激素补充治疗

C: 单纯孕激素补充治疗

D: 雌孕激素连续联合用药

答案: D

60. 具有中枢和周围抗多巴胺双重作用的是

A: 莫沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 西沙必利

答案: B

61. 长期服用可引起干咳的药物是

A: 氯沙坦

- B: 苯丙哌林
- C: 右美沙芬
- D: 卡托普利

答案：D

62. 可与眼球表面和坏死组织及分泌物中的蛋白质形成极薄的蛋白膜起保护作用，高浓度时则有杀菌和凝固作用的是

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 酞丁安滴眼液
- C: 可的松滴眼液
- D: 磺胺醋酰钠滴眼液

答案：A

63. 对流行性结膜炎可选用

- A: 碘苷滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 杆菌肽眼膏
- D: 1%泼尼松龙滴眼液

答案：A

64. 正常人对铁剂的吸收率为

- A: 10%~30%
- B: 10%~20%
- C: 0.4
- D: 0.3

答案：B

65. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 抗菌药物
- B: 糖皮质激素
- C: 布洛芬
- D: 阿司匹林

答案：B

66. 用于中度疼痛和癌性疼痛宜选用的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 多奈哌齐
- C: 可待因
- D: 吗啡

答案：C

67. 与舒筋活络酒不宜联用的药物是

- A: 阿托品
- B: 苯巴比妥
- C: 可待因
- D: 氢氧化铝

答案：B

68. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: 克拉霉素？
- B: 氯化氢？
- C: 碳酸氢钠？
- D: 奥美拉唑？

答案：B

69. 服用异烟肼抗结核治疗时，应注意的事项是

- A: 服药期间不宜饮酒
- B: 用药期间宜吃高蛋白食物
- C: 服药期间不宜饮茶
- D: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物

答案：D

70. 贫血常出现

- A: 血小板计数增高
- B: 中性粒细胞增多
- C: 血红蛋白减少
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：C

71. 可致驾驶员排尿增多、视力改变的是

- A: 东莨菪碱
- B: 阿米洛利
- C: 阿司匹林
- D: 氯苯那敏

答案：B

72. 患者，男，65 岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况，药师提出的合理化药物治疗建议，不包括()

- A: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6, 减慢美托洛尔的代谢, 应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量
- B: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用, 建议换成氨氯地平 CCB 降压药
- C: 患者在复律成功后, 尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗
- D: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性, 在逐渐降低胺碘酮剂量的时候, 注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

答案: B

73. 下列白细胞计数中, 成人静脉血的正常参考值为

- A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- B: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- C: $(4.3 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案: B

74. 常用于碱化尿液, 促进毒性药物排泄的是

- A: 苯巴比妥
- B: 碳酸氢钠
- C: 磺胺醋酰
- D: 麻黄碱

答案: B

75. 患者, 48 岁, 胸痛部位在心前区, 为压迫性疼痛, 发作数秒钟, 含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A: 阿司匹林
- B: 萘普生
- C: 氯吡格雷

D: 吲哚美辛

答案：C

76. 碱化尿液，服药期间需监测尿 pH 以调整剂量，防止发生尿酸性肾结石的药物是

A: 非布司他

B: 枸橼酸氢钾钠

C: 拉布立酶

D: 苯溴马隆

答案：B

77. 使用前应用青霉素进行皮试的药物是

A: 左氧氟沙星片

B: 注射用头孢曲松钠

C: 阿奇霉素片

D: 注射用阿莫西林

答案：D

78. (2018 年真题) 患者, 女, 25 岁, 痛经, 应选用的药物是 ()

A: 山莨菪碱

B: 卡马西平

C: 布洛芬

D: 麦角胺咖啡因

答案：C

79. 抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

A: 苯妥英钠

- B: 卡马西平
- C: 拉莫三嗪
- D: 丙戊酸钠

答案: D

80. 细菌感染性腹泻患者宜选用

- A: 阿苯达唑
- B: 小檗碱
- C: 乳果糖
- D: 干酵母

答案: B

81. 单核细胞正常值参考范围是

- A: 0.01~0.05
- B: 0.03~0.08
- C: 0.20~0.40
- D: 0~0.01

答案: B

82. 下列药品中，新生儿局部应用过多可能导致中毒的是

- A: 硼酸
- B: 炉甘石
- C: 氧化锌
- D: 滑石粉

答案: A

83. 治疗结核病的患者的注意事项错误的是

- A: 增强体质增加高蛋白和维生素的摄入，日光浴

B: 充分了解抗结核药物服用中可能出现的不良反应，一旦出现要及时报告医生

C: 患者所用食具应于餐后煮沸消毒

D: 口服抗结核药可自行决定饭后服用

答案：D

84. 患者，女，22 岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛 1 天就诊。查体：体温 38.6℃，脉搏 90 次 / 分，呼吸 24 次 / 分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC 11×10^9 / L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后 2 天，体温恢复正常，咳痰减少。

A: 支气管炎

B: 慢性阻塞性肺病

C: 社区获得性肺炎

D: 医院获得性肺炎

答案：C

85. 多黏菌素可能引起

A: 尿葡萄糖

B: 尿蛋白

C: 尿液隐血

D: 尿胆红素

答案：B

86. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径，半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择()

A: 静脉滴注给药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 每日给药 1 次

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/627201120051010024>