眼科学期末考试试题含答案

一、A1、A2 型题（共 47 题，每题 1 分，共 47 分）

答题说明：每一道题有 A,B,C,D,E 五个备选答案。在答题时,只许从 5 个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。

1、角膜的神经来源于：（）

A.动眼神经

B.滑车神经

C.三叉神经眼支(正确答案)

D.交感神经

E.面神经

2、导致角膜水肿的最重要因素是：（）

A.全身的水平衡

B.角膜上皮功能

C.角膜内皮功能(正确答案)

D.房水的渗透压.

E.角膜间质炎

3.前房角是指：（）

A.虹膜之后与睫状体之间距离

B.角膜之后的周边部分

C.巩膜、角膜与虹膜睫状体之间的隐窝

D.角膜与虹膜睫状体之夹角(正确答案)

E.巩膜与虹膜睫状体之夹角

4、眼球中起“暗房”作用的是：（）

A.视网膜

B.葡萄膜(正确答案)

C.角膜

D.巩膜

E.角膜和巩膜

5、房水引流途径正确的是：（）

A.后房→前房→小梁网→Schlemm 管→集液管→房水静脉(正确答案)

B.前房→后房→小梁网→Schlemm 管→集液管→房水静脉

C.前房→后房→小梁网→集液管→Schlemm 管→房水静脉

D.后房→前房→小梁网→集液管→Schlemm 管→房水静脉

E.后房→前房→Schlemm 管→小梁网→集液管→房水静脉

6、一般情况下,具有提睑作用的肌肉是：（）

A.上直肌

B.上斜肌

C.眼轮匝肌

D.提上睑肌和 Müller 肌(正确答案)

E.额肌

7、主观视功能检查不包括：（）

A.视野

B.比敏感度

C.色觉

D.视觉诱发电位(正确答案)

E.暗适应

8、眼眶四壁由几块骨构成：（）

A.4 块

B.5 块

C.6 块

D.7 块(正确答案)

E.8 块

9、某学生在距视力表 5 米远时右眼看不到最大一行视标,当其前移至距视力表 3 米处时方可看清该行视标,该生右眼视力为：（）

A.0.3

B.0.03

C.0.06(正确答案)

D.0.1

E.0.01

10、视交叉病变最典型的视野改变为：（）

A.弓形暗点

B.同侧偏盲(正确答案)

C.双颞侧偏盲

D.黄斑分裂

E.黄斑回避

11、突然视力下降伴有眼痛见于：（）

A.视网膜静脉阻塞

B.玻璃体出血

C.缺血性视神经病变

D.急性闭角形青光眼(正确答案)

E.视网膜脱离

12、角膜炎除眼痛外一般不会出现：（）

A.流泪

B.睫状充血

C.瞳孔散大(正确答案)

D.畏光

E.角膜混浊

13、角膜面平坦全层混浊,乳白色而有光泽,表,完全不透明。此种情况属于：（）

A.角膜斑翳

B.角膜云翳

C.粘连性角膜白斑

D.角膜葡萄肿

E.角膜白斑(正确答案)

14、多种药物滴眼时,相邻两种药物至少应间隔：（）

A.2 分钟

B.3 分钟

C.4 分钟

D.5 分钟(正确答案)

E.6 分钟

15、引起沙眼的微生物为：（）

A.支原体

B.衣原体(正确答案)

C.立克次体

D.病毒

E.细菌

16、有关睑腺炎,错误的是：（）

A.即往又称麦粒肿

B.是常见的眼睑腺体的急性化脓性细菌感染

C.睑板腺感染为内睑腺炎

D.睫毛毛囊或其附属的皮脂腺或变态汗腺感染称外睑腺炎

E.最常见的致病菌为淋球菌(正确答案)

17、睑结膜面局部充血肿胀,有硬结,疼痛和压痛,2～3 天后其中心形成黄色脓点,多可自行穿破睑结膜面而痊愈。此病症为：（）

A.内睑腺炎(正确答案)

B.外睑腺炎

C.鳞屑性睑缘炎

D.溃疡性睑缘炎

E.接触性皮炎

18、关于角膜溃疡描述错误的是：（）

A.角膜病变未能得到控制

B.毒素损伤及营养障碍

C.角膜发生变性、坏死、组织脱落

D.溃疡底部透明,边缘模糊不清(正确答案)

E.绿脓杆菌性溃疡有大量黄白带绿色黏稠的脓性分泌物

19、鼻泪管阻塞合并慢性泪囊炎时,泪道冲洗可有：（）

A.冲洗液完全自原路返流

B.冲洗液自另一泪点返流且伴有黏液或脓性分泌物(正确答案)

C.冲洗有阻力且冲洗液部分进入鼻腔

D.泪道冲洗通畅

E.冲洗液由上或下泪点进入后,从另一泪点返流

20、泪囊炎的首要症状是：（）

A.泪囊区局部肿胀

B.泪囊区局部疼痛

C.发热

D.全身症状明显

E.泪溢及有分泌物(正确答案)

21、关于超急性细菌性结膜炎的描述,何者不对：（）

A.起病急,病情进展快

B.眼睑高度水肿,结膜充血显著

C.大量脓性分泌物

D.一般无耳前淋巴结肿大(正确答案)

E.主要致病菌是萘瑟淋球菌,萘瑟脑膜炎球菌

22、关于细菌性结膜炎的治疗措施中,哪项不对：（）

A.结膜囊冲洗

B.局部点眼

C.全身用药

D.包扎患眼(正确答案)

E.眼膏涂眼

23、眼睑最常见的恶性肿瘤为：（）

A.基底细胞癌(正确答案)

B.睑板腺腺癌

C.黄色瘤

D.鳞状上皮细胞癌

E.皮脂腺腺癌

24、真菌性角膜炎的治疗,哪一项不正确：（）

A.局部应用抗真菌的药物

B.全身应用免疫抑制剂药物

C.并发虹睫炎者可用 1%阿托品点眼

D.使用皮质类固醇(正确答案)

E.保守治疗无效时,可手术

25、散瞳后,应用检眼镜彻照法,可在眼底红光反射中看到轮幅状混浊的阴影的是：（）

A.皮质性白内障的初发期(正确答案)

B.皮质性白内障的成熟期

C.皮质性白内障的膨胀期

D.皮质性白内障的过熟期

E.核性白内障

26、长期成熟的白内障,突然发生急性青光眼,应首先考虑以下哪一种情况：（）

A.眼内出血

B.新生血管性青光眼

C.急性虹膜炎

D.晶状体溶解性青光眼(正确答案)

E. 视神经炎

27、术后不保留晶体后囊膜的白内障手术方式是：（）

A.白内障囊内摘除术(正确答案)

B.白内障囊外摘除术

C.超声乳化白内障吸除术

D.小梁切除术

E.滤过手术

28、晶状体囊外摘除术后,后囊膜发生混浊,称为：（）

A.瞳孔膜闭

B.后发性白内障(正确答案)

C.假性白内障

D.并发性白内障

E.外伤性白内障

29、闭角型青光眼急性发作期临床表现不正确的是：（）

A.剧烈头痛,眼痛、畏光、视力下降、眼压升高

B.眼睑水肿,混合性充血

C.角膜上皮水肿,角膜后色素沉着

D.前房极浅,周边部前房消失

E. 瞳孔缩小(正确答案)

30、治疗青光眼的药物中，哪一类的降压机制是使关闭的房角开放：（）

A.乙酰唑胺

B.甘露醇

C.噻吗洛尔

D.甘油

E.毛果芸香碱(正确答案)

31、前葡萄膜炎出现 KP,其中最常见的类型位于：（）

A.角膜瞳孔区

B.虹膜实质层

C.角膜后弥散分布

D.下方角膜后呈三角型分布(正确答案)

E.晶体前囊

32、交感性眼炎好发在穿通性眼外伤后：（）

A.1～3 年

B.1 周以内出现

C.2 周以内出现

D. 2～8 个月

E.2 周～2 月(正确答案)

33、引起视神经乳头水肿的最主要原因是：（）

A.颅内压增高(正确答案)

B.青光眼术后

C.慢性肾炎

D.高血压

E.贫血

34、早期出现明显视力障碍的是：（）

A.核性白内障(正确答案)

B.晶状体溶解性青光眼

C.后囊膜下白内障

D.皮质性白内障的成熟期

E.皮质性白内障的膨胀期

35、在调节放松状态下,平行光线经眼屈光系统后聚焦在视网膜前,此种屈光状态为：（）

A. 正视

B.远视

C.近视(正确答案)

D.弱视

E.散光

36、右眼外展神经障碍时，眼球处于何种位置：（）

A.右眼向内侧偏斜(正确答案)

B.右眼向内下偏斜

C.右眼向上方偏位

D.左眼向内偏斜

E.不出现眼位偏斜

37、弱视治疗越早越好，一般应尽量在几岁内治疗:（）

A.3 岁

B.6 岁(正确答案)

C.10 岁

D.12 岁

E.14 岁

38、关于青光眼用药不正确的说法为：（）

A.主要是降低眼压

B.防止视神经进一步损伤

C.可采取个体化治疗

D.只能单独使用(正确答案)

E.点药次数并非越多越好

39、取深层角膜异物时，不恰当的做法：（）

A.务必一次取净(正确答案)

B.严格执行无菌操作

C.异物取出后点抗生素眼液

D.缝合伤口

E.包扎

40、角膜上皮擦伤的主要表现是：（）

A. 明显的刺激症状(正确答案)

B.结膜下出血

C.前房积脓

D.分泌物增多

E.病人一般无不适感

41、酸性物质致伤原因为：（）

A.致使组织蛋白凝固坏死(正确答案)

B.致使角膜上皮坏死脱落

C.与组织的类脂质起皂化作用

D.致使组织溶解

E.致使组织细胞分解坏死

42、眼局部长期使用皮质类固醇，可引起的副作用是：（）

A.结膜炎

B.角膜炎

C.视神经炎

D.角膜溃疡

E.青光眼(正确答案)

43、成人双侧眼球突出的最常见的原因为：（）

A.甲状腺相关性眼病(正确答案)

B.转移性眼眶肿瘤

C.颈动脉海绵窦瘤

D. 淋巴管瘤

E.泪腺混合瘤

44、以下关于先天性上睑下垂的描述，错误的是：（）

A.出生后即有

B.有晨轻暮重的特点(正确答案)

C.双侧或单侧平视时睑缘遮住上方角膜＞2mm。

D.新斯的明试验阴性

E.可完全遮盖整个角膜

45、男性，65 岁，有糖尿病史 8 年，高血压病史 4 年。左眼视力明显下降 3 天。眼部检查：左眼视力 0．04，右眼视力 1．0，左眼结膜无充血，角膜透明，晶状体皮质轻度混浊，眼底视盘及其附近的视网膜水肿，视网膜静脉明显扩张迂曲，

视网膜出血浓密、广泛，可见絮状白斑，黄斑水肿明显。右眼视网膜动脉较细，反光增强，未见视网膜出血。最有可能的诊断是:（）

A.视网膜静脉周围炎

B.糖尿病性视网膜病变

C.视网膜中央静脉阻塞(正确答案)

D.视网膜中央动脉阻塞

E.高血压视网膜病变

46、男性患者，75 岁，双眼视力下降 3 年，既往史：糖尿病 20 年。查体：视力右 0．3，左 0．02，矫正不提高；左眼虹膜新生血管，右眼底后极部可见多数小出血点和棉绒斑，左眼玻璃体内多量积血。最可能的诊断是:（）

A.年龄相关性黄斑变性

B.糖尿病视网膜病变(正确答案)

C.高血压性视网膜病变

D.视网膜中央静脉阻塞

E.肾病性视网膜病变

47、患者男，43 岁，右眼不慎被石块击中，右眼疼痛，视物不见 1 小时就诊。查体：Vod：光感，光定位不准，眼压 T-3，角膜不规则大范围裂伤，虹膜脱出，晶状体未见，眼内组织结构窥不清，眼眶 X 线未见异物影。目前最主要的急诊处理是:（）

A.B 超检查

B.涂抗生素眼膏加压包扎

C.CT 检查

D.清创缝合，关闭伤口(正确答案)

E.止血处理

二、A3 型题（共 13 题，每题 1 分，共 13 分）

答题说明：试题,每组题都有一段共用题干病历描述,然后提出两个或三个与病历有关的问题,每个问题有 A,B,C,D,E 五个备选答案,答题时,每道题只许从五个备选答案中选一个最合适的作为正确答案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628042055005006037