

## 康复治疗技术专业模拟考试题（附参考答案）

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、关于肌肉的收缩形式不正确的是

- A、等长收缩,肌肉作用的物体未发生位移,所以未对物体做功
- B、人体骨骼肌的收缩的形式不可能为混合式收缩
- C、等长收缩只有张力的增加而无长度的缩短
- D、等张收缩只有长度的变化而无张力的改变
- E、等张收缩时,肌肉收缩时有关节的运动,所以它对物体做了功

正确答案：B

2、有实验证明肩关节固定 1 周所致的挛缩需 52 天才能治愈，固定三周治疗大约所需天数为

- A、240 天
- B、300 天
- C、180 天
- D、60 天
- E、120 天

正确答案：B

3、股四头肌无力步态特点有（ ）

- A、垂足步态
- B、跟足步态
- C、跨越步态
- D、膝塌陷步态
- E、扶膝步态

正确答案：E

4、高血压脑出血急性期处理的重要环节是：

- A、使用抗生素,防止继发感染
- B、立即使血压降至正常水平
- C、立即使用止血剂
- D、使用脱水剂,控制脑水肿
- E、使用镇静剂

正确答案：D

5、正中神经支配（ ）

- A、尺侧腕伸肌
- B、指伸肌

- C、尺侧腕屈肌
- D、旋前圆肌
- E、桡侧腕伸肌

正确答案：D

6、应用受试者年龄预测极量心率时，下列哪一项正确（ ）

- A、200-年龄
- B、160-年龄
- C、220-年龄
- D、240-年龄
- E、180-年龄

正确答案：C

7、按自发性肌痉挛发作频度分级的是：（ ）

- A、神经科分级
- B、Penn 分级
- C、Ashworth 分级
- D、Clonus 分级
- E、摆动试验结果分级

正确答案：B

8、髋关节屈伸活动范围测量中，测角计轴心放置位置为：（ ）

- A、髌骨下端
- B、髌前上棘
- C、股骨大转子
- D、耻骨联合
- E、股骨外踝

正确答案：C

9、通气/血流比值是指（ ）

- A、每分吸氧量和通气量的比值
- B、每分肺通气量和每分肺血流量的比值
- C、每分 通气量和吸氧量的比值
- D、每分肺血流量和肺肺泡通气量的比值

正确答案：B

10、Vojta 认为：发育落后正常儿童多长时间为异常（ ）

- A、3 个月
- B、2 个月

- C、1 个月
- D、12 个月
- E、6 个月

正确答案：A

11、肌张力降低最常见于：

- A、脑性瘫痪
- B、脑卒中
- C、脊髓损伤
- D、帕金森病
- E、臂丛 N 损伤

正确答案：E

12、以下哪个不属于高血压康复的禁忌证（）

- A、高血压危象
- B、不稳定性心绞痛
- C、临界性高血压
- D、心衰
- E、脑血管痉挛

正确答案：C

13、下列哪项不是步态观察的内容（）

- A、行进是否稳定和流畅
- B、是否足下垂、足内翻
- C、足是否全部着地
- D、躯干摆动过度或不足
- E、是否有双支撑期

正确答案：E

14、以下哪项不属生活质量评定在医学领域的应用：（）

- A、日常生活能力的评估
- B、治疗方法的选择与决择
- C、临床疗法及干预措施的比较
- D、人群健康状况的评估
- E、资源利用的效益评价

正确答案：A

15、下列哪项不属等长肌力测量：（）

- A、握力测试

- B、关节全幅运动
- C、捏力测试
- D、腹、背肌等长耐力实验
- E、背拉力测试

正确答案：B

16、患者,女,69岁,诊断哮喘发作期,对此患者进行康复,可以采用的方法是()

- A、骑车
- B、游泳
- C、登山
- D、放松训练
- E、慢跑

正确答案：D

17、常用的标准化的BADL评定方法不包括：（）

- A、Barthel 指数
- B、FIM
- C、Katz 指数
- D、PULSES
- E、修订的Kenny 自理评定

正确答案：B

18、3级肌力描述正确的是：（）

- A、能抗重力和充分的阻力的关节活动
- B、在减重状态下能做全范围的关节活动
- C、无可测知的肌肉收缩
- D、能抗重力做全范围的关节活动,不能抗阻力
- E、有轻微的收缩,不能引起关节活动

正确答案：D

19、训练和加强正常的运动模式（）

- A、BoBATH法
- B、Brunnstrom 法
- C、PNF法
- D、ROOD.法
- E、MRF法

正确答案：C

20、股骨颈骨折晚期最常见的并发症是

- A、股骨头缺血性坏死
- B、坠积性肺炎
- C、创伤性髋关节炎
- D、褥疮及泌尿系感染
- E、髋关节僵硬

正确答案：A

21、无关节运动,仅可扪及肌肉收缩,肌力可评为：（ ）

- A、3 级
- B、2 级
- C、1 级
- D、4 级
- E、5 级

正确答案：C

22、按 PULSES 评定标准,在别人帮助下,能处理好大小便排泄问题,偶有尿床或溢粪,应评定为：（ ）

- A、1 分
- B、2 分
- C、3 分
- D、4 分
- E、5 分

正确答案：C

23、下列关于非对称性紧张性颈反射的说法哪项正确（ ）

- A、4~6 个月出现,8~12 个月消失。
- B、患者取仰卧位,头呈中立位,上、下肢伸展,检查者将被检者头部转向一侧,头部转向侧的上、下肢伸展,或伸肌张力增高;另一侧的上、下肢屈曲,或屈肌张力增高,犹如“拉弓射箭”或“击剑”姿势,为阳性。
- C、妊娠 28 周出现,4 个月消失。
- D、患者取仰卧位,头呈中立位,上、下肢伸展,保持仰卧位,四肢伸展,伸肌张力增高。
- E、妊娠 28 周出现,4 个月消失。

正确答案：B

24、“鸭步”又称为：（ ）

- A、臀大肌步态

- B、股四头肌无力步态
- C、臀中肌步态
- D、臀小肌步态
- E、以上都不是

正确答案：C

25、椎体外系包括以下哪个部位的皮质脊髓通路()

- A、额上回
- B、顶后叶中央回
- C、海马旁回
- D、颞中回
- E、中央旁小叶

正确答案：E

26、脑性瘫痪儿童功能评定中,不重要的方面()

- A、关节活动范围
- B、言语功能评定
- C、日常生活能力评定
- D、肌力检查
- E、智力评定

正确答案：D

27、神经根型颈椎病消除神经根炎性水肿的治疗()

- A、超声治疗
- B、微热量超短波.干扰电疗
- C、干扰电疗.正弦调制中频电疗
- D、温热量超短波.干扰电疗
- E、牵引治疗

正确答案：B

28、脑卒中患者采用诱发至主动运动阶段是:

- A、软瘫期
- B、亚急性期
- C、改善期
- D、急性期
- E、痉挛期

正确答案：A

29、下列关于痉挛的叙述,正确的是 ( )

- A、肌张力高一定是痉挛
- B、偏瘫恢复期不出现痉挛
- C、外界刺激可使痉挛缓解
- D、强烈的痉挛即是挛缩
- E、痉挛常见于脊髓损伤

正确答案：E

30、关于失认症下列正确的是：（ ）

- A、是指患者对物品、人、声音、形状或气味的识别能力丧失
- B、是感觉信息向概念化水平的传输和整合过程受到破坏的结果
- C、可分为视失认、触觉失认和听失认
- D、常见于脑外伤及中风患者
- E、以上都是

正确答案：E

31、原发性高血压的发病机制中,最主要的是（ ）

- A、盐酸量过多
- B、是一种多因疾病
- C、钙代谢紊乱
- D、精神过于紧张
- E、肾脏病变

正确答案：B

32、若患者入院前有严重抑郁症,康复不配合,则下列治疗中最适合患者的是:

- A、职业技能训练
- B、观看或参加竞技比赛
- C、拼图
- D、翻身训练
- E、转移训练

正确答案：B

33、干扰电疗法常用的治疗技术有

- A、固定法
- B、移动法
- C、抽吸法
- D、干扰电震动按摩法
- E、以上都是

正确答案：E

34、一般小儿在几岁左右平衡,精细动作,粗大运动的协调发育基本成熟()

- A、5
- B、10
- C、11
- D、7
- E、9

正确答案：D

35、方法是针对刺激最大限度利用 CNS 损伤后的重新组织和适应能力

- A、BoBA.th 法
- B、Brunnstrom 法
- C、PNF 法
- D、ROOD法
- E、MRF法

正确答案：D

36、石膏或夹板外固定之后最应注意的是

- A、松脱
- B、骨折再移位
- C、压迫性溃疡
- D、石膏变形
- E、血循环受阻

正确答案：E

37、Barthel 指数评定 ADL 能力状况,根据是否需要帮助及帮助的程度分为:()

- A、1、2、3、4 级
- B、1、2、3、4、5、6、7 分
- C、0、5、10 分
- D、A、B、c、D、E、F、G 级
- E、0、5、10、15 分

正确答案：E

38、关节松动术的适应证不包括()

- A、未愈合的骨折
- B、可逆行关节活动降低
- C、关节疼痛,肌肉紧张及痉挛

D、进行性关节活动受限

E、功能性关节制动

正确答案：A

39、该患者最有可能的诊断是()

A、肝性脑病

B、脑淀粉样血管病

C、高血压性脑出血

D、脑梗死

E、脑动脉瘤破裂初学

正确答案：C

40、ADL运动方面不包括：()

A、轮椅上运动和转移

B、室内或室外行走

C、床上运动

D、以慢速跑45m

E、公共或私人交通工具的使用

正确答案：D

41、由患者自行在量表上评分然后交给评估者,这种生活质量评定方法称为：()

A、自我报告法

B、询问法

C、观察法

D、评估法

E、访谈法

正确答案：A

42、患者训练股四头肌时,进行膝关节全关节活动范围的屈伸运动时,股四头肌所进行的运动,下列说法中正确的是()

A、主动运动

B、等张运动

C、向心性运动

D、离心性运动

E、以上都对

正确答案：E

43、该患儿最易采取下列哪项措施()

、高压氧疗患者,男,58岁,车祸致头部外伤,产生左颞顶硬膜外血肿,手术引流先后3周后,患者意识恢复转治康复科,查体,神清,右侧肢体偏瘫,上肢为屈曲痉挛,下肢为伸展痉挛

- B、手术治疗
- C、体外反射
- D、药物治疗
- E、早期干预

正确答案: E

44、骨折早期并发症不包括()

- A、血管神经损伤
- B、脊髓损伤
- C、脂肪栓塞
- D、急性骨萎缩
- E、休克

正确答案: D

45、腰椎间盘突出症患者,小腿前外侧,足拇指感觉减退。足拇指背伸肌减退,其病变部位是()

- A、C.1-3
- B、C.2-3
- C、C.3-4
- D、C.4-5
- E、L5.S1

正确答案: D

46、为明确诊断,选择最佳的辅助检查是()

- A、X线
- B、B.超
- C、MRI
- D、血管造影
- E、肌电图

正确答案: C

47、下列常见的协调障碍,不属于共济失调的是:()

- A、轮替运动
- B、手足徐动
- C、运动分律

、辨距不良

E、震颤

正确答案：B

48、下列不属于肌力评定适应证的是：（ ）

A、截肢患者

B、脊髓灰质炎患者

C、骨关节炎患者

D、肥胖症患者

E、脊髓损伤的患者

正确答案：E

49、男性脊髓损伤患者常发生性功能障碍。在急性后期可以用辅助射精的方法改善生育能力。作用于阴茎的反射性振动能引起的射精成功的男性脊髓损伤平面为（ ）

A、S

B、L

C、T ~T

D、L

E、T ~T

正确答案：E

50、平衡评定内容主要是评定个体能否做到以下几点,除哪项外：（ ）

A、静止状态下不同体位均能保持平衡

B、运动状态下能精确地完成运动并能保持新的平衡

C、对外界的变化能迅速作出反应

D、姿势反射

E、当支撑面发生移动时能保持平衡

正确答案：C

51、关于发育性反射检查,下列哪种说法错误（ ）

A、有助于判断中枢神经系统的发育状况

B、有助于判断中枢神经系统的损伤情况

C、为制订康复治疗方提供依据

D、发育性反射不消失均为异常。

E、随着中枢神经系统的发育成熟,较高水平的反射则持续终生

正确答案：D

52、将刺激电极插入神经纤维内,用直流电刺激神经纤维,在通电时兴奋

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628133121141006131>