

2024 年甘肃省华池县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题王牌题库附答案（研优卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 氯霉素
- B: 华法林
- C: 青霉素
- D: 磺胺药

答案：B

2. （处方缩写）餐后的缩写为

- A: qid
- B: iv
- C: pc
- D: q4h

答案：C

3. 患者，男，65 岁，临床诊断：2 型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

- A: 选用美托洛尔缓释片不合理
- B: 选用阿卡波糖片不合理
- C: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理
- D: 瑞格列奈片用量不合理

答案：C

4. (抗甲状腺药分阶段治疗时间)，初治阶段

A: 1~2 个月

B: 1~2 年

C: 2~3 个月

D: 1~2 周

答案：A

5. “记录患者用药问题、药学干预内容、药学监测计划”的技能是

A: 药品警戒技能

B: 沟通技能

C: 药历书写技能

D: 自主学习能力

答案：C

6. 急诊处方一般不超过几日

A: 15 日常用量

B: 3 日常用量

C: 7 日常用量

D: 1 日常用量

答案：B

7. 变异型心绞痛发作应首选的药物是

A: 氨氯地平

B: 美托洛尔

C: 单硝酸异山梨酯

D: 硝酸甘油

答案：A

8. 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是()

- A: 非洛地平片
- B: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- C: 维 A 酸片
- D: 左旋多巴片

答案：D

9. 不易产生耐受性，对 CYP2C19 快代谢的胃食管反流病人群，推荐长期维持治疗的抑酸剂是

- A: 法莫替丁
- B: 奥美拉唑
- C: 伊托必利
- D: 泮托拉唑

答案：D

10. 禁与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括（）

- A: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
- B: 三环类药物
- C: 5-HT_{1A} 受体部分激动剂
- D: 苯二氮类药物

答案：D

11. 适用于急性疼痛、骨关节炎的处方药是

- A: 可待因
- B: 硫酸氨基葡萄糖
- C: 塞来昔布

D: 阿托品

答案: C

12. 用于有机磷中毒症状的对抗药物是

A: 阿托品

B: 毛果芸香碱

C: 亚甲蓝

D: 碘解磷定

答案: A

13. 菌群失调性腹泻常见的病因是

A: 外界的各种刺激，如受寒、过食辛辣食物等

B: 细菌、真菌、病毒、寄生虫感染

C: 肠道正常细菌的数量或比例失去平衡

D: 直肠或结肠溃疡、肿瘤或炎症

答案: C

14. 《中国药学文摘》属于

A: 三级信息源

B: 二级信息源

C: 一级信息源

D: 原始信息源

答案: B

15. 容易氧化的药物是

A: 青霉素类

B: 阿扑吗啡

C: 牛痘菌苗

D: 胃蛋白酶

答案：B

16. 将药物治疗成本和所产生的效益归化为以货币为单位的数字，从而进行药物经济学评价，这一评价方法属于

A: 成本-效益分析

B: 最小成本分析

C: 成本-效用分析

D: 成本-效果分析

答案：A

17. 选择药物的首要标准是药物治疗的

A: 经济性

B: 安全性

C: 有效性

D: 适宜性

答案：C

18. (2017 年真题) 高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于 ()

A: 痛风患者

B: 心力衰竭患者

C: 双侧肾动脉狭窄患者

D: 胃溃疡患者

答案：A

19. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

A: 糖化血红蛋白（HbA1c）

B: 空腹血糖

C: 白细胞计数

D: 餐后血糖

答案：A

20. 服用他达拉非后，如果舌下含服硝酸甘油，建议服药间隔时间应为

A: 1 周

B: 4 小时

C: 48 小时

D: 24 小时

答案：C

21. 病例系列研究试验结果属于循证医学证据级别的

A: 1 级证据

B: 2 级证据

C: 4 级证据

D: 3 级证据

答案：C

22. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

A: 溶栓后 12h

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 溶栓后 24h
- C: 溶栓前 12h
- D: 溶栓同时

答案：B

23. 患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素 (TSH) $< 0.1 \text{ mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是()

- A: 碘化钾治疗，定期复查
- B: 选用 ^{131}I 治疗
- C: 甲状腺次全切除手术
- D: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗

答案：D

24. 吸附力强、可阻止毒物吸收的是

- A: 药用炭混悬液
- B: 淀粉溶液
- C: 1%硫酸镁溶液
- D: 1%氯化钠溶液

答案：A

25. 下列疾病中，WHO 视为艾滋病最常见的机会性感染的是

- A: 肺炎
- B: 结核病
- C: 卡氏肉瘤
- D: 腹泻

答案：B

26. 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

- A: 合并高胆固醇血症的患者

- B: 甲状腺切除后的患者
- C: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者
- D: 合并轻度高血压的患者

答案：C

27. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

- A: 药物警戒作用
- B: 用药监督作用
- C: 应对投诉作用
- D: 双向交流作用

答案：D

28. (2019 年真题) 关于处方开具和调剂的说法，正确的是

- A: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品
- B: 处方开具后 7 日内有效
- C: 调剂处方时应做到“四查十对”
- D: 查处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量

答案：C

29. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；可评价为

- A: 很可能
- B: 待评价
- C: 可能无关
- D: 可能

答案：D

30. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史为防止尿酸结晶和痛风结石的产生，药师应建议患者在服用上述药物时加服

- A: 碳酸氢钠
- B: 丙磺舒
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 别嘌醇

答案：A

31. 容易引起肌酸激酶升高的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 红霉素
- C: 青霉素
- D: 洛伐他汀

答案：D

32. 下面属于消化性溃疡发病机制中胃、十二指肠黏膜的攻击因素的是

- A: 胃黏膜屏障
- B: 胃黏液
- C: 非甾体抗炎药
- D: HCO_3^- 的分泌

答案：C

33. 以下可能导致锥体外系反应(药源性神经系统疾病)的药物是

- A: 哌甲酯
- B: 麻黄碱
- C: 氯丙嗪
- D: 茶碱

答案：C

34. 导致血糖异常、糖尿病的是

- A: 己烯雌酚
- B: 加替沙星
- C: 罗非昔布
- D: 阿托伐他汀

答案：B

35. 禁用于严重痛风患者的调脂药物为

- A: 阿托伐他汀
- B: 考来烯胺
- C: 烟酸类
- D: 非诺贝特

答案：C

36. 杨某，女，19 岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

- A: 支气管炎
- B: 社区获得性肺炎
- C: 肺结核
- D: 哮喘

答案：B

37. 形似或声似的药品要加用醒目的标识，是针对

- A: 及时沟通
- B: 环境整齐、安静
- C: 配备足够的人力

D: 规范操作、坚持核对

答案：B

38. (2021 年真题) 患者，男，59 岁，诊断为 2 型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是 ()

- A: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用
- B: 应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果
- C: 使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确
- D: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存

答案：B

39. 随着人均寿命的提高和人民生活水平的提高，对待疾病的观念也逐渐从治疗转变为预防，通过服用营养保健品来预防疾病的人群日益增加，下列相关说法错误的是

- A: 复合维生素一般适合于饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童
- B: 应有针对性地挑选合适的补充剂才能发挥营养成分的最佳效果
- C: 遗传因素对健康长寿起到了决定性作用
- D: 合理饮食是获取营养成分最简单有效的途径

答案：C

40. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 缓和治疗
- B: 姑息治疗
- C: 对因治疗
- D: 对症治疗

答案：D

41. 归属于用药评价的是

- A: 同时合并应用的药品
- B: 对药物治疗的建设性意见
- C: 主要实验室检查数据
- D: 主治医师签名

答案：B

42. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 维生素 K
- B: 维生素 B
- C: 阿托品
- D: 乙酰胺

答案：A

43. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 下肢深静脉血栓形成
- B: 肺动脉栓塞
- C: 病理性骨折
- D: 下肢动脉栓塞

答案：A

44. 服药后或同时饮酒可致使药效学增强的药物是

- A: 别嘌醇
- B: 地西泮

C: 苯妥英钠

D: 利血平

答案: B

45. 能减弱华法林的抗凝作用的药物是

A: 地瓜

B: 维生素 K

C: 韭菜

D: 芒果

答案: B

46. 铁剂与维生素 C 联用增效的机制是

A: 作用于不同的靶点

B: 竞争性拮抗作用

C: 延缓或降低抗药性

D: 促进机体的利用

答案: D

47. 弥漫性青铜色色素沉着的是

A: 柔红霉素

B: 博来霉素

C: 氟尿嘧啶

D: 白消安

答案: D

48. 表现为疲劳、软弱、全身不适、颅内压增高、皮肤干燥瘙痒、四肢痛为哪种维生素滥用的危害

A: 维生素 D

B: 维生素 A

C: 维生素 B

D: 维生素 C

答案：B

49. 制定新药新知识培训制度，归属于用药错误预防策略中的

A: 人员培训

B: 管理规范到位

C: 环境与流程的优化与持续改进

D: 科学发展

答案：A

50. 患者，女，59 岁，绝经后 3 年，近日出现腰背疼痛，负重时疼痛加剧骨密度 T 值为-3.5，诊断为骨质疏松每天补充维生素 D800IU 元素钙 500mg 同时给予唑来膦酸治疗。唑来膦酸正确的给药方案是()

A: 4mg 静脉滴注，每日一次

B: 10mg 口服每日一次

C: 5mg 静脉滴注，每年一次

D: 5mg 静脉滴注，每周一次

答案：C

51. 红霉素

A: 与呋塞米合用可加重肾功能损害

B: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫

C: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药

D: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

答案：D

52. 肾或膀胱结石

- A: 草酸盐结晶
- B: 磷酸盐结晶
- C: 尿酸盐结晶
- D: 酪氨酸和亮氨酸结晶

答案：A

53. 适用于夜间服用的药物是

- A: 利尿剂
- B: 糖皮质激素
- C: 他汀类
- D: 氨基糖苷类

答案：C

54. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响, 氯喹

- A: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血
- B: 可能致胎儿畸形
- C: 导致新生儿血钙过高
- D: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

答案：D

55. 血栓性疾病女性患者的凝血酶原时间可能短于

- A: 16 秒
- B: 18 秒
- C: 10 秒
- D: 11 秒

答案：D

56. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 A 级的是

- A: 环丙沙星
- B: 青霉素
- C: 氯化钾
- D: 美托洛尔

答案：C

57. 患者，女，75 岁，近来因家庭变故出现焦虑相关的精神和躯体症状，入睡困难，多梦易惊醒，诊断为焦虑症、核查其用药记录，患者在服用氨氯地平、阿托伐他汀钙。

- A: 三环类抗抑郁药
- B: 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
- C: 苯二氮?类药物
- D: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

答案：C

58. （2015 年真题）治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是（）。

- A: 有效性
- B: 安全性
- C: 依从性
- D: 经济性

答案：C

59. 针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是（）

- A: 肌内注射维生素 B
- B: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U
- C: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg

D: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g

答案：C

60. 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用()

A: 色甘酸钠滴眼液

B: 玻璃酸钠滴眼液

C: 七叶洋地黄双苷滴眼液

D: 氧氟沙星滴眼液

答案：A

61. 发表在《中国药理学学报》上有关紫杉醇的综述文章，属于

A: 五级信息

B: 三级信息

C: 四级信息

D: 二级信息

答案：B

62. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

A: 复方片仔癀软膏

B: 复方樟脑软膏

C: 氢化可的松软膏

D: 异维 A 酸软膏

答案：C

63. 患者，女，77 岁，53kg，既往糖尿病病史 10 年，因“反复尿路感染 4 个月，加重 3 天”来院就诊。4 个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在 37.2℃~37.5℃之间，自服左氧氟沙星片 0.29bid 治疗 5 天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3 天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星 0.29bid 治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数 463.2 / g1，细菌计数 1262.1 / μl。查体：T37.9℃P86 次 / 分 R21 次 / 分 BP132 / 77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数 12.35×10⁹ / L、中性粒细胞百分比 86.5%，CRP69.5mg / L。血生化：AST15U / L，ALT11U / L，ALB43.29 / L，Scr669mol / L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数>10⁵cfu / ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

A: 口服头孢呋辛 0.25gbid，疗程 3d

B: 无需再服用抗菌药

C: 给予呋喃妥因 50mgqd，睡前排尿后口服，每隔 7d 换用其他类型抗菌药，疗程 6 个月

D: 口服左氧氟沙星 0.5gqd，疗程 14d

答案：C

64. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}世界卫生组织的网址是

A: org.cn

B: www.cm

C: org.cn

D: www.cp

答案：D

65. 如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，ADR 报告表此栏应填“好转”；所对应的项目是

- A: 用药起止时间
- B: 用药原因
- C: 不良反应 / 事件的结果
- D: ADR / ADE 过程描述

答案：C

66. 易受光线影响而变质的药品

- A: 冰硼散
- B: 肝素
- C: 氰化钾
- D: 安乃近

答案：B

67. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差

- A: 枸橼酸铁(三价铁)
- B: 乳酸亚铁(二价铁)
- C: 琥珀酸亚铁(二价铁)
- D: 右旋糖酐铁(二价铁)

答案：A

68. (用药导致的血常规异常)抗真菌药

- A: 中性粒细胞减少
- B: 血红蛋白量增多
- C: 血小板减少
- D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：A

69. 严重烧伤患者尿常规检查可发现

- A: 尿胆红素阳性
- B: 尿淀粉酶增高
- C: 尿葡萄糖阳性
- D: 尿血红蛋白阳性

答案：D

70. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 7×10^9 / L，血小板 120×10^9 / L，血清铁 300 μ g / L。

- A: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- B: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进其吸收
- C: 钙剂可促进铁剂吸收
- D: 正常人维持体内铁平衡需要每日从食物中摄取铁 2~2.5mg

答案：A

71. “1 天给药 1 次；如需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍”是针对

- A: 半衰期大于 24 小时的药品
- B: 半衰期小于 30 分钟的药品
- C: 半衰期 8~24 小时的药品
- D: 半衰期大于 30 小时的药品

答案：A

72. 痛风急性发作期不宜服用，以防发生转移性痛风发作的是

- A: 泼尼松
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱

D: 别嘌醇

答案：B

73. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

A: 西咪替丁

B: 氯丙嗪

C: 呋塞米

D: 胰岛素

答案：C

74. (2018 年真题) 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后, 出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是 ()

A: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解

B: 酚妥拉明和多巴胺发生反应

C: 酚妥拉明和呋塞米发生反应

D: 多巴胺和呋塞米发生反应

答案：D

75. 慢性肾盂肾炎治疗的关键是

A: 延长给药疗程

B: 联合使用抗菌药物

C: 积极寻找并去除易感因素

D: 选用敏感抗菌药物

答案：C

76. 下列药品中, 与血浆蛋白结合率高、分布容积随年龄增长而降低、容易造成老年人血药浓度升高而致中毒的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 巴比妥
- B: 地西泮
- C: 碳酸钙
- D: 维生素 C

答案：B

77. 影响人类寿命的因素中，医疗占

- A: 0.15
- B: 0.1
- C: 0.08
- D: 0.07

答案：C

78. 可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 雌孕激素
- B: 甲巯咪唑
- C: 沙立度胺
- D: 氮芥类

答案：C

79. 感冒初出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

- A: 含非甾体抗炎药制剂
- B: 含氢溴酸右美沙芬制剂
- C: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂
- D: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂

答案：C

80. 属于公众用药咨询的是

- A: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- B: 减肥、补钙、补充营养素
- C: 抗菌药物的合理应用
- D: 注射剂溶媒的正确选择

答案：B

81. 下列组合中，属于联合化疗的是（）

- A: MTX 方案（甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注）
- B: VEGF 抑制剂+ALK 抑制剂（贝伐珠单抗+奥希替尼）
- C: CHOP 方案（环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松）
- D: CTX+美司钠（环磷酰胺+美司钠）

答案：C

82. 可引起驾驶员定向力障碍的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 阿托品
- C: 氨苯蝶啶
- D: 苯噻啶

答案：A

83. 可引起良性颅内压增高、囟门隆起

- A: 抗组胺药
- B: 维生素 A
- C: 苯妥英钠
- D: 氯霉素

答案：B

84. 属于胃黏膜保护剂的是 ()

- A: 铝碳酸镁
- B: 法莫替丁
- C: 多潘立酮
- D: 埃索美拉唑

答案: A

85. 进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

- A: 临床预试验
- B: II 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案: D

86. 具有吸附力，对氰化物无效的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 3%鞣酸溶液
- C: 淀粉溶液
- D: 1: 5000 高锰酸钾

答案: A

87. (2016 年真题) 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是 ()

。

- A: 复方苯甲酸软膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 酮康唑软膏
- D: 联苯苄唑软膏

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/635232314121012033>