常见急症与急救试题及标准答案

全科医师岗位培训常见急症与急救试题单位学号姓名得分

选择题（A 型题,每题只选一项答案）

1.以下哪一项不属于心搏骤停（B）

A.未能预见时间内突然发生

B.慢性病终末期心脏停搏

C.有效循环突然中止

D.心电图表现为心电—机械分离

E.心室颤动

2.以下哪一项不属于非心源性停搏（D）

A.电击或雷击

B.心脏手术

C.心导管检查

D.原发性电生理紊乱

E.麻醉意外

3.心搏骤停最可靠且出现较早的临床征象是（C）

A.意识突然丧失

B.大动脉搏动消失

C.意识突然丧失和大动脉搏动消失

D.心电图表现为心室颤动 E 瞳孔散大

4.心前区捶击的适应证为（C）

A.1 分钟内目击心搏骤停

B.心电监测有心室颤动

C.1 分钟内目击心搏骤停或心电监测有心室颤动

D.电击除颤无效者

E.现场没有除颤仪

5.有关胸外心脏按压，以下哪一项不正确（D）

A.下压深度 4~5cm

B.按压频率为 100 次/分

C.按压时间与放松时间相等

D.放松时掌根部须离开胸壁

E.这一方法于 1960 年提出

6.双人复苏人工呼吸与胸部按压之比应为（B）

A.1：5

B.2：30

C.1：15

D.2：15

E.以上都不对

7.以下哪一项不是进一步生命支持的同义词（D）

A.二期复苏

B.高级生命支持

C.ALS

D.基础生命支持

E.高级生命维护

8.复苏用药以何种途径为首选（B）

A.心内注射

B.静脉注射

C.气管滴入法

D.皮下注射

E.肌肉注射

9.有关电击除颤，以下哪一项正确（B）

A.电击除颤后，一般需要 45~60 秒才能恢复正常窦律

B.电击后仍应继续进行 CPR

C.电击能量成人第一次为 300J

D.静脉注射肾上腺素不能提高除颤成功率

E.静脉注射肾上腺素可使室颤波由粗变细而容易被电除颤

10.以下哪一项不属于现场急救基本技术（A）

A.清创

B.止血

C.包扎

D.固定

E.搬运

11.关于指压止血法，适用于以下哪一项（E）

A.小动脉出血

B.中静脉出血

C.小静脉出血

D.毛细血管出血

E.中等或较大的动脉出血

12.包扎是外伤急救常用方法，以下哪一项不确切（E）

A.具有保护伤口作用

B.具有减少污染作用

C.具有固定敷料作用

D.具有压迫止血作用

E.具有减轻疼痛作用

13.固定材料中最理想的是（C）

A.竹板

B.木棒

C.夹板

D.镐把

E.枪托

14.固定是针对骨折的急救措施，有关固定，以下哪一项欠确切（B）

A.可以限制骨折部位的移动

B.不能减轻伤员的疼痛

C.可避免骨折断端因摩檫而损伤血管、神经及重要脏器

D.有利于防治休克

E.便于伤员的搬运

15.几种特殊伤员的担架搬运不包括（C）

A.腹部内脏脱出的伤员

B.昏迷或有呕吐窒息危险的伤病员

C.四肢损伤的伤员

D.骨盆损伤的伤员

E.脊柱损伤的伤员

16.轻度血气胸属于二级伤情，一般来说可延迟多少小时手术不至于有危险（C）

A .1-2h

B .2-6h

C .6-8h

D .8-18h

E .18-24h

17.成人窒息的站位急救，一般为快速向上、向后用力冲击患者上腹部（D）

A.1-2 次

B.2-4 次

C.4-6 次

D.6-8 次

E.8-10 次

18.鼻衄出血时间持续超过多少分钟应寻找医疗救助（D）

A.5min

B.10min

C.15min

D.20min

E.30min

19. 关于急性呼吸衰竭，以下哪一项欠确切（D）

A.由各种原因引起的、呼吸系统较为常见的急症

B.发生机理为肺通气和/或换气功能的严重障碍

C.动脉血气分析有助于诊断

D.测得动脉氧分压低于 8.0kPa，须同时合并动脉二氧化碳分压高于 6.7kPa

E.必须注重对原发病的处理

20.在处理急性呼衰时，应优先处理动脉低氧血症，其原则是使氧饱和度至少维持在（A）

A.90% 以上

B.80% 以上

C.75% 以上

D.60% 以上

E.50% 以上

21.以下哪一项不符合休克的处理原则（C）

A.尽早去除引起休克的病因

B.尽快恢复有效循环血量

C.使用血管收缩剂，升高血压

D.恢复机体的正常代谢

E.维持重要脏器功能

22.判断休克程度最简便、可靠的指标之一是（D）

A.血压

B.脉搏

C.意识

D.尿量

E.肢体温度及色泽

23.补充血容量是抗休克的基本措施，但对以下哪一种休克补液要慎重（B）

A.感染性休克

B.心源性休克

C.低血容量性休克

D.过敏性休克

E.神经源性休克

24.抗休克治疗中，常用的胆碱能受体阻滞剂有以下几种，其中最常用的是（B）

A.阿托品

B.山莨菪碱

C.东莨菪碱

D.颠茄

E.其他胆碱能受体阻滞剂

25.能均衡地扩张动静脉血管，减轻心脏前、后负荷的代表性药物为（E）

A.多巴胺

B.异丙肾上腺素

C.苯苄胺

D.酚妥拉明

E.硝普钠

26.以下哪种药物为最常用的强心剂，具有增强心肌收缩力及减慢心率的作用（D ）

A.多巴胺

B.肾上腺素

C.异丙肾上腺素

D.西地兰

E.多巴酚丁胺

27.休克同时如伴发下列哪一项，常常提示病情危重，要注意加以识别，及早预防或处理，并及时安排转送上级医院（E）

A.昏迷

B.急性呼吸窘迫综合征（ARDS ）

C.多脏器功能不全（MOF ）

D.弥散性血管内凝血（DIC ）

E.以上都是

28.下列哪一项不符合癫痫持续状态（C ）

A.癫痫发作频繁

B.抽搐间期意识没有完全恢复

C.抽搐间期意识清楚

D.一次发作持续 30 分钟以上

E.一些专家建议痫性发作超过 4～5 分钟即属于癫痫持续状态

29.下列哪一项不符合惊厥性癫痫持续状态（C ）

A.大发作持续状态

B.半身发作持续状态

C.小发作持续状态

D.局限性运动性发作持续状态

E.小运动性癫痫持续状态

30.癫痫持续状态的急救应选用快速有效而半衰期较短的药物及时控制发作，常首选（D ）

A.苯巴比妥钠

B.苯妥英钠

C.氯硝基安定

D.安定

E.水合氯醛

31.一氧化碳是由含碳物质燃烧不完全产生的气体，以下哪一项不正确（C ）

A.无色、无臭、无刺激性

B.分子量 28

C.密度比空气重

D.是引起急性中毒最常见的有害气体之一

E.包括工业生产性中毒和日常生活性中毒

32.一氧化碳与血红蛋白结合的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力（A ）

A.大 250 ～300 倍

B.大 150 ～200 倍

C.大 50～100 倍

D.小 150 ～200 倍

E.小 250 ～300 倍

33.以下哪一项不属于急性 CO 中毒迟发性脑病（C ）

A.经过 2~30 天假愈期

B.又出现神经精神症状

C.出现急性痴呆性木僵型精神障碍

D.少数可出现锥体系受损表现

E.甚至出现运动性失语

34.高压氧用于治疗 CO 中毒效果最好，其机理是（D ）

A.氧流量大

B.氧浓度高

C.氧流量大和氧浓度高

D.3 个大气压下吸纯氧时，全血中物理溶解氧可提高 20 倍

E.密闭式面罩法供氧

35.急性一氧化碳中毒临床上表现为急性脑缺氧的症状和体征，按病情轻重分三级，其中重度中毒血中碳氧血红蛋白可高于（E）

A.80％

B.75％

C.70％

D.60％

E.50％

36.急性一氧化碳中毒发生时，应迅速予以现场急救，以下除了哪种情况均是高压氧治疗的指征（A ）

A.轻度中毒者

B.中度及重度中毒患者

C.孕妇 CO 中毒

D.CO 中毒昏迷

E.CO 中毒有短暂意识丧失

37.以下除外哪一项均为有机磷农药中毒之毒蕈碱样症状（E）

A.腺体分泌亢进

B.平滑肌痉挛

C.瞳孔缩小

D.心血管功能抑制

E.心动过速

38.急性有机磷农药中毒分为三级，重度中毒全血胆碱酯酶活性一般在（C）

A.50％以下

B.40％以下

C.30％以下

D.20％以下

E.10％以下

39.急性有机磷农药中毒出现以下情况应考虑有脑水肿，除外（D）

A.应用足量解毒剂后，意识障碍仍不见好转

B.两侧瞳孔不等大或眼底视神经乳头水肿

C.有中枢性呼吸衰竭表现

D.脉搏变快，血压下降

E.频繁发生喷射性呕吐

40.急性有机磷农药中毒发生猝死，其原因有以下几种可能，除外（E）

A.中枢性呼吸衰竭

B.脑水肿、脑血形成

C.中毒性心肌损害所致的严重心律失常

D.急性呼吸窘迫综合征

E.上消化道出血

41.有机磷农药经口服中毒者，洗胃插入胃管后，应先将胃内容物尽量抽尽，再注入洗胃液，每次注入量不超过（B）

A.500～800ml

B.300～500ml

C.200～300ml

D.100～200ml

E. 50～100ml

42.急性有机磷农药中毒使用阿托品救治，以下哪一项欠确切（C）

A.应早期、足量、反复给药

B.应快速达到阿托品化和维持足够时间

C.应根据瞳孔和心率两项指征来判断是否阿托品化

D.每个中毒患者达到阿托品化所需的剂量相差很大

E.须防止阿托品中毒

43.急性镇静催眠药物中毒在我国大多数地区特别是城镇占急性中毒发病率（A）

A.首位

B.第二位

C.第三位

D.第四位

E.第五位

44.巴比妥类药物引起镇静催眠作用的机理主要是由于（A）

A.选择性抑制脑干网状结构上行激活系统

B.促进 γ-氨基丁酸（GABA ）能神经的功能，增强其抑制效应

C.对中枢神经系统的普遍抑制作用

D.影响条件反射和共济协调性

E.抑制呼吸和血管运动中枢

45.苯二氮卓类药物引起镇静催眠作用的机理主要是由于（B）

A.选择性抑制脑干网状结构上行激活系统

B.增强 γ-氨基丁酸（GABA ）的突触后抑制作用

C.对中枢神经系统的普遍抑制作用

D.影响条件反射和共济协调性

E.抑制呼吸和血管运动中枢

46.急性重度巴比妥类药物中毒可出现深度昏迷，其口服剂量约为催眠剂量的（C）

A. 2～5 倍

B. 5～10 倍

C.10～20 倍

D.20～30 倍

E.30～50 倍

47.氟马西尼主要用于（D）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/635322131302011340