

康复评定基础模拟考试题

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、在语言发育迟缓评定方法中,S-S 评定法适用于（）岁的语言发育迟缓的儿童

- A、10
- B、3
- C、1~6.5
- D、1
- E、5

正确答案：A

2、股四头肌无力步态特点有（）

- A、跨越步态
- B、跟足步态
- C、扶膝步态
- D、垂足步态
- E、膝塌陷步态

正确答案：C

3、36 项健康调查简表（SF-36）包括（）领域,36 个项目,评定分为 5 个等级

- A、4
- B、10
- C、2
- D、8
- E、6

正确答案：D

4、根据符号形式与指示内容关系（S-S）法共分为几个阶段（）

- A、6
- B、2
- C、4
- D、3
- E、5

正确答案：E

5、徒手肌力检查，有轻微收缩，但不能引起关节运动的肌力为

- A、无法判断

B、1级

C、0级

D、3级

E、2级

正确答案：B

6、TENS 疗法是指

A、神经肌肉电刺激疗法

B、电兴奋疗法

C、经皮电神经刺激疗法

D、间动疗法

正确答案：C

7、以下哪种是小脑损伤后的步态（）

A、酩酊步态

B、鸭步

C、剪刀步

D、跨栏步

E、慌张步态

正确答案：A

8、下面结构属于关节盘的是（）

A、关节孟唇

B、耻骨联合

C、半月板

D、关节囊

E、关节软骨

正确答案：C

9、胸腰部侧屈正常关节活动度为（）

A、 $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$

B、 $0^{\circ} \sim 40^{\circ}$

C、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$

D、 $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$

E、以上都不是

正确答案：B

10、肺活量是指（）

A、深吸气后作平静呼气所呼出的气量

- B、平静吸气后作平静呼气所呼出的气量
- C、深吸气后作随意呼气所呼出的气量
- D、平静吸气后作最大呼气所呼出的气量
- E、深吸气后作最大呼气所呼出的气量

正确答案：E

11、肌张力增高是由于

- A、上运动神经元损伤引起
- B、交感神经损伤引起
- C、下运动神经元损伤引起
- D、感觉神经损伤引起
- E、副交感神经损伤

正确答案：A

12、平衡性协调运动评定结果为完成活动时需大量的身体接触加以保护
()

- A、1级
- B、3级
- C、4级
- D、2级
- E、0级

正确答案：D

13、常见的言语语言障碍不包括 ()

- A、语言发育迟缓
- B、口吃
- C、失语症
- D、构音障碍
- E、昏迷时不能说话

正确答案：E

14、测量上肢长度应测量从肩峰外侧端到 () 的距离

- A、中指尖
- B、小指尖
- C、外踝下缘
- D、膝关节外侧关节间隙
- E、外踝尖

正确答案：A

15、Ashworth 评定量表是用于评定()的方法

- A、肌力
- B、肌张力
- C、关节活动度
- D、语言功能

正确答案：B

16、痉挛的主要治疗方法有

- A、减少产生痉挛的外界刺激
- B、运动疗法
- C、药物
- D、神经阻滞疗法
- E、以上均是

正确答案：E

17、关于肌耐力的概念，正确的是()。

- A、达到峰值所需的时间
- B、肌力的大小指标
- C、肌力所能维持的时间
- D、肌力训练时发展肌力的速率
- E、肌力训练时的负荷量

正确答案：E

18、促进学习记忆的神经介质是()

- A、乙酰胆碱
- B、5-HT
- C、肾上腺素
- D、多巴胺
- E、毒蕈碱

正确答案：A

19、()是全身最粗大的神经

- A、坐骨神经
- B、桡神经
- C、正中神经
- D、尺神经
- E、股神经

正确答案：A

20、下列哪种疾病的最早出现的症状是腰痛()

- A、颅脑外伤
- B、恶性肿瘤
- C、颈椎病
- D、腰椎间盘突出症

正确答案：B

21、摆动相占整个步行周期

- A、40%
- B、60%
- C、30%
- D、30%
- E、50%

正确答案：A

22、饮水试验是筛查吞咽障碍的常用方法,患者常常呛咳,难以将 30ml 温水喝完,对其进行分级及诊断为()

- A、IV级,确定有吞咽障碍
- B、I级,可疑吞咽障碍
- C、II级,可疑吞咽障碍
- D、V级,确定有吞咽障碍
- E、III级,确定有吞咽障碍

正确答案：D

23、一个步行周期中包含()

- A、一个单支撑期和两个双支撑期
- B、一个双支撑期
- C、一个单支撑期
- D、两个单支撑期和一个双支撑期
- E、一个单支撑期和一个双支撑期

正确答案：A

24、ADL 的 Katz 指数评定将 ADL 能力分为()

- A、六项内容、七个级别
- B、六项内容、六个级别
- C、七项内容、七个级别
- D、七项内容、六个级别
- E、以上全部对

正确答案：A

25、俯卧位平衡反应的形成时间一般在（ ）

- A、8 个月
- B、1 个月
- C、4 个月
- D、3 个月
- E、6 个月

正确答案：E

26、靶心率（THR）是指（）（）

- A、与运动中绝不能超过的最高强度相当的心率
- B、与运动应该达到的适宜强度相当的心率
- C、亚极量负荷时的心率
- D、运动终止后 5min 时的心率
- E、以上都不是

正确答案：A

27、髋关节内旋时正常活动度是（）

- A、 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$
- B、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- C、 $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- D、 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$
- E、 $0^{\circ} \sim 25^{\circ}$

正确答案：B

28、测量下肢真实长度时，下端以胫骨内踝作为骨性标志，上端的标志为（）。

- A、耻骨联合
- B、髌前下棘
- C、髌前上棘
- D、股骨大转子
- E、肚脐

正确答案：C

29、胸腰部旋转正常关节活动度为（）

- A、 $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B、 $0^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- C、 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$

- D、 $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$
- E、以上都不是

正确答案：C

30、女性人群一般以何种呼吸为主（ ）

- A、局部呼吸
- B、缩唇样呼吸
- C、腹式呼吸
- D、胸式呼吸
- E、劳力性呼吸

正确答案：D

31、下列不是脑瘫儿童的语言发育迟缓之临床表现为（ ）

- A、语言理解困难
- B、回答问题反应正常
- C、语言交流技能较低
- D、不会用句子
- E、说话晚或很晚

正确答案：B

32、吞咽功能评定饮水试验时饮水量为

- A、10ml
- B、随意
- C、100ml
- D、50ml
- E、30ml

正确答案：E

33、足下垂步态是由于

- A、胫后肌无力
- B、趾长伸肌
- C、腓骨长短肌无力
- D、小腿三头肌无力
- E、胫前肌无力

正确答案：E

34、关于最大摄氧量 V_{O2max} , 不正确的概念是（ ）

- A、运动训练可通过外周效应和中心效应提高最大摄氧量
- B、一般在 40 岁时达到峰值

- C、也称为最大耗氧量
- D、正常情况下取决于心排出量和动静脉氧分压差
- E、是综合反映心肺功能的最好生理指标

正确答案：B

35、测量下肢长度应测量从股骨大转子到（ ）的距离

- A、小指尖
- B、外踝下缘
- C、外踝尖
- D、膝关节外侧关节间隙
- E、中指尖

正确答案：C

36、完成屈肘动作时,肱二头肌是（ ）

- A、副动肌
- B、拮抗肌
- C、固定肌
- D、中和肌
- E、原动肌

正确答案：E

37、老年性痴呆的初发症状为（ ）

- A、失算
- B、记忆障碍
- C、人格变化
- D、大小便失禁
- E、空间定向障碍

正确答案：B

38、半月板弹响试验是指（ ）

- A、侧方挤压试验
- B、研磨试验
- C、回旋研磨试验
- D、髌骨摩擦试验
- E、膝关节旋转提拉和挤压试验

正确答案：C

39、肩关节外展正常关节活动度为（ ）

- A、 $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$

- B、 $0^{\circ} \sim 70^{\circ}$
- C、 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$
- D、 $0^{\circ} \sim 170^{\circ}$
- E、以上都不是

正确答案：D

40、下列哪项不是异常步态常见的原因（）

- A、精神疾病
- B、周围神经系统病变
- C、骨关节病
- D、肌肉病变
- E、中枢神经系统病变

正确答案：A

41、有关F波的说法不正确的是（）

- A、刺激电流强度为超强刺激
- B、常用于近心端神经受累的判定
- C、需连续记录20个波
- D、在诊断神经丛病时常采用双侧对比
- E、常用于S1神经根病的判定

正确答案：E

42、拿哑铃时的肱二头肌的收缩属于（）

- A、等速收缩
- B、等长收缩
- C、等张离心收缩
- D、等张向心收缩
- E、以上均不是

正确答案：D

43、单支撑相占步行周期的（）

- A、60%
- B、45%
- C、50%
- D、55%
- E、40%

正确答案：E

44、以下不是关节活动度的检查方法包括（）

- A、铅垂线法
- B、距离法
- C、方盘量角器法
- D、量表法
- E、通用量角器法

正确答案：E

45、用于判断记忆功能障碍及记忆功能类型的是（ ）

- A、韦氏记忆测试,
- B、运动性失用
- C、观念性失用
- D、单侧忽略评定
- E、穿衣失用

正确答案：A

46、钟摆试验常用于（ ）

- A、上肢肌痉挛
- B、颈部肌肉痉挛
- C、下肢肌痉挛
- D、腹肌痉挛
- E、以上均不是

正确答案：C

47、一偏瘫病人，用手扶着能够独立地从椅子上站起，Berg 评分为（ ）。

- A、5分
- B、4分
- C、3分
- D、2分
- E、1分

正确答案：C

48、“鸭步”属于（ ）

- A、臀大肌步态
- B、划圈步态
- C、膝塌陷步态
- D、臀中肌步态
- E、慌张步态

正确答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636004014033011002>