

2024 年上海市松江区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题完整题库含答案 (达标题)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. (2015 年真题) 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿剂的是 ()。

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 乙酰唑胺

答案: C

2. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是

- A: 非那雄胺
- B: 硝酸甘油
- C: 丙酸睾酮
- D: 甲睾酮

答案: B

3. 可导致视神经炎的抗结核药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 利福喷丁
- D: 吡嗪酰胺

答案: A

4. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 血小板数量
- B: 网织红细胞计数
- C: 血红蛋白测定
- D: 血清铁蛋白

答案：A

5. 患者女性，40 岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。

- A: 维生素 C
- B: 碳酸钙
- C: 维生素 B
- D: 碳酸氢钠

答案：D

6. 过量使用，会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积，引起严重肝毒性的药物是()

- A: 双氯芬酸
- B: 阿司匹林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 塞来昔布

答案：C

7. 长期大量服用维生素 B6 会出现

A: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：B

8. 属于抗雌激素类的是 ()

A: 睾酮

B: 他莫昔芬

C: 甲地孕酮

D: 己烯雌酚

答案：B

9. 主要作用于有丝分裂 M 期，干扰微管蛋白合成的药物是

A: 高三尖杉酯碱

B: 氟尿嘧啶

C: 顺铂

D: 多柔比星

答案：A

10. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

A: 双氯芬酸

B: 特拉唑嗪

C: 美托洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案: D

11. 伴有糖尿病肾病的高血压患者应首选的降压药是

A: 氨氯地平

B: 氢氯噻嗪

C: 氯沙坦

D: 吲达帕胺

答案: C

12. 降低心脏前、后负荷，对急性心肌梗死及高血压所致的慢性心力衰竭效果较好()

A: 氨力农

B: 硝普钠

C: 多巴酚丁胺

D: 地高辛

答案: B

13. 关于糖皮质激素对血液成分影响的描述，错误的是

A: 使红细胞和血红蛋白含量增加

B: 使中性白细胞数增多

C: 降低纤维蛋白原浓度

D: 使血小板增多

答案: C

14. 适应症仅应用于治疗失眠的药物是()

A: 地西洋

B: 苯巴比妥

C: 氟西汀

D: 佐匹克隆

答案: D

15. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 骨发育不全

B: 骨质疏松

C: 佝偻病

D: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

答案: D

16. (2018 年真题) 可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是 ()

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 对氨基水杨酸

答案: A

17. 下列药动学/药效学 (PK/PD) 参数中，适用于浓度依赖型抗菌药物的评估指标

A: 血浆药物峰浓度与达峰时间比值 (C_{max}/T_{max})

B: 血浆药物峰浓度与最低抑菌浓度比值 (C_{max}/MIC)

C: 血浆药时曲线下面积与血浆达峰时间比值 (AUC/T_{max})

D: 血浆药物半衰期 ($t_{1/2}$)

答案: B

18. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 奈替米星
- D: 阿莫西林

答案：A

19. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

- A: 肝素
- B: 噻氯匹啶
- C: 尿激酶
- D: 华法林

答案：B

20. 对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A: 去氧孕烯
- B: 维生素 B6
- C: 甲羟孕酮和炔雌醇
- D: 炔雌醇

答案：C

21. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 呋塞米
- B: 螺内酯
- C: 乙酰唑胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

22. 治疗脑水肿、降低颅内压的首选药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 阿米洛利
- C: 甘露醇
- D: 螺内酯

答案：C

23. (2021 年真题) 属于短效避孕药，但其埋植剂可作为长效避孕药使用的药物是 ()

- A: 孕二烯酮
- B: 去氧孕烯
- C: 左炔诺孕酮
- D: 氯地孕酮

答案：C

24. 血管紧张素 I 转化酶抑制剂是

- A: 地高辛
- B: 依那普利
- C: 多巴酚丁胺
- D: 米力农

答案：B

25. (2021 年真题) 舌下给药吸收迅速、起效最快，作为心绞痛急性发作首选的治疗药物是 ()

- A: 美托洛尔
- B: 硝酸甘油

C: 硝酸异山梨酯

D: 单硝酸异山梨酯

答案：B

26. 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是（）

A: 甲硝唑

B: 苜星青霉素

C: 庆大霉素

D: 呋喃妥因

答案：A

27. （2015 年真题）使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（）。

A: 果糖

B: 硫酸镁

C: 氯化钙

D: 氯化钾

答案：C

28. 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是（）。

A: 美托洛尔

B: 硝酸甘油

C: 利多卡因

D: 索他洛尔

答案：D

29. 早产系指妊娠在多少周之间结束者

A: 28~37 周

B: 28~38 周

C: 25~37 周

D: 18~37 周

答案：A

30. 连续使用应间隔 4 小时以上 ()

A: 麻黄碱

B: 赛洛唑啉

C: 羟甲唑啉

D: 酚甘油滴耳液

答案：C

31. 可使尿酸浓度升高，可引起痛风急性发作的是

A: 红霉素

B: 吡嗪酰胺

C: 异烟肼

D: 乙胺丁醇

答案：B

32. 对于高胆固醇血症造成高危心肌梗死的患者，作为一线治疗药物应选择 ()

A: 阿昔莫司

B: 烟酸

C: 洛伐他汀

D: 非诺贝特

答案：C

33. 属于 IA 类抗心律失常药

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：C

34. (2019 年真题) 推荐与吸入性糖皮质激素联合使用，尤其适合于中、重度持续哮喘患者长期治疗的药物是 ()

- A: 长效 β_2 受体激动剂
- B: M 胆碱受体阻断剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：A

35. 属于润滑性泻药的是

- A: 番泻叶
- B: 多库酯钠
- C: 利那洛肽
- D: 欧车前

答案：B

36. (2019 年真题) 患者，男，8 岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸闷、气短、呼吸困难，喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应，按照其发生机制，该患者发生的过敏反应，在分型上属于 ()

- A: III 型变态反应
- B: II 型变态反应
- C: IV 型变态反应
- D: I 型变态反应

答案：D

37. 对组胺 H

- A: 甲硝唑
- B: 丙谷胺
- C: 雷尼替丁
- D: 哌仑西平

答案：C

38. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

- A: 溴苄胺
- B: 硝苯地平
- C: 地尔硫
- D: 维拉帕米

答案：A

39. 高钠血症是指

- A: 血钠 $>130\text{mmol/L}$
- B: 血钠 $>140\text{mmol/L}$
- C: 血钠 $>135\text{mmol/L}$
- D: 血钠 $>145\text{mmol/L}$

答案：D

40. 对乙酰氨基酚中毒可使用的解救药是

- A: 肾上腺素
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 喷托维林
- D: 阿托品

答案：B

41. 治疗阵发性室上性心动过速的最佳药物是()

- A: 普鲁卡因胺
- B: 维拉帕米
- C: 苯妥英钠
- D: 奎尼丁

答案：B

42. 四环素联用麦角生物碱

- A: 肝毒性增加
- B: 口服吸收减少
- C: 增加麦角中毒的风险
- D: 调整抗凝血药的剂量

答案：C

43. (2021 年真题) 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物()

- A: 依达拉奉
- B: 尼莫地平
- C: 多奈哌齐
- D: 吡拉西坦

答案：C

44. 通过抑制 GABA 转移酶而达到抗癫痫作用的药物是

- A: 乙内酰胺类
- B: γ -氨基丁酸类似物
- C: 二苯并氮革类

D: 脂肪酸类

答案：B

45. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是

- A: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- B: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用
- C: 属于蒽环类抗肿瘤药物
- D: 典型不良反应是骨髓抑制和心脏毒性

答案：A

46. 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是()

- A: 布美他尼
- B: 依托塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 依他尼酸

答案：C

47. （2016 年真题）不属于口服避孕药所致不良反应的是

- A: 突破性出血
- B: 低钙血症
- C: 增加血栓栓塞性疾病风险
- D: 月经失调

答案：B

48. 阿托品禁用于

A: 胆绞痛

B: 全身麻醉前给药

C: 遗尿症

D: 青光眼

答案：D

49. 呋塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

A: 2mg / kg

B: 8mg / kg

C: 6mg / kg

D: 4mg / kg

答案：C

50. 头孢曲松()

A: 肾毒性较大

B: 用于非典型致病原感染

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

答案：D

51. 茚地那韦的作用靶点是

A: 神经氨酸酶

B: HIV-1 反转录酶

C: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

D: 脱氧核糖核酸聚合酶

答案：C

52. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制甲状腺蛋白水解酶
- B: 抑制碘泵
- C: 抑制甲状腺素的生物合成
- D: 抑制 Na^+-K^+ 泵

答案：C

53. 一般补钾速度不超过

- A: $10\text{mol} / \text{min}$
- B: $10\text{mol} / \text{h}$
- C: $10\text{mmol} / \text{h}$
- D: $10\text{mmol} / \text{min}$

答案：C

54. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 孕育异常
- B: 夜盲症
- C: 佝偻病
- D: 脚气病

答案：A

55. 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是()

- A: 茶碱
- B: 孟鲁司特
- C: 沙美特罗
- D: 噻托溴铵

答案：C

56. 在真菌细胞内代谢后进入真菌的 RNA，抑制 DNA 和 RNA 的合成，导致真菌死亡的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 万古霉素
- C: 伊曲康唑
- D: 两性霉素

答案：A

57. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 中度透过血-脑屏障
- B: 以原型药物经肾脏排泄
- C: 较易进入中枢神经系统，可致神经系统不良反应
- D: 胃肠道吸收不完全

答案：C

58. (2015 年真题) 长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充 ()。

- A: 维生素 E 和叶酸
- B: 维生素 A 和维生素 D
- C: 维生素 C 和烟酸
- D: 维生素 B 和维生素 K

答案：D

59. 糖尿病酮症酸中毒患者选用 ()

- A: 格列本脲
- B: 丙硫氧嘧啶

C: 胰岛素

D: 二甲双胍

答案: C

60. 主要用于经他莫昔芬辅助治疗 2~3 年后，绝经后雌激素受体阳性的妇女的早期浸润性乳腺癌的辅助治疗，直至完成总共 5 年的辅助内分泌治疗，以及经他莫昔芬治疗后，其病情仍有进展的自然或人工绝经后妇女的晚期乳腺癌，该药物是

A: 氟维司群

B: 他莫昔芬

C: 依西美坦

D: 来曲唑

答案: C

61. 下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

A: 用生理盐水做溶剂

B: 禁食热饮热水

C: 禁食冷饮冷水、接触凉物

D: 禁止接触塑料制品

答案: C

62. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

A: 地芬诺酯对肠道作用类似吗啡

B: 地芬诺酯是吗啡的衍生物

C: 含地芬诺酯和阿托品

D: 为阿片受体激动剂

答案：B

63. 对于万古霉素，描述错误的是()

A: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

B: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

C: 口服给药可用于难辨梭杆菌性假膜性肠炎

D: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用

答案：D

64. 可用于单纯疱疹性角膜炎的药物是

A: 阿托品

B: 20%甘露醇

C: 碘苷

D: 奥布卡因

答案：C

65. 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

A: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素

B: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸

C: 异烟肼、利福平、莫西沙星

D: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇

答案：D

66. 属于头孢一代的是

A: 头孢呋辛

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 头孢唑林
- C: 拉氧头孢
- D: 头孢曲松

答案：B

67. 容积性泻药()

- A: 硫酸镁
- B: 乳果糖
- C: 甘油
- D: 地芬诺酯

答案：A

68. 治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 磺胺米隆

答案：B

69. 治疗滴虫病宜选用

- A: 吡喹酮
- B: 甲硝唑
- C: 氯喹
- D: 甲苯咪唑

答案：B

70. (2015 年真题) 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是
()。

- A: 文拉法辛
- B: 阿米替林
- C: 吗氯贝胺
- D: 氟西汀

答案：A

71. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

- A: 结核杆菌
- B: 厌氧菌
- C: 革兰阴性菌
- D: 铜绿假单胞菌

答案：B

72. 属于丙烯胺类的是

- A: 制霉菌素
- B: 特比萘芬
- C: 氟胞嘧啶
- D: 卡泊芬净

答案：B

73. 属于解毒类保肝药的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 双环醇
- C: 异甘草酸镁
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：D

74. 合成五味子丙素时的中间体，降低血清谷丙转氨酶效果好的是

- A: 还原型谷胱甘肽
- B: 双环醇
- C: 异甘草酸镁
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：B

75. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

- A: 一日二次，早、晚使用
- B: 一日一次，睡前使用
- C: 一日一次，晨起使用
- D: 一日一次，固定时间使用

答案：B

76. 不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

- A: 苯乙双胍
- B: 二甲双胍
- C: 甲苯磺丁脲
- D: 阿卡波糖

答案：B

77. 弱效(使 LDL-ch 水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

- A: 依折麦布
- B: 小剂量氟伐他汀
- C: 大剂量阿托伐他汀
- D: 小剂量阿托伐他汀

答案：B

78. 诱导肝微粒体酶、是皮质激素和雌激素药效降低的是()

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：A

79. 不易导致便秘或腹泻不良反应的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 氢氧化铝
- C: 铝碳酸镁
- D: 三硅酸镁

答案：C

80. (2015 年真题) 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是 ()。

- A: 多柔比星
- B: 氟尿嘧啶
- C: 多西他赛
- D: 伊立替康

答案：A

81. 具有阿片样作用，长期大量服用可产生欣快感，并可能出现药物依赖性的止泻药是 ()

- A: 洛哌丁胺
- B: 蒙脱石散
- C: 乳果糖
- D: 地芬诺酯

答案：D

82. 糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用()

- A: 胰岛素
- B: 格列齐特
- C: 格列喹酮
- D: 格列吡嗪

答案：C

83. 属于刺激性泻药的是()

- A: 利那洛肽
- B: 番泻叶
- C: 多库酯钠
- D: 欧车前

答案：B

84. 属于 Ia 类抗心律失常药的是

- A: 奎尼丁
- B: 普罗帕酮
- C: 胺碘酮
- D: 利多卡因

答案：A

85. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

- A: 甲氧氯普胺
- B: 哌仑西平

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 雷尼替丁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/636144130230011030>