

## 外科护理模拟题与答案

1、破伤风病人采用人工冬眠,主要目的是( )

- A、 控制炎症扩散
- B、 减少抽搐
- C、 便于护理
- D、 降低体温
- E、 防止合并症发生

答案: B

2、疔的处理应禁忌( )

- A、 热敷
- B、 挤压
- C、 2%的碘酊涂抹
- D、 碳酸烧灼顶部
- E、 待其自行吸收

答案: B

3、备皮范围原则上应超出切口四周的距离至少( )

- A、 10cm
- B、 15cm
- C、 20cm
- D、 25cm
- E、 30cm

答案: C

4、下列对破伤风抽搐病人的护理哪项是错误的( )

- A、 为减少刺激,不需专人护理
- B、 病床上加床栏,防止坠床
- C、 床边备有气管切开包
- D、 床边备有吸引器
- E、 可在病人牙间放入一小卷纱布

答案: A

5、胃肠道手术后病人常需禁食1~2天,一般成人每日输液量为:( )

- A、 1000ml
- B、 3500ml
- C、 1500ml
- D、 4000ml
- E、 2500ml

答案：E

6、下列哪项符合早期休克( )

- A、面色苍白,烦躁不安
- B、脉弱无力
- C、血压降低
- D、代谢性酸中毒
- E、皮肤粘膜出现瘀斑

答案：D

7、以下术后卧位,哪项不正确( )

- A、颈、胸部术后高半坐卧位
- B、腹部术后低半坐卧位
- C、脊柱、臀部术后俯卧或仰卧位
- D、肥胖病人可取侧卧位
- E、颅脑术后可取头低脚高位

答案：E

8、吸入性全身麻醉前必须给病人使用( )

- A、安定
- B、吗啡
- C、阿托品
- D、异丙嗪
- E、苯巴比妥钠

答案：C

9、手术过程中,清点核对器械,敷料的时间是( )

- A、手术开始前和准备关体腔前
- B、手术进行中
- C、手术开始前
- D、开始缝合皮肤前
- E、手术完毕后

答案：A

10、反映休克病人危重征象的指标是( )

- A、收缩压低于 80mmHg
- B、伴代谢性酸中毒
- C、脉搏细速 120 次/分
- D、神志淡漠
- E、皮肤出现多处瘀点、瘀斑

答案：E

11、局部浸润麻醉时普鲁卡因的浓度为( )

- A、 0.25%~1%
- B、 0.25%~0.5%
- C、 1%~2%
- D、 2%~4%
- E、 4%~6%

答案：A

12、患者,女性,30岁,哮喘持续状态2天,动脉血气分析

pH7.35,PaCO<sub>2</sub>9.3kPa,PaO<sub>2</sub>6.6kPa,BE+2mmol/L,HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>-26mmol/L,其酸碱失衡的类型是( )

- A、 呼吸性碱中毒
- B、 代谢性酸中毒
- C、 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
- D、 呼吸性酸中毒代偿期
- E、 代谢性碱中毒

答案：D

13、脓性指头炎切开的时机为( )

- A、 指头红肿明显
- B、 局部张力显著增高,出现跳痛
- C、 出现波动感
- D、 疼痛减轻时
- E、 指骨坏死时

答案：B

14、人体每日钾的生理需要量如以氯化钾计需要多少克?( )

- A、 1~2g
- B、 2~3g
- C、 3~4g
- D、 4~6g
- E、 8~10g

答案：C

15、患者,男性,严重创伤后,血压降低,脉搏细速,面色苍白,诊断为休克。

治疗时重点应注意( )

- A、 急性肾功能衰竭的发生
- B、 及时扩充血容量

- C、 及时使用甘露醇
- D、 避免使用血管收缩药
- E、 药物对各脏器的毒性

答案： B

16、 某病人体重 60kg, 体温持续 39℃, 晚间用退烧药后, 大汗淋漓, 渗湿一身衬衣裤, 估计以上两项额外失水量是()

- A、 500ml
- B、 800ml
- C、 1000ml
- D、 1500ml
- E、 2000ml

答案： D

17、 病人痰液有恶臭味, 提示哪种细菌感染( )

- A、 肺炎链球菌
- B、 绿脓杆菌
- C、 厌氧菌
- D、 霉菌
- E、 金黄色葡萄球菌

答案： C

18、 甲沟炎出现甲下脓肿时下列最有效的处理措施是( )

- A、 局部理疗
- B、 外敷硫酸镁溶液
- C、 应用抗菌药
- D、 温盐水浸泡
- E、 行拔甲术

答案： E

19、 男性病人, 30 岁, 在普鲁卡因局部浸润麻醉下行双侧腋臭皮肤切除, 两侧同时手术。手术中, 病人突然大叫, 惊厥, 紫绀, 心率 120 次/min, 处理应( )

- A、 静脉输液
- B、 静脉注射间羟胺
- C、 静脉注射硫喷妥钠
- D、 吸氧
- E、 静脉注射肾上腺素

答案： C

20、全身麻醉下全肺切除的病人,术后未清醒前应多长时间观察一次生命体征( )

- A、 15~30 分钟
- B、 30~60 分钟
- C、 1~2 小时
- D、 4/J 、 时
- E、 8/J 、 时

答案: A

21、治疗脓性指头炎,下列哪项不对( )

- A、 抬高患肢,局部热敷
- B、 有波动感时再行切开引流术
- C、 使用抗生素
- D、 切开应在手指侧面,不可在掌面
- E、 可对口引流

答案: B

22、治疗破伤风患者时,注射破伤风抗毒素的作用是( )

- A、 控制和解除痉挛
- B、 中和游离毒素
- C、 保持呼吸道通畅
- D、 自动免疫
- E、 被动免疫

答案: B

23、下列哪项符合呼吸性碱中毒?( )

- A、 血 PH $\uparrow$  CO<sub>2</sub>CP $\downarrow$  P CO<sub>2</sub> $\downarrow$
- B、 血 PH $\uparrow$  CO<sub>2</sub>CP $\uparrow$  P CO<sub>2</sub> $\uparrow$
- C、 血 PH $\uparrow$  CO<sub>2</sub>CP $\uparrow$  P CO<sub>2</sub> $\downarrow$
- D、 血 PH $\downarrow$  CO<sub>2</sub>CP $\downarrow$  P CO<sub>2</sub> $\downarrow$
- E、 血 PH $\downarrow$ CO<sub>2</sub>CP $\downarrow$  P CO<sub>2</sub> $\uparrow$

答案: C

24、低血钾常发生于( )

- A、 钾离子摄入减少
- B、 醛固酮分泌减少
- C、 钾离子进入细胞内减少
- D、 肾脏排钾减少
- E、 代谢性酸中毒

答案：A

25、糖尿病常并发感染( )

- A、急性蜂窝组织炎
- B、丹毒
- C、痈
- D、淋巴结炎
- E、败血症

答案：C

26、全麻后预防呼吸道不畅的方法,哪项不正确( )

- A、去枕平卧,头偏向一侧
- B、如误吸呕吐物,应立即吸氧
- C、如有舌后坠,应托起下颌
- D、口腔及气管内的分泌物应及时吸出
- E、用舌钳将舌拉出使气道通畅

答案：B

27、低钾血症时,最早表现为( )

- A、软弱无力
- B、肠麻痹
- C、心动过缓
- D、恶心呕吐
- E、腱反射减退

答案：A

28、对急性消化道失液的病人,医嘱有下列液体,应先输入的是( )

- A、右旋糖酐
- B、5%碳酸氢钠
- C、5%葡萄糖液
- D、10%葡萄糖液
- E、5%葡萄糖盐水

答案：E

29、女,40岁,因急性肠梗阻频繁呕吐,出现口渴、尿少、脱水征、血压偏低。进行液体疗法,静脉滴注选用的液体是( )

- A、右旋糖酐
- B、0.3%氯化钾
- C、复方氯化钾
- D、5%葡萄糖液

E、5%葡萄糖盐水

答案：E

30、反映休克病人病情危重的指标是( )

A、神志淡漠

B、伴代谢性酸中毒

C、脉搏细速 120 次/分

D、收缩压低于 10.7kPa80mmHg

E、皮肤出现多处瘀点、瘀斑

答案：E

31、男性,38岁,因绞窄性肠梗阻行小肠切除术,术后胃肠功能恢复不佳,持续胃肠减压,每日输葡萄糖液 1000ml 葡萄糖盐水 500ml。术后 5 天病人出现口渴、恶心、倦怠、尿少,无明显腹胀。检查血钠 144mmol/L,血氯 102mmol/L,血钾 3mmol/L。本病例可能存在的体液紊乱是( )

A、低钾血症伴低渗性脱水

B、低钾血症伴等渗性脱水

C、低钾血症伴高渗性脱水

D、高钾血症伴低渗性脱水

E、高钾血症伴等渗性脱水

答案：C

32、患者,女性,诊断为小肠痿,主诉口干、尿少,厌食、恶心、软弱无力、脉细速。血红蛋白 16g/L、血钠 132mmol/L、CO<sub>2</sub>CP为 27mmol/L。应考虑病人出现( )

A、高渗性脱水

B、等渗性脱水

C、低渗性脱水

D、代谢性酸中毒

E、代谢性碱中毒

答案：C

33、急性软组织感染需要及早切开引流的是( )

A、急性淋巴管炎

B、急性淋巴结炎

C、疔

D、疖

E、脓性指头炎

答案：E

34、休克病人的体位哪项是正确的：( )

- A、头低脚高位
- B、侧卧位
- C、上身和下肢各抬高 10~20 度
- D、头高脚低位
- E、低半坐卧位

答案：C

35、成人,男性,用退热药后出一身大汗,衬衣裤尽湿,又因呼吸道阻塞而做气管切开,24 小时此二项失水若干?( )

- A、500ml
- B、1000ml
- C、2000ml
- D、3000ml
- E、4000ml

答案：C

36、男性病人,30 岁,诊断为外伤性休克,怀疑脾破裂需立即手术,由门诊直接送入手术室,在医师和麻醉师看病人的同时,巡回护士应首先处理的是( )

- A、给病人吸氧
- B、手术区备皮
- C、输液,抽血配血
- D、准备手术器械
- E、摆好病人体位

答案：C

37、甲状腺腺瘤的备皮范围是( )

- A、下唇至乳头连线,两侧至斜方肌前缘
- B、下唇至锁骨平面,两侧至斜方肌前缘
- C、上唇至乳头连线,两侧至斜方肌前缘
- D、下唇至胸骨角,两侧至斜方前前缘
- E、下唇至肋缘平面,两侧至斜方肌前缘

答案：D

38、大面积烧伤病人的急救,不妥的是

- A、速置烧伤肢体于凉水中
- B、疑呼吸道烧伤可气管切开
- C、为预防休克给大量饮水
- D、及时用镇静止痛药



E、清洁布单包裹创面

答案：C

39、麻醉前禁食、禁水最主要的目的是( )

A、便于术中操作

B、防止术后便秘

C、防止术后腹胀

D、防止术后尿潴留

E、预防术中呕吐误吸

答案：E

40、在重度等渗性缺水或休克时,输入大量的等渗盐水,可出现( )

A、水中毒

B、血钠升高

C、氯化钠过剩

D、休克可纠正

E、高氯性酸中毒

答案：E

41、脓肿形成后的处理原则是( )

A、局部热敷

B、外敷鱼石脂软膏

C、抗菌药物治疗

D、切开引流

E、患肢抬高、制动

答案：D

42、血清钾的正常值是( )

A、2.5~3.5mmol/L

B、1.5~2.5mmol/L

C、6.5~7.5mmol/L

D、3.5~5.5mmol/L

E、5.5~6.5mmol/L

答案：D

43、男,52岁,胆囊切除术后4天,病人突然出现体温升高 $39^{\circ}\text{C}$ ,呼吸困难,听诊肺部呼吸音减弱,有湿性罗音,应考虑并发为( )

A、肺不张

B、伤口感染

C、肺炎

- 、 肺水肿
- E、 以上都不是

答案：C

44、补钾时哪项是错误的( )

- A、 5%葡萄糖溶液 1000 毫升加 1~1.5 克的钾
- B、 缓慢滴入每分钟不超过 40~60 滴
- C、 大手术、严重创伤者应暂缓补钾
- D、 禁食 2 天以上者应补钾
- E、 缺钾严重者,10%氯化钾静脉推注

答案：E

45、下列哪项是高渗性脱水的病因( )

- A、 剧烈吐泻
- B、 高热
- C、 肠梗阻
- D、 大面积烧伤
- E、 消化道痿

答案：B

46、一烧伤患者,其创面脓液呈鲜绿色,有一种特殊的霉腥味。其感染细菌可能为( )

- A、 葡萄球菌
- B、 链球菌
- C、 大肠杆菌
- D、 铜绿假单胞菌
- E、 无芽孢性厌氧菌

答案：D

47、局麻药毒性反应与下列哪项无关( )

- A、 一次用药量超过最大剂量
- B、 误入血管
- C、 注药部位血管丰富使药物吸收过快
- D、 药液浓度过高
- E、 局麻药中加入肾上腺素

答案：E

48、采用下列何种药物刷手,可不必再用乙醇浸泡( )

- A、 0.1%新洁尔灭
- B、 3%双氧水

- 、 2%来苏儿
- D. 0.75%碘伏
- E. 0.1%洗必泰

答案：D

49、破伤风病人临床表现,首先出现的是( )

- A. 角弓反张
- B. 张口困难
- C. 苦笑脸
- D. 呼吸困难
- E. 高热

答案：B

50、确诊败血症应据( )

- A. 寒战、高热
- B. 脉速
- C. 皮肤粘膜瘀血点
- D. 贫血
- E. 血细菌培养阳性

答案：E

51、引起破伤风的致病菌是( )

- A. 溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 拟杆菌
- E. 厌氧芽孢杆菌

答案：E

52、患者背部大片明显红、肿、痛,与正常皮肤之间的界限不清,无波动感,伴有寒战、发热、白细胞增加,最可能的诊断是( )

- A. 疔
- B. 痈
- C. 蜂窝织炎
- D. 浅表脓肿
- E. 丹毒

答案：B

53、体内调节酸碱平衡的机制中能排出大量氢离子的是:( )

- A. 缓冲系统

- 、 肺
- C、 肾
- D、 肝
- E、 细胞内外离子交换

答案：C

54、患者背部大片明显红、肿、痛，与正常皮肤之间的界限不清，无波动感，伴有寒战、发热、白细胞增加，最可能的诊断是（）

- A、 疔
- B、 痈
- C、 蜂窝织炎
- D、 浅表脓肿
- E、 丹毒

答案：B

55、一胃溃疡病人，36小时处于中毒性休克状态，最佳处理措施是（）

- A、 纠正休克同时及早行穿孔修补术
- B、 纠正休克同时及早行胃大部切除术
- C、 立即胃大部切除术
- D、 静脉滴注碳酸氢钠，应用抗生素
- E、 静脉补充血容量

答案：E

56、破伤风伤口冲洗应首选（）

- A、 3%过氧化氢溶液
- B、 0.02%洗必泰溶液
- C、 0.1%雷佛奴尔溶液
- D、 0.02%呋喃西林溶液
- E、 0.1%新洁尔灭溶液

答案：A

57、需注射 TAT 的患者，皮试阳性时，应：（）

- A、 停止注 TAT
- B、 改用破伤风类毒素
- C、 先用抗组织胺药物，再用 TAT
- D、 采用脱敏注射法注射 TAT
- E、 以上方法均不对

答案：D

58、代谢性酸中毒最突出的表现是（）

- 、 感觉迟钝
- B、 心率加快
- C、 血压下降
- D、 头痛、头晕、嗜睡
- E、 呼吸深快,呼气有酮味

答案: E

59、女性,60岁,因反复呕吐5天住院,血清钠118mmol/L,脉搏120次/分,血压70/50mmHg 应诊断为( )

- A、 轻度缺钠
- B、 中度缺钠
- C、 重度缺钠
- D、 中度缺水
- E、 重度缺水

答案: C

60、某病人腹痛,呕吐,不能进食,2天入院,下列护理诊断哪项是正确的:( )

- A、 腹痛
- B、 体液不足
- C、 吞咽困难
- D、 营养不良
- E、 脱水

答案: B

61、一般情况下,颈、胸、腹部手术后采用( )

- A、 半坐卧位
- B、 平卧位
- C、 侧卧位
- D、 俯卧位
- E、 头低脚高位

答案: A

62、肾手术的手术体位是( )

- A、 仰卧位
- B、 侧卧位
- C、 俯卧位
- D、 截石位
- E、 平卧位

答案: B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636144133005010032>