

2024 年广东省梅县区《执业药师之西药学专业二》考试题库（全优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以上药物镇咳作用与可待因相当且没有镇痛作用的是

- A: 喷托维林
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 吗啡

答案：C

2. 头孢曲松

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- B: 肾毒性较大
- C: 用于非典型病原体感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：A

3. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

- A: 多巴胺
- B: 拟交感药
- C: 胺碘酮
- D: 考来烯胺

答案：A

4. (2021 年真题) 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物 ()

- A: 吡拉西坦
- B: 尼莫地平
- C: 依达拉奉
- D: 多奈哌齐

答案: D

5. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 13. 4×10⁹ / L，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿
- B: 氟康唑可使华法林代谢加快
- C: 氟康唑抑制卡马西平代谢
- D: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖

答案: B

6. 关于 NSAIDS 类药物所致不良反应的说法，正确的是 ()

- A: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂
- B: NSAIDS 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见
- C: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险
- D: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物

答案：C

7. 卡泊三醇治疗银屑病的作用机制是

- A: 与维 A 酸细胞核受体有较高亲和力
- B: 可抑制表皮细胞的有丝分裂，使皮肤增生速率恢复正常
- C: 通过角蛋白表达正常化，促进角朊细胞末端分化
- D: 能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正

答案：D

8. 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 吧达帕胺
- B: 普萘洛尔
- C: 氨氯地平
- D: 赖诺普利

答案：D

9. 对急需抗凝处理的患者，以下哪种方案最优()

- A: 华法林+低分子量肝素
- B: 低分子量肝素
- C: 华法林
- D: 肝素

答案：A

10. 腺病毒可致

- A: 角膜炎
- B: 巨细胞病毒性视网膜炎

C: 流行性结膜炎

D: 急性出血性结膜炎

答案: C

11. 属于抗雌激素类的是

A: 睾酮

B: 己烯雌酚

C: 他莫昔芬

D: 甲地孕酮

答案: C

12. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

A: 维 A 酸

B: 阿达帕林

C: 壬二酸

D: 异维 A 酸

答案: B

13. 克拉霉素与环孢素合用()

A: 后者血药浓度下降，药效降低

B: 不良反应叠加

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 药理作用拮抗

答案: C

14. 有关质子泵抑制剂说法错误的是

A: 主要是抑制 H^+, K^+-ATP 酶

B: 局部止血作用

C: 抑制胃酸分泌作用

D: 可以中和胃酸

答案：D

15. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

A: 结核杆菌

B: 铜绿假单胞菌

C: 厌氧菌

D: 革兰阴性菌

答案：C

16. 与 α_1 受体阻断剂无相互作用的药物是

A: 第三代头孢菌素

B: 地尔硫

C: 卡马西平

D: 西咪替丁

答案：A

17. 对曲霉属无效的药物是()

A: 氟康唑

B: 伊曲康唑

C: 两性霉素 B

D: 伏立康唑

答案：A

18. 单纯饮食控制及体育锻炼无效的 2 型糖尿病肥胖者首先得降糖药是

A: 二甲双胍

B: 瑞格列奈

C: 格列美脲

D: 普萘洛尔

答案: A

19. 不宜与三环类抗抑郁药合用

A: 赛洛唑啉

B: 麻黄碱

C: 酚甘油滴耳液

D: 羟甲唑啉

答案: B

20. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D

A: 昂丹司琼

B: 多潘立酮

C: 莫沙必利

D: 甲氧氯普胺

答案: B

21. 下述药物中，不属于促动力药的是

A: 甲氧氯普胺

B: 氢氧化铝

C: 莫沙必利

D: 多潘立酮

答案: B

22. (2018 年真题) 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是 ()

A: 心肌损伤

- B: 痤疮样皮疹
- C: 骨髓抑制
- D: 血压升高

答案：B

23. 以下属于袢利尿剂禁忌证的是

- A: 高钾血症
- B: 高血压
- C: 高血糖
- D: 对磺胺过敏的患者

答案：D

24. (2015 年真题) 用于低分子肝素过量时解救的药品是 ()。

- A: 酚磺乙胺
- B: 鱼精蛋白
- C: 氨甲环酸
- D: 维生素 K1

答案：B

25. 下列药物组合混合可减弱抗菌活性的是

- A: 青霉素+红霉素
- B: 青霉素+阿米卡星
- C: 青霉素+氯霉素
- D: 青霉素+四环素

答案：B

26. 具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物 ()

- A: 壬二酸

- B: 维 A 酸
- C: 异维 A 酸
- D: 阿达帕林

答案: C

27. 滴眼后可能导致再生障碍性贫血的抗菌药物是

- A: 氯霉素
- B: 庆大霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 妥布霉素

答案: A

28. 患者，女，24 岁，妊娠 2 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

- A: 青霉素 G
- B: 环丙沙星
- C: 阿莫西林
- D: 头孢哌酮

答案: B

29. 利那洛肽为泻药的作用机制是

- A: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- B: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性
- C: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

D: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

答案：C

30. (2018 年真题) 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

D: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药

答案：D

31. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 不会导致 Q-T 间期延长及室性心律失常

B: 不会导致催乳素增多

C: 不会促进乙酰胆碱的释放

D: 不会导致锥体外系反应

答案：C

32. 不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

A: 酚甘油滴耳液

- B: 麻黄碱滴鼻液
- C: 羟甲唑啉滴鼻液
- D: 赛洛唑啉滴鼻液

答案：B

33. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 鱼精蛋白
- B: 酚磺乙胺
- C: 氨甲环酸
- D: 甲苯氢醌

答案：B

34. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 支气管痉挛
- B: 惊厥
- C: 血压下降
- D: 心律失常

答案：D

35. （2018 年真题）患者，女，28 岁，因“多汗、心慌、消瘦、易怒半月余”就诊，实验室检查显示 FT4 和 FT3 均升高，TSH 降低，甲状腺 I 度肿大，心率 92 次/分，诊断为“甲状腺功能亢进症”简称甲亢”。给予甲巯咪唑片 10mg，一日 3 次盐酸普萘洛尔片 10mg，日 3 次。患者 1 月后复查，FT3 和 FT4 恢复正常，但出现膝关节疼痛。

- A: 甲亢高代谢状态使血钙水平降低
- B: 甲亢高代谢状态致血钾水平降低
- C: 普萘洛尔致关节痛的不良反应

D: 甲巯咪唑致关节痛的不良反应

答案: D

36. 又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

A: 丙酸诺龙

B: 鲨肝醇

C: 维生素 B₄

D: 小檗胺

答案: C

37. 地高辛的中毒血清浓度为()

A: >2ng/ml

B: >20ng/ml

C: >50ng/ml

D: >5ng/ml

答案: A

38. 属于促分泌药，通过刺激肠液分泌，促进排便的药物是()

A: 欧车前

B: 番泻叶

C: 多库酯钠

D: 利那洛肽

答案: D

39. 长期大量服用维生素 A 会出现

A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：D

40. 目前治疗开角型青光眼的一线用药是

A: 拟肾上腺素能药

B: 拟胆碱能药

C: 前列腺素类药物

D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：C

41. 对乙酰氨基酚中毒可使用的解救药是

A: 肾上腺素

B: 乙酰半胱氨酸

C: 喷托维林

D: 阿托品

答案：B

42. 主要用于解热镇痛，抗炎作用较弱的是

A: 阿司匹林

B: 吲哚美辛

C: 对乙酰氨基酚

D: 塞来昔布

答案：C

43. 适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

A: 卡托普利

- B: 胍屈嗪
- C: 氢氯噻嗪
- D: 拉贝洛尔

答案：A

44. 属于 I A 类抗心律失常药

- A: 普萘洛尔
- B: 奎尼丁
- C: 利多卡因
- D: 胺碘酮

答案：B

45. 壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

- A: pH
- B: 浓度
- C: 作用面积
- D: 剂型

答案：A

46. 普通肝素的作用靶点是

- A: 因子 II a
- B: 凝血酶 III (AT—III)
- C: 因子 X a
- D: 因子 IX a

答案：B

47. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

- A: 利多卡因

- B: 奎尼丁
- C: 胺碘酮
- D: 普萘洛尔

答案：A

48. 适用于心功能比较稳定的 II ~ III 级心力衰竭患者的是

- A: 氯沙坦
- B: 米力农
- C: 卡维地洛
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

49. 属于叶酸类抗代谢类药物的是

- A: 巯嘌呤
- B: 吉西他滨
- C: 甲氨蝶呤
- D: 长春瑞滨

答案：C

50. 治疗钙缺乏症 ()

- A: 依降钙素
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 阿法骨化醇

答案：B

51. 入睡困难患者首选哪种催眠药物

- A: 劳拉西泮

B: 艾司唑仑

C: 谷维素

D: 氯硝西泮

答案: B

52. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

A: 短效 β_2 受体激动剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 白三烯受体阻断剂

D: 吸入性糖皮质激素

答案: A

53. 患者女, 32 岁, 孕 2 周既往有癫痫病史长期服用卡马西平治疗为防止引起新生儿出血, 该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

A: 维生素 K

B: 叶酸

C: 维生素 D

D: 维生素 B12

答案: A

54. (2021 年真题) 属于烷化剂, 能破坏 DNA 的抗肿瘤药物是 ()

A: 厄洛替尼

B: 长春新碱

C: 环磷酰胺

D: 来曲唑

答案: C

55. (2016 年真题) 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是

- A: CYP2C19
- B: CYP2B6
- C: CYP2D6
- D: CYP2E1

答案：A

56. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 奈替米星
- B: 红霉素
- C: 庆大霉素
- D: 阿莫西林

答案：C

57. 可使维生素 B

- A: 异烟肼
- B: 雌激素
- C: 丙磺舒
- D: 糖皮质激素

答案：B

58. 催眠药应()

- A: 空腹内服
- B: 定时内服
- C: 饭前内服
- D: 睡前内服

答案：D

59. 布地奈德的作用特点是

- A: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效
- B: 10 $\mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度，15-20 $\mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应
- C: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿
- D: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗

答案：D

60. 具有肾保护作用的降压药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 硝苯地平
- C: 沙拉新
- D: 缬沙坦

答案：D

61. （2021 年真题）属于短效避孕药，但其埋植剂可作为长效避孕药使用的药物是（）

- A: 去氧孕烯
- B: 氯地孕酮
- C: 孕二烯酮
- D: 左炔诺孕酮

答案：D

62. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是（）

- A: 甲氨蝶呤
- B: 长春瑞滨

C: 巯嘌呤

D: 吉西他滨

答案: D

63. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 表柔比星

B: 泼尼松

C: 多西他赛

D: 卡莫司汀

答案: D

64. 阿托品禁用于

A: 胆绞痛

B: 全身麻醉前给药

C: 遗尿症

D: 青光眼

答案: D

65. 地高辛最适合用于

A: 急、慢性心衰并房颤

B: 急性心力衰竭

C: 心律失常

D: 肺源性心脏病

答案: A

66. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 听力损害
- B: 视神经损害
- C: 红人综合征
- D: 血栓性静脉炎

答案：B

67. 肝素的抗凝作用特点

- A: 仅在体外有效
- B: 必须有维生素 K 辅助
- C: 体内、体外均有效
- D: 仅在体内有效

答案：C

68. 治疗子宫内膜异位症的药物是

- A: 氯地孕酮
- B: 达那唑
- C: 他达拉非
- D: 左炔诺孕酮

答案：B

69. 对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

- A: 普萘洛尔
- B: 奎尼丁
- C: 利卡多因

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 维拉帕米

答案: C

70. 下述保肝药物中可导致低钾血症的是

- A: 复方甘草酸苷
- B: 门冬氨酸鸟氨酸
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

71. 下列药物中，不能增强他莫昔芬活性和疗效的是

- A: 长春新碱
- B: 甲氨蝶呤
- C: 西咪替丁
- D: 氟尿嘧啶

答案：C

72. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12h 以上间歇期

- A: 氨氯地平
- B: 哌唑嗪
- C: 依那普利
- D: 硝酸甘油

答案：D

73. 不属于抗代谢抗肿瘤药的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 氟尿嘧啶
- C: 环磷酰胺
- D: 阿糖胞苷

答案：C

74. 沙丁胺醇用于预防治疗时，宜选用

- A: 干粉吸入方法
- B: 口服制剂
- C: 气雾剂
- D: 雾化吸入溶液

答案：B

75. 关于阿司匹林在心血管疾病治疗中的作用描述，错误的是

- A: 抑制血管损伤后内膜增生
- B: 抑制细胞因子的合成
- C: 调节血脂
- D: 可抑制血小板聚集

答案：C

76. 关于哌替啶下列说法错误的是

- A: 未明确诊断的疼痛，可以使用本品
- B: 本品务必在单胺氧化酶抑制剂停用 14 日以上方可给药
- C: 产妇分娩镇痛时及哺乳期间用量酌减
- D: 本品与芬太尼可交叉过敏

答案：A

77. （2020 年真题）服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 头孢呋辛
- C: 左氧氟沙星
- D: 克林霉素

答案：A

78. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 抑制胃壁细胞的 H
- B: 抗幽门螺杆菌
- C: 阻断 H
- D: 阻断 CTZ 的 D

答案: C

79. 与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

- A: 氯化钠
- B: 枸橼酸钾
- C: 氯化钾
- D: 氯化钙

答案: C

80. 其缓释混悬液制剂应空腹服用的是

- A: 克拉霉素
- B: 氨曲南
- C: 红霉素
- D: 阿奇霉素

答案: D

81. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 盐酸洛哌丁胺胶囊
- C: 地衣芽孢杆菌胶囊
- D: 双八面体蒙脱石散

答案: B

82. 功能性子宫出血可选用的药物是()

- A: 雌二醇
- B: 他莫昔芬
- C: 米非司酮
- D: 司坦唑醇

答案: A

83. 下述药物中不属于助消化药的是

- A: 乳酶生
- B: 乳酸菌素
- C: 胰酶
- D: 兰索拉唑

答案: D

84. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 皮下
- B: 静脉
- C: 口服
- D: 舌下含服

答案: B

85. (2017 年真题) 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是 ()

- A: 高钙血症

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 血栓性静脉炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/636211102101011030>