

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、急性敌百虫中毒禁用 0 溶液洗胃。0

A、清水、生理盐水

B、1:5000 高锰酸钾溶液

C、2%重曹溶液

D、牛奶、蛋清水

E、活性炭

【答案】： C

2、对心室颤动病人进行心肺复苏的首选药物是 0

A、碳酸氢钠

B、山黄若碱

C、利多卡因

D、去甲肾上腺素

E、葡萄糖酸钙

【答案】： C

3、一次性出血量超过()时可引起全身症状。()

A、250ml

B、800ml

C、400-500ml

D、600ml

E、1000ml

【答案】： C

4、中毒时最首要的处理是 0

A、对症治疗

B、

使用抗生素

C、立即终止接触毒药

D、使用特效解毒药

E、清除进入人体的毒药

【答案】： C

5、下列哪项对高钾血症患者兼用 0

A、等渗盐水

B、10%葡萄糖液

C、右旋糖酐

D、林格氏液

E、碳酸氢钠

【答案】： D

6、患者家属王某，女性，26岁。在得知丈夫因病情危重，抢救成功的可能性不大

时，非常忧郁，伤心哭泣。护士在安慰她时，以下做法中不恰当的是 0

A、当她表示想独自一人安静一会时，为她提供一个适当的环境

B、坐在她身边，轻轻递给她纸巾

C、阻止她哭泣，告诉她要坚强

D、在她停止哭泣时，鼓励她说出悲伤的原因

E、轻轻握住她的手，默默陪伴她

【答案】： C

7、风湿性心瓣膜病最易累及的是 0

A、二尖瓣

B、主动脉瓣

C、三尖瓣

D、二尖瓣+三尖瓣

E、主动脉+肺动脉瓣

【答案】： A

8、地震被埋时如果一时不能脱险，应如何自救?0

- A、设法将手脚挣脱出来，推开压在身上的物体，使呼吸通畅
- B、不管是否受伤，都要用力向外抽拉身体
- C、使用明火求救
- D、搬开身边杂物，扩大活动空间

【答案】： A

9、复苏应注意哪些并发症，不正确的是 0

- A、脑功能衰竭
- B、ARDS
- C、肺部感染
- D、应激性溃疡
- E、血气胸

【答案】： A

10、心肺复苏指南中胸外按压的部位为是 0

- A、双乳头之间胸骨正中部
- B、心尖部
- C、胸骨中段
- D、胸骨左缘第五肋间
- E、胸骨上部

【答案】： A

11、EC 手法 E 的作用是 0

- A、触摸颈动脉
- B、按压颈部
- C、固定面罩
- D、开放气道

【答案】： D

12、在对未建立高级气道的心跳呼吸骤停患者进行 CR 时，应进行 0 次人工通气。

- A 、 1

B、2

C

、3

D、4

E、5

【答案】： B

13、患者，男性，23岁，踝关节扭伤6小时，局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目的是()

A、促进末梢循环

B、促进炎症的消散

C、促进炎症的局限

D、减轻局部出血、疼痛

E、使血管扩张，减轻深部组织充血

【答案】： D

14、一工厂突发火灾，数十伤员转运到急诊科，此时分诊护士的首要任务是0

A、迅速检伤，按照病情危重程度分类

B、做好常规来诊患者的解释工作

C、发现危重患者立即投入抢救中

D、配合治疗区护士共同参与抢救

E、准备与来诊家属沟通

【答案】： A

15、护士在紧急情况下为抢救患者生命实施必要的紧急救护，应该做到以下几点，但除外()

A、必须依照诊疗技术规范

B、必须有医师在场指导

C、根据患者的实际情况和自身能力水平进行力所能及的救护

D、避免对患者造成伤害

E、以上均正确

【答案】： B

16、气管插管时看到的第一个标记物是 0

- A、声门
- B、会厌
- C、切牙
- D、悬雍垂

【答案】： D

17、2015 心肺复苏指南中胸外按压的频率为 0

- A、至少 80-100 次/分
- B、至少 100 次/分
- C、至少 120 次/分
- D、至少 60-80 次/分
- E、至少 110 次/分

【答案】： B

18、病人心肺复苏后，脑复苏的主要措施是 0

- A、维持有效的循环
- B、确保呼吸道通畅
- C、降温和脱水疗法
- D、加强基础护理
- E、治疗原发疾病

【答案】： C

19、男性，30 岁。车祸伤现场发现左股部伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查的是 0

- A、触诊足背和胫后动脉
- B、检查肢体感觉
- C、检查膝腱或跟腱反射
- D、足部主动活动有无缺失
- E、左下肢主动活动有无缺失

【答案】： A

20、无脉性心脏停跳息者两次心跳检查之间应 0

- A、先给预约 5 组(或者约 2 分钟)心肺复苏
- B、行 12 导心电图检查
- C、建立深静脉通道
- D、准备电除颤
- E、持续胸外心脏按压

【答案】： A

21、下列哪项是多发伤初级评估的目的 0

- A、明确诊断
- B、判定处理伤员的优先次序
- C、确认是否需要手术
- D、明确收治的科室
- E、决定后续的治疗方案及优先次序

【答案】： B

22、改善成人急性呼吸窘迫综合征病人缺氧的最佳措施是 0

- A、持续高流量吸氧
- B、按时使用有效抗生素
- C、呼气终末正压通气
- D、避免输液过量过快
- E、鼓励深呼吸和排痰

【答案】： C

23、有关脑震荡表现不正确的是 0

- A、逆行性健忘
- B、颅内压增高
- C、血压下降
- D、意识障碍不超过 30 分钟
- E、生理反射迟钝

【答案】： B

24、双下肢骨折的伤病员，应首选 0

- A、杠轿式搬运
- B、担架搬运
- C、拖行搬运
- D、扶持搬运
- E、横抱搬运

【答案】： B

25、血红蛋白低于或等于?时，应嘱患者卧床休息，活动时动作要缓慢，避免突然体位改变()

- A、30g/L
- B、40g/L
- C、60g/L
- D、80g/L
- E、100g/L

【答案】： C

26、医护人员到达现场，可用哪几种颜色对伤员进行分类 0

- A、白、黄、绿、黑
- B、红、黄、绿、黑
- C、红、黄、蓝、黑
- D、红、白、绿、黑

【答案】： B

27、终止室颤最迅速、最有效的措施是 0

- A、立即胸外心脏按压
- B、立即给予除颤
- C、尽快给予气管插管
- D、立即给予球囊-面罩通气
- E、立即给予肾上腺素 1mg 静脉注射

【答案】： B

28、左心衰最严重的表现是 0

- A、心悸、气短
- B、咳嗽咳痰增多
- C、肺水肿
- D、夜间阵发性呼吸困难
- E、心律失常

【答案】： C

29、抢救脊柱骨折的伤员时，应 0。

- A、采取保暖措施
- B、用软板担架运送
- C、用三角巾固定
- D、扶持伤者移动
- E、以上方法均正确

【答案】： C

30、抢救时胸外心脏按压有效的标志是 0

- A、颈动脉搏动
- B、股动脉搏动
- C、肱动脉搏动
- D、颈、股动脉搏动
- E、颈、肱动脉搏动

【答案】： D

31、灭火器至少多长时间进行一次全面检查和保养 0

- A、一个月
- B、一个季度
- C、半年
- D、一 年

【答案】： A

32、胸外伤后，出现胸壁软化(连枷胸)的原因是 0

- A、2 根以上肋骨骨折
- B、多根多段肋骨骨折
- C、胸骨骨折
- D、反常呼吸
- E、纵隔摆动

【答案】： B

33、一氧化碳中毒，最先受累的脏器是 0

- A、心脏
- B、骨骼肌
- C、胃肠道
- D、肾脏
- E、脑组织

【答案】： E

34、下列不属于院前急救原则的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤后轻伤
- C、先固定后搬运
- D、急救与呼救并重

【答案】： A

35、患者男性，45 岁。护士为其测得的血压值为 145\95mmHg，该患者的血压属于

0

- A、理想血压
- B、正常血压
- C、临界高血压
- D、高血压
- E、单纯收缩期高血压

【答案】： D

36、属于骨折早期并发症的是 0

- A、血管神经损伤
- B、关节僵硬
- C、创伤性关节炎
- D、缺血性肌挛缩
- E、延迟愈合

【答案】： A

37、地震灾害主要伤情包括 0

- A、劳累性损伤
- B、失用性损伤
- C、动物咬伤
- D、火器伤
- E、挤压综合征

【答案】： E

38、口服补液盐液体的张力为 0

- A、1/5 张
- B、1/4 张
- C、1/3 张
- D、1/2 张
- E、2/3 张

【答案】： E

39、2010 年 10 月-美国心脏协会(AHA)公布最新心肺复苏(CPR)指南。
重新安排

了 CPR 传统的三个步骤，最新三步骤是)

- A、A-B-C
- B、C-A-B
- C、B-CA
- D、B-A-C

【答案】： B

40、中度有机磷农药中毒病人的血胆碱酯酶活性为 0

- A、70%~50%
- B、50%~30%
- C、30%~29%
- D、<20%
- E、80%~70%

【答案】： B

41、遇到血氧饱和度监测故障时，首先应该 0

- A、检查血氧饱和度探头是否脱落
- B、用设备模拟血氧饱和度波形、脉搏的显示情况
- C、检查血氧饱和度导联线接头和机器的接口连接是否错位

【答案】： A

42、急性镇静安眠药中毒时，可选用)药物促进苏醒，同时还有拮抗呼吸抑制作用。

- ()
- A、美蓝
- B、VK1
- C、解碘定
- D、阿托品
- E、纳络酮

【答案】： E

43、患者心脏骤停，开始抢救时间为心脏骤停 4-6 分钟进行，心肺复苏成功率是多少。()

- A、60%
- B、10%
- C、4%
- D、50%

【答案】： B

44、高原病的诱因不包括 0

- A、登高速度过急
- B、体力活动过大
- C、寒冷或气候改变
- D、饥饿、疲劳、失眠
- E、慢性胃炎

【答案】： E

45、哮喘持续状态是指经一般支气管扩张药治疗后仍有 0

- A、大量黏脓痰
- B、 明显发绀
- C、哮喘 24 小时以上
- D、肺不张
- E、浅昏迷

【答案】： G

46、下面禁止转运的指征不正确的是)

- A、心跳、呼吸停止；
- B、有气管插管指征，但未插管的；
- C、血流动力学不稳定；
- D、血压偏高

【答案】： D

47、某日护士小张正在急诊室工作，突然闯进一位怒气冲冲的患者家属，叫嚷着

要找医院领导。这时小张应该 0

- A、制止患者家属愤怒的发泄
- B、直接交给上级领导处理
- C、主动倾听，了解分析患者家属愤怒的原因
- D、对其不理不睬，直接回避
- E、对其愤怒行为给予批评

【答案】： C

48、胸膜腔穿刺抽出不凝血常因为 0

- A、肋骨骨折
- B、张力性气胸
- C、心脏损伤
- D、开放性气胸
- E、血胸

【答案】： E

49、在使用球囊-面罩通气时，可尽量减少空气进入患者胃内的做法是 0

- A、增加通气频率，减少通气量
- B、减少每分钟通气次数
- C、尽可能延长每次通气时间
- D、用尽全力给予最大量的通气
- E、通气量能使患者胸廓明显隆起即可

【答案】： E

50、膀胱刺激征是指 0

- A、尿失禁、尿多
- B、排尿困难、尿滴沥
- C、尿痛、尿急
- D、夜尿增多、尿频
- E、尿频、尿急、尿痛

【答案】： E

51、发生火灾逃生时，错误的选项是 0

- A、走安全通道
- B、用湿毛巾捂住口鼻
- C、最低姿势匍匐前进
- D、乘坐电梯

【答案】： D

52、大脑组织缺氧后发生不可逆时间一般为)

A 、1 分钟

B

- 、2 分钟
- C、3 分钟
- D、4 分钟
- E、8 分钟

【答案】： D

53、抢救溺水病人的第一步是 0

- A、倒出呼吸道内及胃内的积水
- B、立即进行口对口人工呼吸
- C、胸外心脏
- D、迅速清除口鼻内泥沙污泥
- E、应用抗生素预防感染

【答案】： D

54、男，12 岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如

下哪种抢救措施外，其余措施均可采取 0

- A、胸外按压
- B、人工呼吸
- C、电除颤
- D、心脏起搏

【答案】： D

55、张力性气胸紧急处理是 0

- A、行胸膜腔闭式引流术
- B、开胸缝合气管裂伤
- C、用大号针头在锁骨中线第 2~第 3 肋间胸穿放气
- D、给氧 E. 做人工呼吸

【答案】： C

56、一旦心搏骤停患者恢复自主循环，理想的目标是以最低的 FiO₂

将血氧饱和度
水平维持在 0

- A、80%以下
- B、85%~100%
- C、90%~100%
- D、94%~100%
- E、100%以上

【答案】： D

57、常用的晶体溶液，不包括下列哪项 0

- A、0.9%NaCl
- B、50%葡萄糖溶液
- C、4%NaHCO₃
- D、林格氏液

【答案】： B

58、对成人进行胸外心脏按压时，双手应该 0

- A、双手掌根重叠
- B、双手指重叠
- C、掌心紧贴胸壁
- D、手指紧贴胸壁
- E、掌根压胸壁

【答案】： A

59、成人心肺复苏时胸外按压的深度为 0

- A、至少胸廓前后径的一半
- B、至少 3cm
- C、至少 5cm
- D、至少 6cm
- E、45cm

【答案】： C

60、被目击的非创伤心跳骤停患者中最常见的心律为 0

- A、心脏停搏
- B、无脉性室颤
- C、室颤
- D、电-机械分离
- E、室上性心动过速

【答案】： C

61、下列属于气管插管的禁忌症的是 0

- A、主动脉瘤压迫气管者
- B、呼吸道分泌物过多不能咳出者
- C、窒息者
- D、呼吸道疾病的诊断和治疗

【答案】： A

62、患者，女性，58 岁，慢性支气管炎病史 10 年，慢阻肺病史 5 年。护士在夜间查 房时发现患者剧烈咳嗽后突感上胸刺痛、胸闷、呼吸困难，不能平卧，查体：左侧 胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音，听诊左肺呼吸音明显减弱，应考虑为 0

- A、肺梗死
- B、急性心肌梗塞
- C、自发性气胸
- D、支气管哮喘
- E、胸腔积液

【答案】： C

63、对成人行胸外心脏按压，正确的按压频率为 0

- A、50 次/分
- B、60 次/分
- C、70 次/分
- D、80 次/分

E、90 次/分

【答案】： B

64、艾滋病的主要传播途径是 0

- A、饮食传播
- B、母婴传播
- C、蚊虫叮咬
- D、血液传播
- E、性接触传播

【答案】： E

65、转运时护士及医生始终位于病人的 0

- A、头部两侧
- B、左右两侧
- C、头尾位置
- D、左侧

【答案】： A

66、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 0

- A、脉快，呼吸急促
- B、脉快，血压降低
- C、脉快，血压高
- D、脉慢，呼吸慢
- E、脉慢，血压低

【答案】： D

67、中心负压故障时，立即停用中心吸引装置，启用备用电动吸痰器进行吸引，必

要时采用 0 与吸痰管连接吸痰

- A、吸痰管
- B、50ml 注射器
- C、甘油注射器
- D、听诊器

【答案】： B

68、头颈部创伤的伤者开通气道的方法为 0

- A、仰头举颏法
- B、抬颌法
- C、仰头抬颈法
- D、压额抬颌法

【答案】： B

69、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颏法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

70、糖尿病酮症酸中毒的表现错误的是 0

- A、酮体生成过多
- B、水肿
- C、治疗前，血钾偏高或正常
- D、携氧功能障碍

【答案】： B

71、空气栓塞时应采取的卧位是 0

- A、半卧位
- B、端坐位
- C、右侧卧位，头低足高位
- D、左侧卧位，头低足高位
- E、左侧卧位，头高足低位

【答案】： D

72、休克早期血压的变化 0

- A、收缩压下降，脉压差小
- B、收缩压升高，脉压差大

C、收缩压正常，脉压差小

D、收缩压下降，脉压差大

E、血压无变化

【答案】： C

73、关于损伤的现场急救，下列描述正确的是 0

- A、对休克患者首要措施是立即送医院抢救
- B、对于发现有心排骤停的伤员应首先将其移出现场，然后进行 COR
- C、作详细的全身检查
- D、尽快解决各种呼吸道阻塞，维持呼吸道通畅
- E、发现有活动性出血的伤口应现场进行清创术

【答案】： D

74、以下患者可以立即转送的是 0

- A、腹腔内出血未控制
- B、休克患者
- C、大腿骨折未固定
- D、急性左心素竭
- E、肠膨出已行腹部包扎

【答案】： E

75、患者，男性，3岁，因呕血黑便来院就诊，神志清楚，面色苍白，血压 80/50mf。

考虑病人血容量不足，应输入的溶液是 0

- A、10%葡萄糖
- B、脂肪乳
- C、20%甘露醇
- D、中分子右旋糖酐
- E、浓缩白蛋白

【答案】： D

76、抢救病人中护士进行的工作下列哪项不正确 0

- A、口头医嘱复诵后再执行
- B、用完的空安瓿应及时处理
- C、抢救后应及时请医生补写医嘱
- D、抢救记录字迹清晰及时准确
- E、医生未到时可先建立静脉通道

【答案】： B

77、左下 LL 导连位于哪个位置?0

- A、左锁骨中线与脐水平交汇处
- B、左锁骨中线剑突水平处
- C、胸骨左缘第四肋间
- D、胸骨左缘锁骨中线第一肋间

【答案】： B

78、在基础生命支持评估呼吸情况时，评估时间不应超过 0

- A、5 秒 钟
- B、10 秒钟
- C、15 秒 钟
- D、20 秒钟

【答案】： B

79、患者，男性，49 岁。既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后 16 天出院，突发 高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者进行气道及呼吸评估时，患者

突然面色青紫。如果你是分诊护士，首先要做的是 0

- A、立即将患者送入抢救室
- B、给予人工呼吸
- C、呼叫医生
- D、尽快结束初级评估
- E、测量血氧饱和度

【答案】： A

80、室颤患者，单相波电除颤时选择的能量为 0

A、340J

B、350J

C、200J

D、36J

【答案】： D

81、关于呼吸的观察不正确的是 0

A、成人安静时每分钟 16~20 次

B、每分钟超过 24 次称呼吸增快，每分钟少于 10 次称呼吸减慢

C、潮式呼吸和间歇呼吸属于节律异常的呼吸

D、呼吸困难分为吸气性、呼气性和混合性三类

E、呼气时发出鼾声是由于喉头痉挛引起

【答案】： E

82、适用于卷轴带开始及终了的包扎方法是 0

A、蛇形

B、螺旋形

C、“8”字形

D、环形

E、螺旋反折形

【答案】： D

83、中年女性，45 岁。炎热夏天，天气闷热，在外面连续工作 5 小时，由于大量出汗

导致失水、失钠等引起的周围循环灌注不足属于 0

A、热衰竭

B、热射病

C、热痉挛

D、日射病

【答案】： A

84、在灾难现场通常以黑颜色醒目的卡片或胶带表示患者的分类是 0

- A、死亡
- B、重伤
- C、危重伤
- D、中重伤
- E、致命伤

【答案】： E

85、纠正呼吸性酸中毒，最主要的措施是 0

- A、输碱性溶液
- B、纠正电解质紊乱
- C、改善通气
- D、使用脱水剂
- E、以上都不是

【答案】： C

86、见尿补钾要求成人每小时尿量不少于()

- A、10ml
- B、30ml
- C、50ml
- D、70ml
- E、90ml

【答案】： B

87、以下均属于致命性心律失常，除外的是 0

- A、心室扑动
- B、室性心动过速
- C、心室颤动
- D、心房颤动
- E、心室率小于 45 次/分的心动过缓

【答案】： D

88、电除颤的并发症不包括 0

A、心律失常

B、高血压

C、肺和体循环栓塞

D、急性肺水肿

【答案】： B

89、患者男性，45 岁。炎热夏天在外高空作业 3 小时出现大汗、口渴、头晕、胸闷。该病人可能出现了 0

- A、先兆中暑
- B、轻度中暑
- C、热痉挛
- D、日射病
- E、热射病

【答案】： A

90、口对口人工呼吸的吹气量应达到()

- A、2400mL 以上
- B、500mL
- C、1/3 肺活量
- D、达到病人肺部
- E、使病人胸廓抬起

【答案】： E

91、严重低钾血症患者主要死于 0

- A、心肌收缩性降低
- B、心肌传导降低
- C、心肌自律降低
- D、肾功能严重障碍
- E、呼吸衰竭

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/636242131121010143>

