

2024 年甘肃省徽县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题通关秘籍题库及参考答案（基础题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对铜绿假单胞菌感染无效的抗生素是

- A: 头孢曲松
- B: 头孢克洛
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢他啶

答案：B

2. 巨幼细胞贫血可选用

- A: 维生素 K1
- B: 维生素 B12
- C: 肝素
- D: 香豆素类

答案：B

3. （2015 年真题）阿片类镇痛药与阿托品合用，可抑制胃肠蠕动，导致的不良反应是（）。

- A: 低血压
- B: 胆绞痛
- C: 躁狂
- D: 便秘

答案：D

4. 促进钙剂吸收可选用

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 阿法骨化醇
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 依降钙素

答案：B

5. 制霉菌素属于

- A: 吗啉类
- B: 唑类
- C: 丙烯胺类
- D: 抗生素类

答案：D

6. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- B: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- C: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用
- D: 可使用大环内酯类药物如红霉素

答案：D

7. 属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

- A: 阿米洛利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋塞米

答案：A

8. 关于噻嗪类利尿药的描述，错误的是

- A: 痛风患者慎用
- B: 可引起低钙血症
- C: 肾功能不良者禁用
- D: 糖尿病患者慎用

答案：B

9. 通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上 PBP3 的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

- A: 氨曲南
- B: 头孢噻肟
- C: 头孢他啶
- D: 头孢美唑

答案：A

10. 患者，男，58 岁。最近出现多饮、多尿和体重下降等不正常身体状况就诊，检查发现血糖高，诊断为 2 型糖尿病，轻度心功能不全，医嘱选择磺酰脲类促胰岛素分泌药治疗。

- A: 格列美脲
- B: 格列喹酮
- C: 格列齐特
- D: 格列本脲

答案：D

11. 可引起血钾、血钙降低，血尿素氮、肌酐及尿酸升高的是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依他尼酸
- D: 醛固酮

答案：B

12. 属于促凝血因子合成的药物是()

- A: 甲萘氢醌
- B: 鱼精蛋白
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 卡巴克络

答案：A

13. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

- A: 替硝唑
- B: 氯喹
- C: 喹碘仿
- D: 依米丁

答案：B

14. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 血压下降
- B: 惊厥
- C: 心律失常
- D: 支气管痉挛

答案：C

15. 可抑制呼吸、胃肠道运动、引起心动过缓、恶心呕吐的受体是

- A: $\mu 2$ 受体
- B: $\mu 1$ 受体
- C: K 受体
- D: δ 受体

答案：A

16. 不宜与三环类抗抑郁药合用

- A: 羟甲唑啉
- B: 麻黄碱
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 赛洛唑啉

答案：B

17. (2021 年真题) 患者，男，46 岁。新诊断为高血压，最高血压 155/95mmHg，心率 100 次/分，交感神经兴奋性明显增高，首选的治疗药物是 ()

- A: 美托洛尔
- B: 氯沙坦
- C: 硝酸甘油
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

18. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物

- A: 胺碘酮
- B: 地高辛
- C: 利多卡因
- D: 苯妥英钠

答案：D

19. 利福平对多种革兰阳性球菌，特别是()具有强大抗菌作用

- A: 大肠埃希菌
- B: 变形杆菌
- C: 流感杆菌
- D: 耐药金黄色葡萄球菌

答案：D

20. 严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 青霉素
- C: 红霉素
- D: 异烟肼

答案：A

21. 与其他袪利尿药相比，不良反应更大，因此临床使用受到限制，主要用作对磺酰胺类药物过敏或不耐受患者替代药物的是

- A: 托拉塞米
- B: 呋塞米
- C: 依他尼酸
- D: 布美他尼

答案：C

22. (2017 年真题) 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是()

- A: 依折麦布
- B: 阿昔莫司

C: 利血平

D: 瑞舒伐他汀

答案: D

23. 能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

A: 磺胺甲唑

B: 普萘洛尔

C: 格列喹酮

D: 甲状腺素

答案: D

24. 患儿，5 岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

A: 与核蛋白 70S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

B: 抑制细菌蛋白质合成全过程

C: 与核蛋白 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

D: 与核蛋白 50S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

答案: D

25. 适用于肠道菌群失调引起腹泻的药物是

A: 酪酸菌

B: 乳酸菌

C: 双歧三联活菌胶囊

D: 乳酶生

答案: C

26. 下述药物中兼有角质溶解和抑制真菌作用的是

A: 苯甲酸

- B: 阿莫罗芬
- C: 咪康唑
- D: 特比萘芬

答案：A

27. 下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

- A: 盐酸麻黄碱
- B: 酚甘油
- C: 硼酸
- D: 过氧化氢

答案：A

28. 异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- C: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- D: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

答案：A

29. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

- A: 卡比马唑
- B: 碳酸锂
- C: 丙硫氧嘧啶

D: 甲巯咪唑

答案: D

30. 可出现酮尿或乳酸性血症的药物是

A: 艾塞那肽

B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

C: 胰岛素皮下注射

D: 二甲双胍

答案: D

31. 下述药物中用于缓解鼻黏膜充血肿胀引起的鼻塞的是

A: 链霉素溶剂

B: 利巴韦林滴鼻液

C: 盐酸麻黄碱滴鼻液

D: 硼酸

答案: C

32. 司来吉兰用于

A: 特发性震颤

B: 早期帕金森病

C: 神经源性尿崩症

D: 慢性脑功能不全

答案: B

33. 可用于慢性活动性肝炎的治疗的是

A: 复方氨基酸注射液 (3AA)

B: 赖氨酸

C: 复方氨基酸注射液 (18AA)

D: 精氨酸

答案：A

34. 属于抗雌激素类的是

A: 甲地孕酮

B: 睾酮

C: 己烯雌酚

D: 他莫昔芬

答案：D

35. (2018 年真题) 患者, 女, 28 岁, 因“多汗、心慌、消瘦、易怒半月余”就诊, 实验室检查显示 FT₄ 和 FT₃ 均升高, TSH 降低, 甲状腺 I 度肿大, 心率 92 次/分, 诊断为“甲状腺功能亢进症”简称甲亢”。给予甲巯咪唑片 10mg, 一日 3 次盐酸普萘洛尔片 10mg, 日 3 次。患者 1 月后复查, FT₃ 和 FT₄ 恢复正常, 但出现膝关节疼痛。

A: 哺乳期妇女禁用甲巯咪唑

B: 哺乳期妇女应停止甲亢的治疗

C: 哺乳期妇女可选用丙硫氧嘧啶

D: 哺乳期妇女禁用普萘洛尔

答案：C

36. 常引起体位性低血压的是

A: 十一酸睾酮

B: 普适泰

C: 非那雄胺

D: 哌唑嗪

答案：D

37. 内脏绞痛可选用 ()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 阿托品
- C: 肾上腺素
- D: 熊去氧胆酸

答案：B

38. (2018 年真题) 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- C: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

答案：B

39. 以肠内营养乳剂 (TPF-D) 作为唯一营养来源的患者, 推荐剂量为一日

- A: 30ml/kg
- B: 10ml/kg
- C: 20ml/kg
- D: 40ml/kg

答案：A

40. 可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

- A: 硝普钠
- B: 氨氯地平

C: 阿利克仑（阿利吉仑）

D: 阿托普利

答案：A

41. 磷酸二酯酶III抑制剂是()

A: 多巴酚丁胺

B: 依那普利

C: 米力农

D: 地高辛

答案：C

42. 肥胖型 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是()

A: 格列吡嗪

B: 二甲双胍

C: 格列本脲

D: 格列齐特

答案：B

43. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

A: 阿达帕林

B: 异维 A 酸

C: 壬二酸

D: 维 A 酸

答案：A

44. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

A: 来曲唑

B: 顺铂

C: 紫杉醇

D: 依托泊苷

答案：D

45. 碳酸钙的适应证不包括()

A: 骨发育不全

B: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

C: 佝偻病

D: 骨质疏松

答案：B

46. 疗效优于乙琥胺，但因有肝毒性，仅在癫痫小发作合并大发作时应用的药物是

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 丙戊酸钠

D: 苯巴比妥

答案：C

47. 下列关于碘苷说法错误的是

A: 可延缓角膜上皮创伤愈合

B: 可用于疱疹性脑膜炎

C: 皮肤疾病可长期用药

D: 可用于单纯疱疹性角膜炎

答案：C

48. (2019 年真题) 患者首次使用西妥昔单抗，为减轻其不良反应，常规预处理使用的药物是()

- A: 质子泵抑制剂
- B: 化疗止吐类药物
- C: 抗组胺类药物
- D: 维生素类药物

答案：C

49. 选择性 COX-2 抑制剂引起心脑血管不良反应的机制是

- A: 促进 TXA₂ 的合成，促进血小板聚集
- B: 抑制前列腺素的生成，使血栓素升高，促进血栓形成
- C: 降低腺苷环化酶的活性，促进血小板聚集
- D: 负性肌力作用，造成心衰

答案：B

50. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 甲硝唑
- B: 呋喃妥因
- C: 克林霉素
- D: 多黏菌素

答案：A

51. 下列不属于抗肿瘤药的是

- A: 长春碱
- B: 长春新碱
- C: 氟胞嘧啶
- D: 三尖杉酯碱

答案：C

52. 关于硫黄软膏治疗疥疮的用法，错误的是

- A: 密切接触者应同时接受治疗
- B: 对顽固患者必需 3 个疗程方能根治
- C: 用药期间应勤用热水洗澡
- D: 儿童可使用 5% 的软膏

答案：C

53. 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒。食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（）

- A: 颠茄
- B: 甲氧氧普胺
- C: 奥美拉唑
- D: 多潘立酮

答案：C

54. 可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

- A: 氨茶碱
- B: 沙丁胺醇
- C: 可待因
- D: 布地奈德

答案：C

55. （2016 年真题）属于促胰岛素分泌剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 阿卡波糖
- C: 那格列奈
- D: 二甲双胍

答案：C

56. (2018 年真题) 关于莫西沙星作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 莫西沙星抗菌谱广, 对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性
- B: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗
- C: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物
- D: 莫西沙星组织分布广泛, 但不能透过血脑屏障

答案：D

57. 属于短效 β_2 受体激动剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 异丙托溴铵
- C: 噻托溴铵
- D: 特布他林

答案：D

58. 可用于吗啡中毒解救的药物是

- A: 阿托品
- B: 苯甲酸钠咖啡因
- C: 氟马西尼
- D: 纳洛酮

答案：D

59. 四环素联用红霉素使

- A: 口服吸收减少
- B: 肝毒性增加
- C: 调整抗凝血药的剂量

D: 增加麦角中毒的风险

答案: B

60. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

A: 胺碘酮

B: 地尔硫革

C: 美西律

D: 普萘洛尔

答案: D

61. 氯霉素抗菌谱广，而最主要的不良反应是()

A: 对造血系统的毒性

B: 胃肠道反应

C: 二重感染

D: 对肝脏严重损害

答案: A

62. 对偶发性失眠者可选择()。

A: 夸西洋

B: 氟西洋

C: 艾司唑仑

D: 唑吡坦

答案: D

63. 主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 苯巴比妥

D: 加巴喷丁

答案: B

64. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药物是

A: 异丙托溴铵

B: 茶碱

C: 孟鲁司特

D: 沙丁胺醇

答案: C

65. 关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

A: 强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸

B: 是二氢叶酸还原酶抑制剂

C: 主要用于治疗急性白血病

D: 是二氢叶酸合成酶抑制剂

答案: D

66. 关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

A: 不用于 18 岁以下银屑病患者

B: 对严重的银屑病效果显著

C: 育龄期妇女用药前 2 周，应进行血清或尿液妊娠试验

D: 成人每晚(睡前半小时)1 次，一般 12 周，使用面积应不超过 20% 体表面积

答案: B

67. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的抗菌药是

A: 甲硝唑

- B: 四环素
- C: 喹诺酮类
- D: 苯唑西林

答案：C

68. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

- A: 异烟肼
- B: 利福平
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

答案：D

69. 调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

- A: 氯化铵
- B: 氯化钠
- C: 碳酸氢钠
- D: 乳酸钠

答案：C

70. 可致细胞膜通透性增加，细菌膨胀、溶解死亡的药物是

- A: 多黏菌素
- B: 替加环素
- C: 环丙沙星
- D: 庆大霉素

答案：A

71. 关于维生素用药时间的说法正确的是

- A: 水溶性维生素应该在餐后服用，脂溶性维生素应该在餐中服用

- B: 水溶性维生素应该在餐前服用，脂溶性维生素应该在餐后服用
- C: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐后服用
- D: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐前服用

答案：A

72. () 与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

- A: 氯霉素
- B: 糖皮质激素
- C: 地高辛
- D: 氨茶碱

答案：C

73. 以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

- A: 辛伐他汀
- B: 瑞舒伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 非诺贝特

答案：D

74. 维 A 酸联合过氧苯甲酰治疗寻常痤疮的正确用法是

- A: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶
- B: 将两药的凝胶或乳膏充分混合后应用
- C: 晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏，睡前应用过氧苯甲酰凝胶
- D: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

答案：A

75. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法

- A: 混悬型胰岛素可以静脉注射

- B: 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类
- C: 每次注射需要更换不同部位
- D: 未使用的胰岛素应在 2℃~8℃ 冷藏保存

答案：A

76. 鱼精蛋白可用于救治()。

- A: 异烟肼中毒导致的神经毒性
- B: 华法林过量导致的出血
- C: 肝素过量导致的出血
- D: 吗啡过量导致的呼吸抑制

答案：C

77. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

- A: 阿瑞吡坦
- B: 甲地孕酮
- C: 格雷司琼
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

78. 磷酸二酯酶抑制剂的机制

- A: 抑制葡萄糖脱氢酶
- B: 使血小板内 cAMP 浓度增高而产生抗血小板作用
- C: 抑制血小板表面的 ADP 受体
- D: 抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合

答案：B

79. 容易发生双硫仑样反应的药物包括()

- A: 链霉素

B: 阿莫西林

C: 头孢唑林

D: 青霉素

答案：C

80. 长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

A: 链霉素

B: 乙胺丁醇

C: 利福平

D: 异烟肼

答案：B

81. 有关阿莫西林特点的说法正确的是

A: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

B: 口服吸收差，生物利用度小

C: 对耐药金葡萄菌有效

D: 耐酸、耐酶

答案：A

82. 外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是()。

A: 地塞米松>氟轻松>卤米松

B: 卤米松>氟轻松>地塞米松

C: 地塞米松>卤米松>氟轻松

D: 卤米松>地塞米松>氟轻松

答案：B

83. (2021 年真题) 属于 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 ()

- A: 艾司西酞普兰
- B: 吗氯贝胺
- C: 马普替林
- D: 文拉法辛

答案：D

84. 维生素 A 缺乏时可患

- A: 成人佝偻病
- B: 夜盲症
- C: 脚气病
- D: 糙皮病

答案：B

85. 剂量过大会引起高铁血红蛋白血症的是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝酸甘油
- C: 地尔硫
- D: 硝苯地平

答案：B

86. 维生素 C 缺乏时引起

- A: 成人佝偻病
- B: 坏血病
- C: 角膜软化症
- D: 脚气病

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/637004160051010024>