

全科医学住院医师：眼科题库知识点（三）

1、单选 青光眼黄斑功能改变除外（）。

- A. 获得性色觉障碍
- B. 图形视网膜电图改变
- C. 视诱发电位改变
- D. 眼电图改变
- E. 视觉对比敏感度改变

正确答案：D

2、填空题 视觉电（江南博哥）生理检查常用的有（）、（）、（）。

正确答案：眼电图；视网膜电图；视觉诱发电位

3、多选 闭角型青光眼的激发试验有几种（）。

- A. 暗室试验
- B. 俯卧试验
- C. 散瞳试验
- D. 饮水试验
- E. 缩瞳试验

正确答案：A, B, C, D

4、多选 先天性青光眼的表现包括（）。

- A. 角膜增大
- B. 前房加深
- C. 畏光、流泪
- D. 球形晶状体
- E. 眼压升高

正确答案：A, B, C, E

参考解析：先天性青光眼的临床表现包括畏光、流泪、眼睑痉挛；角膜增大、前房加深；眼压升高和特征性深前房。

5、单选 正常人大约多少的房水经葡萄膜巩膜途径外流（）。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%
- E. 25%

正确答案：D

6、单选 先天性青光眼的临床表现除外（）。

- A. 角膜增大
- B. 前房浅
- C. 畏光、流泪
- D. 青光眼杯进行性扩大

E. 眼压升高

正确答案：B

参考解析：先天性青光眼表现包括角膜增大、畏光、流泪、特征性深前房、青光眼杯进行性扩大、眼压升高。

7、单选 青光眼滤过手术后两年失败率是多少（）。

A. 小于 5%

B. 5%~15%

C. 15%~25%

D. 25%~35%

E. 大于 35%

正确答案：C

8、单选 患者，女性，19 岁，双眼充血、疼痛、畏光、流泪、异物感 20 天，检查：双眼结膜充血，滤泡增生，中央部角膜可见散布的白色斑点状浑浊（）。

A. 沙眼

B. 泡性结膜炎

C. 腺病毒性结膜炎

D. 春季卡他性结膜炎

E. 淋球菌性结膜炎

正确答案：C

9、多选 慢性细菌性结膜炎发病原因包括（）。

A. 急性结膜炎治疗不当

B. 毒力不强的细菌感染

C. 不良环境刺激

D. 慢性泪囊炎

E. 慢性鼻炎

正确答案：A, B, C, D, E

10、多选 眼压高低主要取决于房水循环中的哪些因素（）。

A. 睫状突生成房水的速率

B. 葡萄膜巩膜通道的大小

C. 上巩膜静脉压

D. 前房角的宽窄

E. 房水通过小梁网流出的阻力

正确答案：A, C, E

参考解析：眼压高低主要取决于房水循环中睫状突生成房水的速率、上巩膜静脉压、房水通过小梁网流出的阻力。

11、单选 原发性开角型青光眼中期视野（）。

A. 生理盲点扩大

- B. 旁中心暗点
- C. 环形暗点
- D. 管状视野
- E. 相对暗点

正确答案：C

12、单选 新生血管性青光眼（ ）。

- A. Marfan 综合征
- B. 溶血性青光征
- C. 青光眼睫状体炎综合征
- D. 广泛视网膜缺血所致青光眼
- E. 虹膜角膜内皮综合征

正确答案：D

13、单选 原发性闭角型青光眼和原发性开角型青光眼的根本区别是（ ）。

- A. 眼压升高的快慢
- B. 眼压升高的程度
- C. 眼压升高时房角是开放还是闭合
- D. 眼压控制时房角是开放还是闭合
- E. 视功能损伤的程度

正确答案：C

14、单选 开角型青光眼可以（ ）。

- A. 无任何症状、不知不觉中失明
- B. 头痛、恶心、呕吐、眼压升高而失明
- C. 晚上看电视后眼发胀、视力下降
- D. 眼胀、虹视、恶心、呕吐、眼压升高
- E. 以上都不是

正确答案：A

15、单选 在 40 岁个体眼压超过正常的约有（ ）。

- A. 5%
- B. 7%
- C. 10%
- D. 15%
- E. 25%

正确答案：B

16、单选 包涵体性结膜炎潜伏期（ ）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周

E. 10~12 周

正确答案：A

17、单选 巨大乳头是指结膜乳头直径大于（）。

A. 0.5mm

B. 1mm

C. 2mm

D. 2.5mm

E. 3mm

正确答案：B

参考解析：>0.3mm 为大乳头，>1mm 为巨大乳头。

18、单选 细菌性角膜溃疡中最严重的致病菌是（）。

A. 金黄色葡萄球菌

B. 肺炎链球菌

C. 溶血性链球菌

D. 绿脓杆菌

E. 流感嗜血杆菌

正确答案：D

19、多选 青光眼睫状体炎综合征的特点包括（）。

A. 可能发生虹膜后粘连

B. 反复发作的非肉芽肿性睫状体炎

C. 玻璃体无炎症细胞

D. 发作时眼压升高

E. 发作时房角关闭

正确答案：B, C, D

参考解析：青光眼睫状体炎综合征的特点包括反复发作的非肉芽肿性睫状体炎、玻璃体无炎症细胞、发作时眼压升高，房角开放、从不发生虹膜后粘连等。

20、多选 抑制房水生成（）。

A. 缩瞳剂

B. β -受体阻滞剂

C. 肾上腺素

D. 前列腺素衍生物

E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：B, E

21、多选 对流行性角结膜炎的临床特点，说法错误的是（）。

A. 潜伏期 5~7 天，发病 5~7 天达到高峰，持续 3~4 周

B. 睑球结膜显著充血，大量出血，睑结膜及穹隆大量滤泡，耳前淋巴结肿大

C. 上皮型角膜炎的发生是病毒在角膜上皮内增殖所致

- D. 角膜中央区上皮及浅基质层斑点状浸润一般不消退，遗留永久瘢痕
- E. 传染性强，发病后 10 天内应注意隔离

正确答案：B, D

参考解析：流行性角结膜炎结膜下出血少见。流行性出血性角结膜炎常见大量结膜下出血。流行性角结膜炎患者角膜中央区上皮及浅基质层斑点状浸润与角膜基质对病毒抗原的免疫反应有关，在数月或数年后逐渐吸收。

22、单选 化学性眼外伤急救处理原则首选（）。

- A. 球结膜下注射止血
- B. 扩瞳
- C. 冲洗结膜囊
- D. 抗感染
- E. 理疗

正确答案：C

23、多选 病变以下睑结膜和下穹隆为著的是（）。

- A. 慢性滤泡性结膜炎
- B. 春季角结膜炎
- C. 沙眼
- D. 巨乳头性结膜炎
- E. 包涵体性结膜炎

正确答案：A, E

24、单选 患儿，12 岁，男，双眼痒，春夏季明显，检查：上睑结膜可见扁平大小不等浅红色乳头，如铺路石，分泌物呈黏丝状（）。

- A. 沙眼
- B. 泡性结膜炎
- C. 腺病毒性结膜炎
- D. 春季卡他性结膜炎
- E. 淋球菌性结膜炎

正确答案：D

25、单选 结膜炎的治疗中哪项是错误的（）。

- A. 冲洗结膜囊
- B. 冷敷
- C. 局部点用抗生素
- D. 全身应用抗生素
- E. 遮盖患眼

正确答案：E

26、多选 晶状体源性青光眼包括（）。

- A. 晶状体肿胀
- B. 晶状体脱位
- C. 晶状体混浊

D. 球形晶状体

E. 晶状体溶解

正确答案：A, B, D, E

27、多选 慢性滤泡性结膜炎病变主要位于（）。

A. 上穹隆

B. 上睑结膜

C. 下穹隆

D. 下睑结膜

E. 上下睑结膜弥漫病变

正确答案：C, D

28、单选 前房角是指（）。

A. 虹膜之后与睫状体之间的间隙

B. 角膜之后的周边部分

C. 巩、角膜与虹膜睫状体之间的隐窝

D. 角膜与虹膜睫状体之夹角

E. 巩膜与虹膜睫状体之夹角

正确答案：C

29、多选 与眼内出血有关的青光眼（）。

A. 前房出血

B. 血影细胞性青光眼

C. 房角后退性青光眼

D. 溶血性青光眼

E. 血铁沉着性青光眼

正确答案：A, B, D, E

参考解析：与眼内出血有关的青光眼包括前房出血、血影细胞性青光眼、溶血性青光眼、血铁沉着性青光眼等。

30、单选 对中心性浆液性脉络膜视网膜病变不应该使用（）。

A. 维生素

B. 激素

C. 肌苷

D. 三磷酸腺苷（ATP）

E. 50%葡萄糖注射液

正确答案：B

31、单选 患儿男性6天，经产道分娩，大量脓性分泌物3天，眼睑水肿，畏光，流泪，耳前淋巴结肿大和压痛，最可能的诊断为（）。

A. 沙眼

B. 泡性结膜炎

C. 腺病毒性结膜炎

D. 春季卡他性结膜炎

E. 淋球菌性结膜炎 **正确答案：** E

32、多选 新生血管性青光眼常继发于下列疾病（ ）。

A. 视网膜静脉阻塞

B. 糖尿病性视网膜病变

C. 视网膜中央动脉阻塞

D. 视网膜静脉周围炎

E. Coats 病

正确答案： A, B, C, D, E

参考解析： 新生血管性青光眼常继发于下列疾病视网膜静脉阻塞、糖尿病性视网膜病变、视网膜中央动脉阻塞、视网膜静脉周围炎、Coats 病。

33、单选 超急性细菌性结膜炎发病在（ ）。

A. 12 小时内

B. 24 小时内

C. 3 天内

D. 7 天内

E. 14 天内

正确答案： B

34、多选 眼睑结膜假膜特点（ ）。

A. 富有纤维蛋白的渗出物

B. 结膜上皮一般保持完整

C. 最常见于白喉杆菌性结膜炎

D. 与结膜组织结合疏松，容易剥离

E. 剥除后创面粗糙易出血

正确答案： A, B, D

参考解析： 假膜由脱落的结膜上皮细胞、白细胞、病原体和富含维生素性的渗出物形成。最常见于腺病毒性结膜炎。假膜是上皮表面的凝结物，取出后上皮完整，不易出血。

35、单选 晶状体源性青光眼（ ）。

A. Marfan 综合征

B. 溶血性青光征

C. 青光眼睫状体炎综合征

D. 广泛视网膜缺血所致青光眼

E. 虹膜角膜内皮综合征

正确答案： A

36、单选 眼局部长应用皮质类固醇，可引起的副作用是（ ）。

A. 结膜炎

B. 点状角膜炎

- C. 视神经炎
- D. 角膜溃疡
- E. 青光眼

正确答案：E

37、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最新的药（）。

- A. 拟胆碱药
- B. 缩瞳剂
- C. β 受体阻滞剂
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：D

参考解析：Marfan 综合征出现晶状体脱位可以导致晶状体源性青光眼。

38、单选 急性前葡萄膜炎的治疗最好首选（）。

- A. 1%阿托品眼膏
- B. 2%后马托品眼膏
- C. 5%去氧肾上腺素
- D. 0.1%肾上腺素
- E. 1%阿托品眼药水

正确答案：B

39、单选 患者女性，24岁，左眼红5天后就医。检查：右眼下方球结膜充血，相应部位见一疱疹样结节，角膜透明，最可能的诊断是（）。

- A. 急性卡他性结膜炎
- B. 泡性结膜炎
- C. 滤泡性结膜炎
- D. 慢性结膜炎
- E. 过敏性结膜炎

正确答案：B

参考解析：泡性结膜炎多见于女性、青少年、儿童，早期为实性、隆起结节，周围有充血区，是迟发型免疫反应性疾病。

40、多选 春季角结膜炎患者可选用的药物（）。

- A. 色甘酸钠
- B. 埃美丁
- C. 典必殊
- D. 氧氟沙星
- E. 0.05%FK-506

正确答案：A, B, C, E

参考解析：春季角结膜炎可应用血管收缩剂、抗组胺药、细胞膜稳定剂、糖皮质激素及免疫抑制剂。

41、多选 增加小梁网通道房水外流（）。

- A. 缩瞳剂
- B. β -受体阻滞剂
- C. 肾上腺素
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：A, C

参考解析：增加小梁网通道房水外流肾上腺素和缩瞳剂，缩瞳剂能直接兴奋虹膜括约肌，缩小瞳孔和增加虹膜张力，解除周边虹膜对小梁网的堵塞。

42、单选 患者女性，32岁，双眼异物感3个月，眼胀1周。检查：双眼视力0.8，结膜轻度充血，角膜透明，前房正常，晶状体透明，杯盘比0.4，眼压28mmHg，病史中用地塞米松眼液2个月。最恰当的处理（）。

- A. 停用地塞米松眼液
- B. 行青光眼外引流手术
- C. 停用地塞米松眼液，加用贝特类眼液
- D. 停用地塞米松眼液，加用毛果芸香碱眼液
- E. 改用典必殊眼液

正确答案：C

参考解析：激素导致的青光眼首先停用地塞米松眼液，同时药物降低眼压处理。

43、单选 患者，50岁，双眼不适10余年，加重1个月。检查：双眼睑结膜肥厚，网状瘢痕，上睑内翻，泪膜破裂时间6秒，最可能诊断为（）。

- A. 沙眼
- B. 泡性结膜炎
- C. 腺病毒性结膜炎
- D. 春季卡他性结膜炎
- E. 淋球菌性结膜炎

正确答案：A

44、多选 主要表现为开角型青光眼的是（）。

- A. ICE综合征
- B. 剥脱性青光眼
- C. 恶性青光眼
- D. 糖皮质激素性青光眼
- E. 晶状体溶解性青光眼

正确答案：B, D, E

45、单选 目前，结膜假膜最主要见于（）。

- A. 腺病毒性结膜炎
- B. 白喉杆菌性结膜炎

- C. 泡性结膜炎
- D. 春季结膜炎
- E. 单纯疱疹病毒性结膜炎

正确答案：A

46、单选 沙眼局部用药疗程至少为（）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周
- E. 10~12 周

正确答案：E

47、单选 虹膜睫状体炎继发青光眼的治疗不正确的是（）。

- A. 激素
- B. 散瞳孔
- C. 抑制房水生成
- D. 缩瞳剂
- E. β -受体阻滞剂

正确答案：D

参考解析：虹膜睫状体炎继发青光眼的治疗包括激素、散瞳、抑制房水生成、 β -受体阻滞剂。缩瞳剂可能加重虹膜睫状体炎，不能使用。

48、单选 关于色素性青光眼，说法错误的是（）。

- A. 小梁网有明显色素沉积
- B. 可见角膜后中央区中下部梭形色素沉着
- C. 中周边区虹膜后凹脱色素
- D. 青光眼的发生机制仅为色素颗粒阻塞小梁网所致
- E. UBM 在辅助诊断中起重要作用

正确答案：D

参考解析：色素性青光眼的发生机制包括：色素颗粒阻塞小梁网、小梁功能异常、内皮细胞吞噬功能异常。

49、单选 高眼压症在测量眼压时充分注意测量误差，眼压测量时的主要误差因素（）。

- A. 患者的配合
- B. 中央角膜厚度
- C. 测量的方法
- D. 巩膜的厚度
- E. 眼球内容物的多少

正确答案：B

50、单选 春季卡他性结膜炎的细胞学检查有哪些改变（）。

- A. 单核细胞增多
- B. 多形核白细胞增多
- C. 嗜酸性粒细胞增多
- D. 细胞质内有包涵体
- E. 中性粒细胞增多

正确答案：C

参考解析：春季卡他性结膜炎的细胞学检查可见嗜酸性粒细胞增多。

51、单选 正常眼压值（）。

- A. 11~20mmHg
- B. 10~20mmHg
- C. 11~21mmHg
- D. 10~21mmHg
- E. 11~22mmHg

正确答案：D

52、单选 患者男性，右眼红肿，分泌物增多3天，检查：右眼睑红肿。结膜囊内大量黄白色分泌物，结膜充血，水肿，耳前侧淋巴结肿大压痛，角膜透明，伴有尿急，尿频，尿痛症状。最可能诊断为（）。

- A. 淋球菌性结膜炎
- B. 慢性结膜炎
- C. 沙眼
- D. 流行性角结膜炎
- E. 病毒性结膜炎

正确答案：A

参考解析：淋球菌性结膜炎，大量脓性分泌物，眼睑水肿，结膜充血，耳前淋巴结肿大压痛，可有泌尿系统症状。

53、多选 影响瞳孔阻滯力的解剖因素包括（）。

- A. 晶状体肿大
- B. 晶状体悬韧带紧张
- C. 晶状体-虹膜隔前移
- D. 小眼球、小角膜
- E. 虹膜较厚和松软容易膨隆

正确答案：A, C, D, E

参考解析：影响瞳孔阻滯力的解剖因素包括晶状体肿大；晶状体悬韧带松弛；晶状体-虹膜隔前移、小眼球、小角膜，晶状体相对过大；虹膜的质地和厚度对青光眼有一定的影响，较厚和松软容易膨隆。

54、多选 高眼压症包括以下几点（）。

- A. 眼压高于统计学正常上限
- B. 长期随访会出现视盘和视野损害

- C. 房角开放
- D. 长期随访不会出现视盘和视野损害
- E. 房角关闭

正确答案：A, C, D

55、单选 角膜损伤最常见的临床表现是（）。

- A. 角膜上皮擦伤、基质层水肿
- B. 角膜后羊脂状 KP
- C. 角膜血染
- D. 角膜后色素沉着
- E. 角膜为浅点状混浊

正确答案：A

56、单选 急性期或重症沙眼全身用药疗程（）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周
- E. 10~12 周

正确答案：B

57、单选 以下治疗青光眼的药物中，哪一种的降压机制是使阻塞房角开放（）。

- A. 醋唑磺胺
- B. 甘露醇
- C. 噻吗心安
- D. 甘油盐水
- E. 毛果芸香碱

正确答案：E

58、多选 沙眼出现角膜混浊的原因包括（）。

- A. 睑内翻、倒睫
- B. 角膜血管翳形成
- C. 合并细菌感染
- D. 上睑下垂
- E. 角膜缘滤泡瘢痕化

正确答案：A, B, E

59、单选 美开朗的作用机制（）。

- A. 阻断睫状体色素上皮细胞 β_1 受体，减少房水生成
- B. 阻断睫状体色素上皮细胞 β_2 受体，减少房水生成
- C. 阻断睫状体非色素上皮细胞 β_1 受体，减少房水生成
- D. 阻断睫状体非色素上皮细胞 β_2 受体，减少房水生成

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/637111155165006110>