

2024 年福建省明溪县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题内部题库【模拟题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 用于糖尿病患者可出现低血糖或高血糖的药物是

- A: 头孢菌素类
- B: 培高利特
- C: 氟西汀
- D: 加替沙星

答案：D

2. 已知 1%(g/ml) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是

- A: 2.8(%g/ml)
- B: 2.4(%g/ml)
- C: 3.0(%g/ml)
- D: 2.6(%g/ml)

答案：A

3. （2017 年真题）患者男，65 岁，身高 170cm，体重 60kg，经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测（肌酐清除率 45ml/min ），诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全，该患者应首选的药物是

- A: 格列吡嗪
- B: 格列齐特
- C: 格列本脲

D: 格列喹酮

答案：D

4. 口服避孕药所致的心肌梗死，在吸烟妇女中发生的危险性加大，说明药源性疾病的患者因素是

A: 药物的使用

B: 生理因素

C: 药物制剂因素

D: 不良生活方式

答案：D

5. 对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

A: 苯溴马隆

B: 别嘌醇

C: 秋水仙碱

D: 泼尼松

答案：A

6. 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A: Hb

B: BUN

C: ALT

D: RBC

答案：C

7. 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

A: 胃肠道反应

B: 神经系统疾病

C: 肌病

D: 血液系统疾病

答案：B

8. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A: 部分确认的信号

B: 驳倒的信号

C: 确认的信号

D: 尚不确定的信号

答案：D

9. 能早期发现患者用药伤害、尽快地采取干预措施的方法是

A: 岗位工作问责

B: 病历审查

C: 计算机检测方法

D: 直接观察

答案：C

10. 可提示完全梗阻性黄疸的是

A: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

C: $>342 \mu\text{mol/L}$

D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：C

11. 治疗急迫性尿失禁的首选药物是

- A: α 1 阻断剂
- B: 选择性 α 1 激动剂
- C: 5 α 还原酶抑制剂
- D: 抗胆碱药物

答案：D

12. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

- A: 胰岛素
- B: 呋塞米
- C: 西咪替丁
- D: 氯丙嗪

答案：B

13. (2015 年真题) 饮茶可减少其吸收的药物是 ()。

- A: 阿莫西林
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 去氮加压素
- D: 硫酸亚铁

答案：D

14. 普萘洛尔联用硝苯地平抗高血压的机制是

- A: 拮抗作用
- B: 敏感化作用
- C: 协同作用
- D: 减少不良反应

答案：D

15. 写明稀释比例和使用时间，是指

- A: 医嘱完整不漏项
- B: 修订医嘱及时沟通
- C: 实现个体化治疗
- D: 医嘱清楚准确

答案：A

16. 饮食对粪外观的影响,肉食

- A: 黑褐色
- B: 酱色
- C: 暗绿色
- D: 红色

答案：A

17. 男性，72 岁。高血压病 3 年，血压 165/95mmHg，伴 2 型糖尿病。
首选降压药物是

- A: 心痛定
- B: β -受体阻滞剂
- C: 利尿剂
- D: ACEI 类

答案：D

18. 用 10%的氯化钠注射液和注射用水配制 3%的氯化钠注射液 100ml, 所需的 10%氯化钠注射液的毫升数是()

- A: 30
- B: 10
- C: 25
- D: 33.3

答案：A

19. 下列属于合理处方的是

- A: 患者，男，35 岁，行皮下脂肪瘤切除术（I 类手术切口），开具头孢哌酮-舒巴坦预防感染
- B: 患者，女，75 岁，身高 155cm，体重 77kg，高脂血症病史 10 年，因胃癌术后难以进食，给予脂肪乳静脉营养补液，给药期间密切关注血三酰甘油水平
- C: 患者，男，72 岁，患有活动性胃溃疡，因心肌梗死给予阿司匹林肠溶片
- D: 患者，女，40 岁，咳嗽数日，经实验室检查示白细胞和 C-反应蛋白均正常，开具阿奇霉素治疗

答案：B

20. 铁剂联用维生素 C，可增加疗效的机制是（）

- A: 协同作用
- B: 作用于不同的靶点
- C: 延缓或降低抗药性
- D: 促进机体的吸收利用

答案：D

21. 患者通过电话、网络或信件询问是

- A: 主动方式
- B: 被动方式
- C: 指令方式
- D: 质问方式

答案：B

22. 肠外营养 1g 氮能提供的热量是

A: 9kcal

B: 3kcal

C: 4kcal

D: 7kcal

答案：C

23. 属于广谱抗病毒药，具有抗病毒、调节免疫和抗增生作用的是

A: 更昔洛韦

B: 干扰素

C: 氟胞嘧啶

D: 奥司他韦

答案：B

24. 下列药源性疾病中，其诱因主要是“基础疾病因素”的是

A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

C: 新生儿体内蓄积氯霉素呈现灰婴综合征

D: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

答案：B

25. 慎用奥美拉唑的原因是

A: 引起嗜睡

B: 致使定向力障碍

C: 致使视力模糊

D: 引起多尿或多汗

答案：A

26. 清晨尿液酸碱度的参考范围为

A: pH4.5~6.5

B: pH4.5~8.0

C: pH4.5~5.5

D: pH5.5~6.5

答案：D

27. 高效选择性 5-HT₄ 受体激动剂，心律失常的副作用罕见的是

A: 西沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案：D

28. 药品临床评价具有"公正性和科学性"是基于

A: 应用医药学理论和实践的前沿知识

B: 在多学科新进展的基础上进行

C: 药品临床评价重在实践

D: 药品临床评价采用多中心、大样本、随机、双盲、对照的方法，经数理统计得出结论

答案：D

29. 急性乙醇中毒的分期大致可分为()。

A: 兴奋期和昏睡期

B: 共济失调期和昏睡期

C: 兴奋期和共济失调期

D: 兴奋期、共济失调期和昏睡期

答案：D

30. 放射性碘的不良反应是

- A: 甲状腺功能低下
- B: 中枢抑制
- C: 粒细胞缺乏
- D: 甲状腺功能亢进

答案：A

31. 严重不良反应为胃肠道穿孔和瘘形成，发生胃肠道穿孔的患者永久停用的靶向药是

- A: 帕博利珠单抗
- B: 利妥昔单抗
- C: 贝伐珠单抗
- D: 曲妥珠单抗

答案：C

32. （2018 年真题）患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道感染细菌性感染，处方如下：

- A: 阿司匹林泡腾片
- B: 左氧氟沙星片
- C: 氨溴索片
- D: 维生素 C 片

答案：A

33. 中成药血脂康中含有的化学药物成分是

- A: 依折麦布
- B: 阿托伐他汀钙
- C: 辛伐他汀
- D: 洛伐他汀

答案：D

34. 正规胰岛素的作用峰时为()。

- A: 0.6~1.5 小时
- B: 6~12 小时
- C: 1.5~4 小时
- D: 0.25~0.5 小时

答案：D

35. 第一类精神药品处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡黄色
- B: 淡绿色
- C: 淡橙色
- D: 淡红色

答案：D

36. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80%左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 布洛芬
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：B

37. 接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是

- A: 乙型肝炎病毒表面抗体
- B: 乙型肝炎病毒 e 抗原
- C: 乙型肝炎病毒表面抗原

D: 乙型肝炎病毒 e 抗体

答案: A

38. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}世界卫生组织的网址是

A: www. cm

B: org. cn

C: www. cp

D: org. cn

答案: C

39. 细菌感染患者可出现

A: 中性粒细胞增多

B: 红细胞/血红蛋白减少

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血小板增多

答案: A

40. 患者,男,58 岁,体重 68kg,高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰,伴发热,入院查体 BP: 120/80mmHg,T38.9℃。化验结果:白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$,中性粒细胞百分比 86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎,青霉素皮试阳性。

A: 氨苄西林

B: 莫西沙星

C: 阿莫西林

D: 头孢吡肟

答案: B

41. 对于暴发性疼痛频繁、存在吞咽困难或胃肠道功能障碍、临终患者的镇痛，可以采用患者自控镇痛泵技术输入

- A: 丁溴东莨菪碱片
- B: 芬太尼注射剂
- C: 加巴喷丁
- D: 布洛芬混悬液

答案：B

42. 服用磺胺甲噁唑时

- A: 禁吸烟
- B: 宜少饮水
- C: 宜多饮水
- D: 忌用热水送服

答案：C

43. 患者，男，46 岁，拟行肠道手术，术前 1 天使用导泻药的方法是()

- A: 50%硫酸镁溶液口服
- B: 5%氯化钙注射液静脉滴注
- C: 50%葡萄糖注射液湿敷
- D: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

答案：A

44. 引起药源性肾病的药物，新霉素具有

- A: 肾间质纤维化
- B: 直接肾毒性
- C: 前列腺素合成障碍
- D: 肾小管阻塞

答案：B

45. 某患者，男，25 岁，苯二氮

- A: 亚甲蓝
- B: 硫酸钠
- C: 间羟胺
- D: 氟马西尼

答案：D

46. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 普通胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 预混胰岛素
- D: 甘精胰岛素

答案：A

47. 不能解除病因，不宜长期服用的；但对慢性钝痛如牙痛、头痛、关节痛等有较好的镇痛效果药物是

- A: 谷维素
- B: 阿司匹林
- C: 地西泮
- D: 罗通定

答案：B

48. 拓扑异构酶抑制剂

- A: 顺铂
- B: 依托泊苷
- C: 放线菌
- D: 培美曲塞

答案：B

49. 醛固酮受体拮抗剂

- A: 阿利吉仑
- B: 阿米洛利
- C: 依普利酮
- D: 雷米普利

答案：C

50. 属于药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径的是

- A: 治疗药物监测
- B: 药物信息服务
- C: 参与健康教育
- D: 处方调剂

答案：A

51. 再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

- A: 血红蛋白生成减少
- B: 红细胞生成过多
- C: 红细胞丢失过多
- D: 红细胞生成减少

答案：D

52. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 左眼

- A: O
- B: DOL
- C: LD
- D: NS

答案：B

53. 验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: II 期临床试验

B: 临床预试验

C: III 期临床试验

D: I 期临床试验

答案：C

54. 对于缺乏维生素 D 人群，应初始高剂量补充维生素 D₂ 或 D₃，待血清 25-OH-维生素 D₃ 水平达到一定值后，继而给予维持剂量。给予维持剂量的临床指标是血清 25-OH-维生素 D₃ 水平达到

A: 3 μg/L (7.5nmol/L) 以上

B: 90 μg/L (225nmol/L) 以上

C: 10 μg/L (25nmol/L) 以上

D: 30 μg/L (75nmol/L) 以上

答案：D

55. 对目标适应证患者治疗作用的初步评价是指

A: 临床预试验

B: II 期临床试验

C: I 期临床试验

D: III 期临床试验

答案：B

56. 一处方中，开具“黄体酮用于排出输尿管结石”，应评判为

A: 无正当理由超适应证用药

B: 有禁忌证用药

C: 联合用药不适宜

D: 过度治疗用药

答案：A

57. 患者，女，29 岁，孕 25+6 周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为 Hb71g / L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

A: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量

B: 先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1 小时后继续静脉注射余下剂量

C: 口服，每次 5ml，一日 3 次

D: 快速静脉注射

答案：B

58. （2021 年真题）患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

A: 阿司匹林属于冠心病-级预防，长期使用方可获益

B: 阿司匹林用药期间，需定期监测 INR

C: 阿司匹林肠溶片在进餐时服用，以减轻对胃肠道的刺激性

D: 用药期间，应关注腹痛、柏油样便或呕血等消化道出血症状

答案：D

59. 治疗需用 10%葡萄糖注射液 1000ml，现仅有 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液，分别取 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

A: 500ml，500ml

B: 200ml，800ml

C: 111ml, 889ml

D: 889ml, 111ml

答案：C

60. 男性高血压患者应

A: 慎用甲基多巴

B: 联用他汀类

C: 停用 ACEI 或减量

D: 给予硫酸亚铁

答案：A

61. 关于皮肤病外用剂型的选择，错误的说法

A: 急性期局部有红肿、水疱、糜烂时，多选用糊剂和乳膏剂

B: 慢性期皮损增厚，呈苔藓样变时，多用软膏剂和乳膏剂

C: 有渗液者，先用溶液剂湿敷，后用油剂

D: 皮损处于亚急性期时，可酌情选用糊剂、粉剂和洗剂

答案：A

62. 轻度药品不良反应是指

A: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

B: 没有临床症状，无须治疗

C: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

D: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

答案：D

63. 将 0.5g 氨茶碱注射液加入到 5% 葡萄糖注射液 250ml 中。临床要求给药速度是 60mg / h，输注速度应是

A: 20ml / h

B: 60ml / h

C: 30ml / h

D: 10ml / h

答案：C

64. 慎用雷尼替丁的原因是

A: 引起多尿或多汗

B: 致使视力模糊

C: 引起嗜睡

D: 致使定向力障碍

答案：D

65. (2019 年真题) 患者，女，62 岁，2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是

A: 吡格列酮

B: 格列齐特

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案：A

66. 根除幽门螺杆菌治疗的首选抗菌药是

A: 左氧氟沙星

B: 四环素

C: 呋喃唑酮

D: 阿莫西林

答案：D

67. (2018 年真题) 患者, 女, 25 岁, 产后 2 个月, 哺乳期, 因尿路感染需要给予抗感染治疗, 首选的药物是 ()

- A: 阿米卡星
- B: 左氧氟沙星
- C: 多西环素
- D: 头孢呋辛

答案: D

68. 告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

- A: 新药信息
- B: 禁忌证
- C: 药物相互作用
- D: 药品不良反应

答案: D

69. 使用片、粒、袋、支等清晰易懂的计数单位, 是针对

- A: 交代用药注意事项
- B: 交代用药途径及用药方法
- C: 交代药物的用量
- D: 交代药品贮存条件与方法

答案: C

70. 用于胆石症的非手术治疗, 属于钙通道阻滞剂, 不可掰开嚼碎, 避免卧位服用的药物是 ()

- A: 匹维溴铵片
- B: 熊去氧胆酸片
- C: 鹅去氧胆酸片
- D: 山莨菪碱片

答案：A

71. 下列药物中，解救硫喷妥钠中毒的特效药是

- A: 硫酸铜
- B: 碳酸氢钠
- C: 丙烯吗啡
- D: 硫酸镁

答案：B

72. COPD 气流受限严重程度分级的方法是

- A: FEV1 占预计值%
- B: CTP 分级
- C: CHA, DS, -VAsE 评分
- D: HAS-BLED 评分

答案：A

73. 两种药物配伍之后效价降低的是()

- A: 头孢曲松与复方氯化钠注射液
- B: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液
- C: 青霉素与 5%葡萄糖注射液
- D: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液

答案：C

74. 含有解热镇痛药的抗感冒药应慎用或禁用于

- A: 疲劳和生活规律紊乱者
- B: 妊娠初期及哺乳期妇女
- C: 患有心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、青光眼、前列腺增生的患者

D: 有血小板减少症、有出血倾向者、上消化道出血和(或)穿孔病史者
答案: D

75. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 没有临床症状，无需治疗

B: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

C: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

D: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

答案: C

76. 在患者入院、转科和出院时,药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱,核对患者目前的整体用药情况,避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等,以保证患者用药安全的药学服务过程,属于
()

A: 药物重整

B: 药物利用评价

C: 药学干预

D: 处方审核

答案: A

77. 评估房颤患者血栓栓塞风险的方法是

A: FEV1 占预计值%

B: HAS-BLED 评分

C: CHA₂DS₂-VASc 评分

D: CTP 分级

答案: C

78. 能减弱华法林的抗凝作用的食物是

- A: 地瓜
- B: 维生素 K
- C: 韭菜
- D: 芒果

答案：C

79. 贮存温度在 2℃ 以上时，温度越低，对多数药品保管越有利。降钙素鼻喷雾剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

- A: 温度不超过 20℃
- B: 温度在 2℃～10℃ 之间
- C: 避光，温度不超过 -5℃
- D: 温度在 10℃～30℃ 之间

答案：B

80. 下列药品宜冷处贮藏但不应冷冻的是：

- A: 氯化钠注射液
- B: 甘露醇注射剂
- C: 双歧三联活菌制剂
- D: 卡前列甲酯栓剂

答案：C

81. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

- A: 哌唑嗪口服
- B: 硝苯地平口服

C: 硝普钠静滴

D: 卡托普利口服

答案: C

82. 女性，32 岁，3 年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9/L$

A: 钙剂可促进铁剂吸收

B: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进吸收

C: 正常人维持体内铁平衡需要每天从食物摄铁 2~2.5mg

D: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

答案: D

83. 可导致性功能减退、皮疹、乳腺增大的药物是

A: 非那雄胺

B: 奥昔布宁

C: 坦索罗辛

D: 多沙唑嗪

答案: A

84. 对从事药学服务的药师而言，必须具备的专业知识能力要求是

A: 扎实的管理专业知识

B: 扎实的药学专业知识

C: 扎实的外语专业知识

D: 扎实的人文知识

答案: B

85. 适宜于睡前服用的药物是

A: 舒林酸

- B: 西咪替丁
- C: 氢化可的松
- D: 沙丁胺醇

答案：D

86. 转复并维持窦性心律

- A: 华法林
- B: 多非利特
- C: 血凝酶
- D: 硝苯地平

答案：B

87. 小檗碱、盐酸地芬酯、八面体蒙脱石用于细菌性腹泻，应评判为

- A: 联合用药不适宜
- B: 过度治疗用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 无适应证用药

答案：A

88. 属于质子泵抑制剂的是（）

- A: 铝碳酸镁
- B: 埃索美拉唑
- C: 多潘立酮
- D: 法莫替丁

答案：B

89. 易受光线影响而变质的药品是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 阿卡波糖片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/637132045050010024>