

2024 湖南省荷塘区《执业药师之西药学专业二》考试完整题库及答案【名师系列】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 双氢青蒿素
- C: 蒿甲醚
- D: 奎宁

答案：B

2. 轻度阻滞 Na^+ 通道的药物是

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 普萘洛尔
- D: 普鲁卡因胺

答案：A

3. （2017 年真题）眼部病毒感染宜选用（ ）

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 碘苷滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：B

4. 使用痤疮治疗药物不会出现

- A: 眼周局部刺激
- B: 皮肤色素沉着
- C: 红斑
- D: 肝脏氨基转移酶 AST 降低

答案：D

5. 变异型心绞痛宜选用

- A: 维拉帕米
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 地尔硫

答案：B

6. 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂的是

- A: 吉西他滨
- B: 巯嘌呤
- C: 甲氨蝶呤
- D: 长春瑞滨

答案：B

7. 属于抗菌增效剂的是

- A: 甲氧苄啶
- B: 氧氟沙星
- C: 呋喃唑酮
- D: 磺胺嘧啶

答案：A

8. 可用于治疗精神分裂症的是

- A: 氯丙嗪
- B: 卡马西平
- C: 地西泮
- D: 硫酸镁

答案：A

9. 仅用于肠道感染的药物是()

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 磺胺米隆
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺嘧啶

答案：C

10. 患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

- A: 不会导致锥体外系反应
- B: 不会导致催乳素增多
- C: 不会导致Q-T间期延长及室性心律失常
- D: 不会促进乙酰胆碱的释放

答案：D

11. 属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 他莫昔芬
- B: 氟他胺

C: 炔雌醇

D: 阿那曲唑

答案: D

12. 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是 ()

A: 吡嗪酰胺

B: 链霉素

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案: B

13. 存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 表柔比星

B: 多西他赛

C: 卡莫司汀

D: 泼尼松

答案: A

14. 关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述, 不正确的是

A: 临床用于各型糖尿病

B: 易导致低血糖

C: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者

D: 口服吸收很少

答案: B

15. 长期大量使用可导致肝功能异常

A: 更昔洛韦

B: 氯霉素

C: 四环素可的松

D: 利巴韦林

答案: D

16. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

A: 血钠

B: 血钾

C: 血氯

D: 血钙

答案: B

17. 属于 DNA 多聚酶抑制剂的是

A: 长春瑞滨

B: 甲氨蝶呤

C: 巯嘌呤

D: 吉西他滨

答案: D

18. 肾上腺皮质功能不全采用

A: 抗结核病药与糖皮质激素合用

B: 糖皮质激素小剂量代替疗法

C: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案: B

19. 属于水杨酸类解热镇痛药的是

A: 布洛芬

B: 阿糖腺苷

C: 阿司匹林

D: 对氨基水杨酸钠

答案：C

20. 关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

A: 主要用于治疗急性白血病

B: 强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸

C: 是二氢叶酸还原酶抑制剂

D: 是二氢叶酸合成酶抑制剂

答案：D

21. 属于容积性泻药的是()

A: 番泻叶

B: 利那洛肽

C: 多库酯钠

D: 欧车前

答案：D

22. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

A: 乳果糖

B: 液状石蜡

C: 硫酸镁

D: 酚酞

答案：A

23. 长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

A: 普罗帕酮

B: 利多卡因

C: 胺碘酮

D: 索他洛尔

答案: C

24. 用于呼吸道合胞病毒引起的肺炎与支气管炎治疗的抗病毒药物是

A: 碘苷

B: 阿昔洛韦

C: 金刚烷胺

D: 利巴韦林

答案: D

25. 睾酮治疗原发性和继发性男性性功能低下最有效的给药方法是

A: 注射给药

B: 口服给药

C: 透皮给药

D: 肠道外给药

答案: A

26. 关于维生素的使用，正确的是

A: 长期服用维生素 C 应随访监测暗适应试验

B: 大量应用维生素 E 可致血清胆固醇及三酰甘油降低

C: 维生素 C 以空腹服用为宜

D: 肌肉注射维生素 B₁ 需做皮肤敏感试验，静脉注射不需要

答案: C

27. (2020 年真题) 替罗非班的作用机制是

A: 拮抗维生素 K

B: 抑制凝血因子 X

C: 抑制凝血酶

D: 阻断血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体

答案：D

28. 磺酰脲类降糖药的药理作用是

A: 抑制胰岛素降解

B: 加速胰岛素合成

C: 提高胰岛 B 细胞功能

D: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素

答案：D

29. 不属于抗代谢抗肿瘤药的是

A: 甲氨蝶呤

B: 阿糖胞苷

C: 环磷酰胺

D: 氟尿嘧啶

答案：C

30. 患者，女，十二指肠溃疡，幽门螺杆菌(+)，可选用

A: 苄星青霉素

B: 阿莫西林

C: 双氯西林

D: 万古霉素

答案：B

31. 作用机制是抗代谢的是

A: 吉非替尼

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 紫杉醇

D: 巯嘌呤

答案: D

32. 能减弱双香豆素类抗凝血作用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 甲苯磺丁脲

C: 广谱抗生素

D: 阿司匹林

答案: A

33. 伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

A: 氨苯蝶啶

B: 阿米洛利

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案: D

34. 临床上常用于溶解耵聍的药物是

A: 5%碳酸氢钠

B: 3%过氧化氢

C: 1%新霉素

D: 4%硼酸甘油

答案: A

35. 属于第三代头孢菌素的药物是()。

A: 头孢拉定

B: 头孢哌酮

C: 头孢吡肟

D: 头孢氨苄

答案：B

36. 目前疗效最为肯定的一种保护肝细胞结构和功能的药物是

A: 联苯双酯

B: 复方甘草甜素

C: 硫普罗宁

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：D

37. 是 β -内酰胺酶抑制剂，常与青霉素组成复方制剂的是()

A: 他唑巴坦

B: 氨曲南

C: 美罗培南

D: 克拉维酸

答案：D

38. 下述不属于水溶性维生素的是

A: 维生素

B: 维生素 C

C: 维生素 B

D: 维生素 B

答案：A

39. 属于 P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

A: 地高辛

B: 利福平

C: 烟酸

D: 红霉素

答案: A

40. 利奈唑胺最常见的不良反应是

A: 血小板减少

B: 黄疸

C: 腹部不适

D: 静脉炎

答案: A

41. 与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 右雷佐生

C: 柔红霉素

D: 阿糖胞苷

答案: C

42. 使血小板内环磷酸腺苷(cAMP)增多的抗血小板药物是

A: 替格瑞洛

B: 替罗非班

C: 阿司匹林

D: 双嘧达莫

答案: D

43. 在应用螺内酯后应用哪种氨基酸可出现严重并可致命的高钾血症

A: 苯丙氨酸

B: 色氨酸

C: 谷氨酸

D: 精氨酸

答案：D

44. 可用于治疗肝性脑病的药物是

A: 多库酯钠

B: 欧车前

C: 番泻叶

D: 利那洛肽

答案：D

45. (2018 年真题) 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法，错误的是 ()

A: 甲硝唑有致突变和致畸作用

B: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物

C: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深

D: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短

答案：B

46. 下列关于药物与抗痛风药的相互作用，错误的是

A: 丙磺舒可促进肾小管对吡罗美辛的排出，使其血浆药物浓度降低而疗效减弱

B: 别嘌醇与双香豆素同用时，抗凝血药的效应可加强

C: 别嘌醇与呋塞米同用可降低其控制痛风和高尿酸血症的效力

D: 秋水仙碱可降低口服抗凝血药、抗高血压药的作用

答案：A

47. 属于胃黏膜保护剂的是()

- A: 胶体果胶铋
- B: 胃蛋白酶
- C: 莫沙必利
- D: 奥美拉唑

答案: A

48. 适用于肠道菌群失调引起腹泻的药物是

- A: 乳酶生
- B: 双歧三联活菌胶囊
- C: 乳酸菌
- D: 酪酸菌

答案: B

49. 氨茶碱的主要平喘机制为()

- A: 抑制磷酸二酯酶
- B: 抑制腺苷酸环化酶
- C: 直接舒张支气管
- D: 激活鸟苷酸环化酶

答案: A

50. (2016 年真题) 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 阿瑞吡坦
- C: 维生素 B6
- D: 托烷司琼

答案: B

51. 氨茶碱的主要平喘机制为

- A: 抑制腺苷酸环化酶
- B: 激活鸟苷酸环化酶
- C: 直接舒张支气管
- D: 松弛气道平滑肌

答案：D

52. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂
- B: 钙剂
- C: 维生素 D
- D: 铁剂

答案：B

53. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 阿替普酶
- B: 尿激酶
- C: 链激酶
- D: 瑞替普酶

答案：C

54. 既可用于男性性功能减退，又可用于女性绝经后晚期乳腺癌治疗的药物是

- A: 西地那非
- B: 坦洛新
- C: 特拉唑嗪

D: 十一酸睾酮

答案: D

55. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

A: 羟喜树碱

B: 甲氨蝶呤

C: 来曲唑

D: 卡莫氟

答案: D

56. 长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

A: 乙胺丁醇

B: 链霉素

C: 利福平

D: 异烟肼

答案: A

57. 属于疾病特异型肠内营养药的是

A: 视黄酸

B: TPF-D

C: TP

D: 视黄醇

答案: B

58. 阿斯综合征患者禁用

A: 卡马西平

B: 氨己烯酸

C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

答案: D

59. 奥美拉唑主要用于治疗

A: 胃溃疡

B: 消化不良

C: 慢性便秘

D: 恶心、呕吐

答案: A

60. 可用于治疗伤寒的药物是

A: 氟喹诺酮类

B: 青霉素类

C: 四环素类

D: 氨基糖苷类

答案: A

61. 可导致新生儿药物性黄疸的是

A: 林可霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 阿莫西林

D: 头孢他啶

答案: B

62. 可导致坏死性结肠炎的是

A: 甲氨蝶呤

B: 阿糖胞苷

C: β 受体阻断剂

D: 利福平

答案: B

63. 对于吗啡药动学特点的表述，错误的是

A: 皮下注射吸收快

B: 可通过胎盘屏障

C: 大部分经肝脏代谢、经肾排泄

D: 口服不易吸收

答案: D

64. 关于钙制剂临床应用中的注意事项描述，错误的是()

A: 钙在体内的吸收随着钙的摄入量增加而增加

B: 钙制剂与肾上腺皮质激素、异烟肼、四环素或含铝抗酸药不宜同时服用

C: 补钙应选用含钙量高、生物利用度好、溶出度高的制剂

D: 同时补充维生素 D

答案: A

65. 缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

A: 铁剂

B: 维生素 C

C: 叶酸

D: 维生素 B12

答案: A

66. 对军团菌有效的药物是

A: 两性霉素 B

B: 甲硝唑

C: 链霉素

D: 阿奇霉素

答案: D

67. 氨基糖苷类的作用特点是

A: 日剂量一次给药可达到满意杀菌效果

B: 口服给药可治疗全身性感染

C: 只对繁殖期细菌有杀菌作用

D: 在酸性环境中抗菌作用增强

答案: A

68. 高血压伴消化性溃疡患者慎用的药物是

A: 利血平

B: 哌唑嗪

C: 卡托普利

D: 普萘洛尔

答案: A

69. 临床上最常用的强心苷类正性肌力药是()

A: 米力农

B: 地高辛

C: 依那普利

D: 多巴酚丁胺

答案: B

70. 起效缓慢,可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是
()

A: 瑞格列奈

B: 艾塞那肽

C: 罗格列酮

D: 利拉鲁肽

答案: C

71. 可引起锥体外系反应的药物是

A: 甲氧氯普胺

B: 雷尼替丁

C: 甘草酸二铵

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案: A

72. 属于免疫调节型氨基酸注射液的是()

A: 赖氨酸注射液

B: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

C: 复方氨基酸注射液(18AA)

D: 复方氨基酸注射液(20AA)

答案: B

73. 甲状腺功能亢进症的内科治疗宜选用()

A: 小剂量碘剂

B: 甲状腺素

C: 甲巯咪唑

D: 吡格列酮

答案: C

74. 大环内酯类抗生素()

A: 万古霉素

B: 克拉霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案：A

75. 青霉素类用药后发生过敏性休克，属于

A: IV型变态反应

B: II型变态反应

C: III型变态反应

D: I型变态反应

答案：D

76. 头孢曲松()

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

C: 肾毒性较大

D: 用于非典型致病原感染

答案：A

77. 对红霉素的描述，下列不正确的是()

A: 具有肝脏毒性

B: 抗菌谱与青霉素相似但略广

C: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

D: 属繁殖期杀菌剂

答案：D

78. 硝酸酯类药发挥抗心绞痛作用时，体内参与的物质不包括

A: β 受体

B: cGMA 依赖性蛋白激酶

C: 谷胱甘肽转移酶

D: 钙离子

答案：A

79. 可使后者疗效显著下降的是

A: 红霉素

B: 氯丙嗪

C: 维生素 C

D: 他莫昔芬

答案：C

80. 主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A: 塞来昔布

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 吲哚美辛

答案：B

81. 分泌糖皮质激素的是

A: 束状带和网织带

B: 束状带

C: 网状带

D: 球状带

答案：B

82. (2015 年真题) 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及抗记忆障碍主要是 ()。

- A: 多奈哌齐
- B: 胞磷胆碱
- C: 利斯的明
- D: 吡拉西坦

答案：D

83. 属于超长效胰岛素/胰岛素类似物的是

- A: 门冬胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：C

84. 强心苷的作用机制不包括()

- A: 使细胞内的 Ca
- B: 抑制 Na
- C: 使细胞内的 Na
- D: 使细胞内的 Na

答案：D

85. 抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

- A: 多柔比星
- B: 环磷酰胺
- C: 长春新碱
- D: 博来霉素

答案：B

86. (2015 年真题) 属于血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是 ()。

- A: 氯吡格雷
- B: 奥扎格雷
- C: 阿司匹林
- D: 替罗非班

答案: D

87. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

- A: 噻氯匹定
- B: 尿激酶
- C: 华法林
- D: 肝素

答案: C

88. 作用于微管的抗肿瘤药物是

- A: 紫杉醇
- B: 顺铂
- C: 依托泊苷
- D: 来曲唑

答案: A

89. 索他洛尔最严重的不良反应是

- A: 头晕
- B: 心动过缓
- C: 呼吸困难
- D: 尖端扭转型室速

答案: D

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/638063114042007022>