专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年福建省明溪县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题内部题库【模拟题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.用于糖尿病患者可出现低血糖或高血糖的药物是

A：头孢菌素类

B：培高利特

C：氟西汀

D：加替沙星

答案：D

2.已知1%(g/ml)枸橼酸钠溶液的冰点降低值为0.185℃，计算其等渗溶液的浓度是

A：2.8(%g/ml)

B：2.4(%g/ml)

C：3.0(%g/ml)

D：2.6(%g/ml)

答案：A

3.（2017年真题）患者男,65岁,身高170cm,体重60kg,经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测（肌酐清除率45ml/min）,诊断为2型糖尿病、肾功能不全,该患者应首选的药物是

A：格列吡嗪

B：格列齐特

C：格列本脲

D: 格列喹酮

答案：D

4.口服避孕药所致的心肌梗死，在吸烟妇女中发生的危险性加大，说明药源性疾病的患者因素是

A: 药物的使用

B: 生理因素

C: 药物制剂因素

D: 不良生活方式

答案：D

5.对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

A: 苯溴马隆

B: 别嘌醇

C: 秋水仙碱

D: 泼尼松

答案：A

6.患者，男，58岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A: Hb

B: BUN

C: ALT

D: RBC

答案：C

7.氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

A: 胃肠道反应

B: 神经系统疾病

C: 肌病

D: 血液系统疾病

答案：B

8.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A: 部分确认的信号

B: 驳倒的信号

C: 确认的信号

D: 尚不确定的信号

答案：D

9.能早期发现患者用药伤害、尽快地采取干预措施的方法是

A: 岗位工作问责

B: 病历审查

C: 计算机检测方法

D: 直接观察

答案：C

10.可提示完全梗阻性黄疸的是

A: 34.2μmol/L～171μmol/L

B: 17.1μmol/L～34.2μmol/L

C: >342μmol/L

D: 17.1μmol/L～171μmol/L

答案：C

11.治疗急迫性尿失禁的首选药物是

A: α1阻断剂
B: 选择性α1激动剂
C: 5α还原酶抑制剂
D: 抗胆碱药物
答案：D

12.吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是
A: 胰岛素
B: 呋塞米
C: 西咪替丁
D: 氯丙嗪
答案：B

13.（2015年真题）饮茶可减少其吸收的药物是（）。
A: 阿莫西林
B: 阿仑膦酸钠
C: 去氮加压素
D: 硫酸亚铁
答案：D

14.普萘洛尔联用硝苯地平抗高血压的机制是
A: 拮抗作用
B: 敏感化作用
C: 协同作用
D: 减少不良反应
答案：D

15.写明稀释比例和使用时间，是指

A: 医嘱完整不漏项

B: 修订医嘱及时沟通

C: 实现个体化治疗

D: 医嘱清楚准确

答案：A

16.饮食对粪外观的影响,肉食

A: 黑褐色

B: 酱色

C: 暗绿色

D: 红色

答案：A

17.男性，72岁。高血压病3年，血压165/95mmHg，伴2型糖尿病。首选降压药物是

A: 心痛定

B: β-受体阻滞剂

C: 利尿剂

D: ACEI类

答案：D

18.用10%的氯化钠注射液和注射用水配制3%的氯化钠注射液100ml,所需的10%氯化钠注射液的毫升数是()

A: 30

B: 10

C: 25

D: 33.3

答案：A

19.下列属于合理处方的是

A：患者，男，35岁，行皮下脂肪瘤切除术（Ⅰ类手术切口），开具头孢哌酮-舒巴坦预防感染

B：患者，女，75岁，身高155cm，体重77kg，高脂血症病史10年，因胃癌术后难以进食，给予脂肪乳静脉营养补液，给药期间密切关注血三酰甘油水平

C：患者，男，72岁，患有活动性胃溃疡，因心肌梗死给予阿司匹林肠溶片

D：患者，女，40岁，咳嗽数日，经实验室检查示白细胞和C-反应蛋白均正常，开具阿奇霉素治疗

答案：B

20.铁剂联用维生素C，可增加疗效的机制是（）

A：协同作用

B：作用于不同的靶点

C：延缓或降低抗药性

D：促进机体的吸收利用

答案：D

21.患者通过电话、网络或信件询问是

A：主动方式

B：被动方式

C：指令方式

D：质问方式

答案：B

22.肠外营养1g氮能提供的热量是

A: 9kcal

B: 3kcal

C: 4kcal

D: 7kcal

答案：C

23.属于广谱抗病毒药，具有抗病毒、调节免疫和抗增生作用的是

A: 更昔洛韦

B: 干扰素

C: 氟胞嘧啶

D: 奥司他韦

答案：B

24.下列药源性疾病中，其诱因主要是“基础疾病因素”的是

A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

C: 新生儿体内蓄积氯霉素呈现灰婴综合征

D: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

答案：B

25.慎用奥美拉唑的原因是

A: 引起嗜睡

B: 致使定向力障碍

C: 致使视力模糊

D: 引起多尿或多汗

答案：A

26.清晨尿液酸碱度的参考范围为

A: pH4.5～6.5

B: pH4.5～8.0

C: pH4.5～5.5

D: pH5.5～6.5

答案：D

27.高效选择性5-HT4受体激动剂，心律失常的副作用罕见的是

A: 西沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案：D

28.药品临床评价具有"公正性和科学性"是基于

A: 应用医药学理论和实践的前沿知识

B: 在多学科新进展的基础上进行

C: 药品临床评价重在实践

D: 药品临床评价采用多中心、大样本、随机、双盲、对照的方法，经数理统计得出结论

答案：D

29.急性乙醇中毒的分期大致可分为()。

A: 兴奋期和昏睡期

B: 共济失调期和昏睡期

C: 兴奋期和共济失调期

D: 兴奋期、共济失调期和昏睡期

答案：D

30.放射性碘的不良反应是

A：甲状腺功能低下

B：中枢抑制

C：粒细胞缺乏

D：甲状腺功能亢进

答案：A

31.严重不良反应为胃肠道穿孔和瘘形成，发生胃肠道穿孔的患者永久停用的靶向药是

A：帕博利珠单抗

B：利妥昔单抗

C：贝伐珠单抗

D：曲妥珠单抗

答案：C

32.（2018年真题）患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下：

A：阿司匹林泡腾片

B：左氧氟沙星片

C：氨溴索片

D：维生素C片

答案：A

33.中成药血脂康中含有的化学药物成分是

A：依折麦布

B：阿托伐他汀钙

C：辛伐他汀

D：洛伐他汀

答案：D

34.正规胰岛素的作用峰时为()。

A：0.6～1.5小时

B：6～12小时

C：1.5～4小时

D：0.25～0.5小时

答案：D

35.第一类精神药品处方印刷用纸的颜色是

A：淡黄色

B：淡绿色

C：淡橙色

D：淡红色

答案：D

36.据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达80%左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

A：布洛芬

B：对乙酰氨基酚

C：吲哚美辛

D：阿司匹林

答案：B

37.接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是

A：乙型肝炎病毒表面抗体

B：乙型肝炎病毒e抗原

C：乙型肝炎病毒表面抗原

D: 乙型肝炎病毒e抗体

答案：A

38.药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}世界卫生组织的网址是

A: www.cm

B: org.cn

C: www.cp

D: org.cn

答案：C

39.细菌感染患者可出现

A: 中性粒细胞增多

B: 红细胞/血红蛋白减少

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血小板增多

答案：A

40.患者,男,58岁,体重68kg,高血压病史5年。5天前出现咳嗽、咳痰，伴发热,入院查体BP：120/80mmHg,T38.9℃。化验结果:白细胞计数14.6×109L,中性粒细胞百分比86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A: 氨苄西林

B: 莫西沙星

C: 阿莫西林

D: 头孢吡肟

答案：B

41.对于暴发性疼痛频繁、存在吞咽困难或胃肠道功能障碍、临终患者的镇痛，可以采用患者自控镇痛泵技术输入
A：丁溴东莨菪碱片
B：芬太尼注射剂
C：加巴喷丁
D：布洛芬混悬液
答案：B

42.服用磺胺甲噁唑时
A：禁吸烟
B：宜少饮水
C：宜多饮水
D：忌用热水送服
答案：C

43.患者,男,46岁,拟行肠道手术,术前1天使用导泻药的方法是()
A：50%硫酸镁溶液口服
B：5%氯化钙注射液静脉滴注
C：50%葡萄糖注射液湿敷
D：25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
答案：A

44.引起药源性肾病的药物,新霉素具有
A：肾间质纤维化
B：直接肾毒性
C：前列腺素合成障碍
D：肾小管阻塞
答案：B

45.某患者，男，25岁，苯二氮

A: 亚甲蓝

B: 硫酸钠

C: 间羟胺

D: 氟马西尼

答案：D

46.可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

A: 普通胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 预混胰岛素

D: 甘精胰岛素

答案：A

47.不能解除病因，不宜长期服用的；但对慢性钝痛如牙痛、头痛、关节痛等有较好的镇痛效果饿药物是

A: 谷维素

B: 阿司匹林

C: 地西泮

D: 罗通定

答案：B

48.拓扑异构酶抑制剂

A: 顺铂

B: 依托泊苷

C: 放线菌

D: 培美曲塞

答案：B

49.醛固酮受体拮抗剂

A：阿利吉仑

B：阿米洛利

C：依普利酮

D：雷米普利

答案：C

50.属于药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径的是

A：治疗药物监测

B：药物信息服务

C：参与健康教育

D：处方调剂

答案：A

51.再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

A：血红蛋白生成减少

B：红细胞生成过多

C：红细胞丢失过多

D：红细胞生成减少

答案：D

52.(处方容易混淆的常用外文缩写的识别)左眼

A：O

B：DOL

C：LD

D：NS

答案：B

53.验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: Ⅱ期临床试验

B: 临床预试验

C: Ⅲ期临床试验

D: Ⅰ期临床试验

答案：C

54.对于缺乏维生素D人群，应初始高剂量补充维生素D2或D3，待血清25-OH-维生素D3水平达到一定值后，继而给予维持剂量。给予维持剂量的临床指标是血清25-OH-维生素D3水平达到

A: 3μg/L（7.5nmol/L）以上

B: 90μg/L（225nmol/L）以上

C: 10μg/L（25nmol/L）以上

D: 30μg/L（75nmol/L）以上

答案：D

55.对目标适应证患者治疗作用的初步评价是指

A: 临床预试验

B: I1期临床试验

C: Ⅰ期临床试验

D: Ⅲ期临床试验

答案：B

56.一处方中，开具“黄体酮用于排出输尿管结石”，应评判为

A: 无正当理由超适应证用药

B: 有禁忌证用药

C：联合用药不适宜

D：过度治疗用药

答案：A

57.患者，女，29岁，孕25+6周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为Hb71g／L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

A：先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量

B：先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1小时后继续静脉注射余下剂量

C：口服，每次5ml，一日3次

D：快速静脉注射

答案：B

58.（2021年真题）患者，男，58岁,有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊,开具药品如下:

A：阿司匹林属于冠心病-级预防，长期使用方可获益

B：阿可匹林用药期间，需定期监测INR

C：阿司匹林肠溶片在进餐时服用，以减轻对胃肠道的刺激性

D：用药期间，应关注腹痛、柏油样便或呕血等消化道出血症状

答案：D

59.治疗需用10%葡萄糖注射液1000ml，现仅有50%和5%浓度的葡萄糖注射液，分别取50%和5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

A：500ml，500ml

B：200ml，800ml

C: 111ml，889ml

D: 889ml，111ml

答案：C

60.男性高血压患者应

A: 慎用甲基多巴

B: 联用他汀类

C: 停用ACEI或减量

D: 给予硫酸亚铁

答案：A

61.关于皮肤病外用剂型的选择，错误的说法

A: 急性期局部有红肿、水疱、糜烂时，多选用糊剂和乳膏剂

B: 慢性期皮损增厚，呈苔藓样变时，多用软膏剂和乳膏剂

C: 有渗液者，先用溶液剂湿敷，后用油剂

D: 皮损处于亚急性期时，可酌情选用糊剂、粉剂和洗剂

答案：A

62.轻度药品不良反应是指

A: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

B: 没有临床症状，无须治疗

C: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

D: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

答案：D

63.将0．5g氨茶碱注射液加入到5%葡萄糖注射液250ml中。临床要求给药速度是60mg／h，输注速度应是

A: 20ml／h

B: 60ml / h

C: 30ml / h

D: 10ml / h

答案：C

64.慎用雷尼替丁的原因是

A: 引起多尿或多汗

B: 致使视力模糊

C: 引起嗜睡

D: 致使定向力障碍

答案：D

65.（2019年真题）患者，女，62岁，2型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是

A: 吡格列酮

B: 格列齐特

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案：A

66.根除幽门螺杆菌治疗的首选抗菌药是

A: 左氧氟沙星

B: 四环素

C: 呋喃唑酮

D: 阿莫西林

答案：D

67.（2018年真题）患者,女,25岁,产后2个月,哺乳期,因尿路感染需要给予抗感染治疗,首选的药物是（）

A: 阿米卡星

B: 左氧氟沙星

C: 多西环素

D: 头孢呋辛

答案：D

68.告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

A: 新药信息

B: 禁忌证

C: 药物相互作用

D: 药品不良反应

答案：D

69.使用片、粒、袋、支等清晰易懂的计数单位，是针对

A: 交代用药注意事项

B: 交代用药途径及用药方法

C: 交代药物的用量

D: 交代药品贮存条件与方法

答案：C

70.用于胆石症的非手术治疗,属于钙通道阻滞剂,不可掰开嚼碎,避免卧位服用的药物是()

A: 匹维溴铵片

B: 熊去氧胆酸片

C: 鹅去氧胆酸片

D: 山莨菪碱片

答案：A

71.下列药物中，解救硫喷妥钠中毒的特效药是

A：硫酸铜

B：碳酸氢钠

C：丙烯吗啡

D：硫酸镁

答案：B

72.COPD气流受限严重程度分级的方法是

A：FEV1占预计值%

B：CTP分级

C：CHA，DS，-VASe评分

D：HAS-BLED评分

答案：A

73.两种药物配伍之后效价降低的是()

A：头孢曲松与复方氯化钠注射液

B：胰岛素与0.9%氯化钠注射液

C：青霉素与5%葡萄糖注射液

D：头孢唑林钠与0.9%氯化钠注射液

答案：C

74.含有解热镇痛药的抗感冒药应慎用或禁用于

A：疲劳和生活规律紊乱者

B：妊娠初期及哺乳期妇女

C：患有心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、青光眼、前列腺增生的患者

D: 有血小板减少症、有出血倾向者、上消化道出血和(或)穿孔病史者

答案：D

75.药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 没有临床症状，无需治疗

B: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

C: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

D: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

答案：C

76.在患者入院、转科和出院时,药师通过核对新开的医嘱和已有的医瞩,核对患者目前的整体用药情况,避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等,以保证患者用药安全的药学服务过程,属于（）

A: 药物重整

B: 药物利用评价

C: 药学干预

D: 处方审核

答案：A

77.评估房颤患者血栓栓塞风险的方法是

A: FEV1占预计值%

B: HAS-BLED评分

C: CHA，DS，-VASe评分

D: CTP分级

答案：C

78.能减弱华法林的抗凝作用的食物是

A：地瓜

B：维生素K

C：韭菜

D：芒果

答案：C

79.贮存温度在2℃以上时，温度越低．对多数药品保管越有利。降钙素鼻喷雾剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

A：温度不超过20℃

B：温度在2℃～10℃之间

C：避光.温度不超过-5℃

D：温度在10℃～30℃之间

答案：B

80.下列药品宜冷处贮藏但不应冷冻的是：

A：氯化钠注射液

B：甘露醇注射剂

C：双歧三联活菌制剂

D：卡前列甲酯栓剂

答案：C

81.据统计，全国高血压患者已经超过2亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

A：哌唑嗪口服

B：硝苯地平口服

C：硝普钠静滴

D：卡托普利口服

答案：C

82.女性，32岁，3年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×10

A：钙剂可促进铁剂吸收

B：尽量空腹服用亚铁盐，以促进吸收

C：正常人维持体内铁平衡需要每天从食物摄铁2～2.5mg

D：碳酸氢钠抑制铁剂吸收

答案：D

83.可导致性功能减退、皮疹、乳腺增大的药物是

A：非那雄胺

B：奥昔布宁

C：坦索罗辛

D：多沙唑嗪

答案：A

84.对从事药学服务的药师而言，必须具备的专业知识能力要求是

A：扎实的管理专业知识

B：扎实的药学专业知识

C：扎实的外语专业知识

D：扎实的人文知识

答案：B

85.适宜于睡前服用的药物是

A：舒林酸

B：西咪替丁
C：氢化可的松
D：沙丁胺醇
答案：D

86.转复并维持窦性心律
A：华法林
B：多非利特
C：血凝酶
D：硝苯地平
答案：B

87.小檗碱、盐酸地芬酯、八面体蒙脱石用于细菌性腹泻，应评判为
A：联合用药不适宜
B：过度治疗用药
C：有禁忌证用药
D：无适应证用药
答案：A

88.属于质子泵抑制剂的是（）
A：铝碳酸镁
B：埃索美拉唑
C：多潘立酮
D：法莫替丁
答案：B

89.易受光线影响而变质的药品是

A：阿卡波糖片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/638110044043007022