

2023-2024 年山西省新荣区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库 附答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 已知 1%(g/ml) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是

- A: 2.4(%g/ml)
- B: 2.6(%g/ml)
- C: 3.0(%g/ml)
- D: 2.8(%g/ml)

答案：D

2. 代谢性或呼吸性碱中毒

- A: 尿酸碱度增高
- B: 尿酸碱度降低
- C: 尿胆红素检测阳性
- D: 尿蛋白检测阳性

答案：A

3. 属于苯二氮革类药物的是

- A: 艾司唑仑
- B: 舍曲林
- C: 阿米替林
- D: 丁螺环酮

答案：A

4. 欲调配 10%葡萄糖注射液 1000ml，应该分取 5%葡萄糖注射液与 50%葡萄糖注射液的用量是（可用十字交叉法计算）

A: 895ml,105ml

B: 888ml,112ml

C: 885ml,115ml

D: 890ml,110ml

答案：D

5. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

A: 餐后服用

B: 餐前服用

C: 清晨服用

D: 餐中服用

答案：D

6. 患者，男，60 岁，因“坏死性胰腺炎”行剖腹探查术后 2 年，进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

A: 复方阿嗪米特肠溶片

B: 奥美拉唑肠溶胶囊

C: 干酵母片

D: 蒙脱石散

答案：A

7. 泡腾片的注意事项是

A: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息

B: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

C: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的

D: 用后应漱口

答案：A

8. 关于帕金森病患者的用药指导，错误的是

A: 金刚烷胺剂量为 50~100mg，2~3 次/日，末次应在下午 4 时前服用

B: 对于认知功能减退或因特殊工作之需，力求显著改善运动症状，可选用复方左旋多巴作为治疗首选药

C: 苯海索不宜与单胺氧化酶抑制剂同时服用

D: 老年患者尽量选用苯海索，除非震颤严重影响生活质量

答案：D

9. 治疗急迫性尿失禁的首选药物是

A: α_1 阻断剂

B: 抗胆碱药物

C: 5α 还原酶抑制剂

D: 选择性 α_1 激动剂

答案：B

10. 抗高血压的药是()。

A: 卡托普利

B: 二甲双胍

C: 法莫替丁

D: 多粘菌素

答案：A

11. 对该患者进行初始经验性抗感染治疗,宜选用的药物是 ()

- A: 左氧氧沙星+阿奇霉素
- B: 阿莫西林克拉维酸钾+阿奇霉素
- C: 多西环素
- D: 阿奇霉素

答案：B

12. 不属于常用缓泻药的作用机制的是

- A: 膨胀性
- B: 润滑性
- C: 润湿性
- D: 容积性

答案：C

13. 上市前临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

- A: 病例数目少
- B: 观察时间短
- C: 考察不全面
- D: 管理漏洞

答案：C

14. 可引起 A/G 比值 <1 的是

- A: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害
- B: 摄入不足、消化不良时
- C: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

D: 各种原因脱水所致的血液浓缩

答案：A

15. 不易产生耐受性，对 CYP2C19 快代谢的胃食管反流病人群，推荐长期维持治疗的抑酸剂是

A: 伊托必利

B: 法莫替丁

C: 奥美拉唑

D: 泮托拉唑

答案：D

16. 抗凝治疗

A: 阿司匹林

B: 低分子肝素

C: 阿替普酶

D: 巴曲酶

答案：B

17. 蒽环类药物的主要毒副作用是（）

A: 出血性膀胱炎

B: 心脏毒性

C: 溶血性尿毒症

D: 肺纤维化

答案：B

18. 下列口服降糖药中，最适宜餐后血糖(PBG)高者选用的口服降糖药是

A: 格列吡嗪

- B: 格列本脲
- C: 格列美脲
- D: 格列齐特

答案：A

19. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医
- B: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药
- C: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低
- D: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

答案：B

20. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

- A: 阿替洛尔
- B: 硝普钠
- C: 卡托普利
- D: 西地兰

答案：C

21. 患老年高血压并发心力衰竭，宜选用的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 缬沙坦

C: 氢氯噻嗪

D: 非洛地平

答案: C

22. 老年患者给予静脉滴注治疗药物宜降低输液速度，过快易引起

A: 肺水肿

B: 低血压

C: 胃肠道刺激

D: 高血钾

答案: A

23. 湿疹患者的实验室检查结果常会出现 ()

A: 淋巴细胞减少

B: 淋巴细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 中性粒细胞减少

答案: C

24. 轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

A: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

B: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次 / 分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常 >120 次 / 分，奇脉， PaO_2

C: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

D: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

答案: C

25. 正规胰岛素的作用峰时为()。

- A: 6~12 小时
- B: 0.25~0.5 小时
- C: 1.5~4 小时
- D: 0.6~1.5 小时

答案: B

26. 卡比马唑的维持剂量是一日

- A: 25~80mg
- B: 5~15mg
- C: 15~60mg
- D: 30~60mg

答案: B

27. 不属于处方前记内容的是()。

- A: 患者姓名、性别、年龄
- B: 门诊或住院病历号、日期
- C: 医疗、预防、保健机构名称
- D: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

答案: D

28. 处方的法律性质主要是指()。

- A: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别负有相应的法律责任
- B: 医师具有诊断权和开具处方权和调配处方权
- C: 药师具有审核、调配处方权和开具处方权
- D: 因处方所造成的医疗差错或事故，医师负有法律责任

答案：A

29. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

30. 对由于胃肠、肝胆疾病引起的消化酶不足者可选用

- A: 甲氧氯普胺
- B: 雷尼替丁
- C: 胰酶片
- D: 莫沙必利

答案：C

31. 急性汞中毒出现

- A: 肌肉震颤、抽搐
- B: 恶心、呕吐、视力模糊
- C: 恶心、呕吐、口内有金属味
- D: 腐蚀性口腔炎

答案：D

32. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果要更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停药

- A: 7 天
- B: 10 天
- C: 14 天

D: 5 天

答案：C

33. 不作为根除幽门螺杆菌初次治疗方案的抗菌药是

A: 左氧氟沙星

B: 呋喃唑酮

C: 阿莫西林

D: 四环素

答案：A

34. 抗利尿药

A: 硝酸甘油

B: 甘草合剂

C: 去氨加压素

D: 胃黏膜保护剂

答案：C

35. 以下被评判为“过度治疗用药”的处方用药中，正确的是

A: 盲目而无效果地应用肿瘤辅助治疗药物

B: 滥用糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖

C: 忽略病情和患者的基础疾病

D: 咳嗽、C 反应蛋白正常者给予阿奇霉素

答案：B

36. 肾小管对钠、氨基酸、葡萄糖等再吸收能力强，使用利尿剂等较易出现酸碱失衡，即

A: 药物分布

B: 药物代谢

C: 药物排泄

D: 药物吸收

答案：C

37. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

A: 3%酚甘油滴耳液

B: 2%过氧化氢溶液

C: 2%酚甘油滴耳液

D: 3%过氧化氢溶液

答案：D

38. 患者，女，65 岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A: 首次 0.2-0.3g,必要时 2h 后加服 0.1-0.2g

B: 一日 0.4-0.6g,分 2-3 次；1-2 周后减至一日 0.2-0.4g

C: 一次 0.01-0.03g,一日 3-4 次，根据耐受程度调整剂量

D: 一次 0.25-0.5g,q4h

答案：B

39. 为保证用药安全，一些药物应用前需要实施皮肤敏感试验。一些权威性较高的二次文献中记载的需进行皮肤敏感试验的药品是

A: 青霉素钠注射剂

B: 链霉素注射剂

C: 鱼肝油酸钠注射剂

D: 玻璃酸酶注射剂

答案：D

40. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: 酮替酚
- B: 特布他林气雾剂
- C: 异丙托溴铵气雾剂
- D: 二丙酸倍氯米松气雾剂

答案：D

41. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: B 受体激动剂
- B: 钙通道阻滞剂
- C: B 受体阻断剂
- D: 抗胆碱能药物

答案：C

42. （2017 年真题）用于评估癌痛患者疼痛程度的是（）

- A: APACHE 评分系统
- B: Cochrane 证据分级
- C: 数字评分法
- D: CTP 评分标准

答案：C

43. 在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

- A: 二级信息源

- B: 一级信息源
- C: 三级信息源
- D: 四级信息源

答案：C

44. (2017 年真题) 过敏性皮炎常表现为 ()

- A: 中性粒细胞增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 红细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

45. (2021 年真题) 患者，女，31 岁，1 个月前顺一健康男婴。近 2 周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片 20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是 ()

- A: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善 1 个月后逐渐减量，直至停药
- B: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药
- C: 氟西汀应于每日早餐后服用
- D: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加

答案：A

46. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

- A: 清晨
- B: 餐后
- C: 餐前

D: 餐中

答案: A

47. 癫痫持续状态的好发年龄段是

A: 55 岁以上

B: 65 岁以上

C: 6 岁以内

D: 1 岁以内及 65 岁以上

答案: D

48. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

A: 博来霉素

B: 氟尿嘧啶

C: 白消安

D: 柔红霉素

答案: B

49. 下列药源性疾病中，其诱因主要是"性别因素"的是

A: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

B: 灰婴综合征是氯霉素在新生儿体内蓄积所致

C: 羟化酶缺乏者服用一半剂量的苯妥英钠呈现引起神经毒性

D: 老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应

答案: A

50. 痛风急性发作期应禁用的药物是

A: 别嘌醇

B: 布洛芬

C: 秋水仙碱

D: 碳酸氢钠

答案：A

51. 就乙肝血清免疫学检查而言，判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目结果是

A: HBsAg(+)

B: 抗-HBe(+)

C: 抗-HBs(+)

D: HBeAg(+)

答案：D

52. 口服避孕药中雌激素对机体代谢的影响，正确的为

A: 高密度脂蛋白胆固醇降低

B: 糖耐量异常

C: 低密度脂蛋白胆固醇升高

D: 甘油三酯降低

答案：B

53. 治疗缺铁性贫血给予元素铁

A: 日服 0.05mg

B: 日服 180mg

C: 日服 80mg

D: 日服 30~40mg

答案：B

54. 癫痫的药物治疗适用于各型癫痫的药物

A: 拉莫三嗪

B: 丙戊酸钠

C: 卡马西平

D: 苯妥英钠

答案: B

55. 患者，男 50 岁，血压 170/95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是：

A: 利尿剂+AR

B: 利尿剂+CCB

C: β 受体阻滞剂+ARB

D: A 受体阻滞剂+ACEI

答案: B

56. 融合抑制剂 ()

A: FIs

B: NNRTIs

C: NRTIs

D: PIs

答案: A

57. 已获准可以长期用于治疗失眠的药物为 ()

A: 佐匹克隆

B: 艾司唑仑

C: 雷美尔通

D: 多塞平

答案: C

58. 患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是()

- A: 甲状腺次全切除手术
- B: 碘化钾治疗，定期复查
- C: 选用 ^{131}I 治疗
- D: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗

答案：D

59. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 神经系统疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 肌病
- D: 胃肠道疾病

答案：C

60. (2021 年真题) 患者，男，59 岁，诊断为 2 型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是()

- A: 使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确
- B: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存
- C: 应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果
- D: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用

答案：C

61. 促进肾小管对钠的重吸收，引起高血压的药物是

- A: 重组人促红细胞生成素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 伪麻黄碱

C: 咖啡因

D: 糖皮质激素

答案：D

62. 消化性溃疡的注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充

A: 维生素 E?

B: 维生素 D3?

C: 维生素 B12?

D: 维生素 C?

答案：C

63. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他丁片 40mgpoqd。

A: 氨氯地平片可用于早上服用

B: 阿司匹林肠溶片必须晚上，餐后服用

C: 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎

D: 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用

答案：D

64. 妥布霉素可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 结晶沉积

C: 前列腺素合成障碍

D: 肾小球滤过率下降

答案：D

65. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 主动方式
- B: 教育方式
- C: 指令方式
- D: 协商方式

答案：A

66. 三环类抗抑郁药中毒解救和治疗时，不宜使用的是

- A: 普鲁卡因胺
- B: 吐根糖浆
- C: 高锰酸钾溶液
- D: 毒扁豆碱

答案：D

67. IV级临床研究的结论或II、III级临床研究的推论属于

- A: B 级
- B: D 级
- C: C 级
- D: E 级

答案：C

68. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效M胆碱受体阻断剂是

- A: 孟鲁司特
- B: 噻托溴铵
- C: 异丙托溴铵
- D: 沙美特罗

答案：B

69. 已知 1%(g/mL) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是()。

- A: 2.61(%, g/mL)
- B: 2.81(%, g/mL)
- C: 3.11(%, g/mL)
- D: 2.91(%, g/mL)

答案：B

70. 属于广谱抗病毒药，具有抗病毒、调节免疫和抗增生作用的是

- A: 更昔洛韦
- B: 干扰素
- C: 奥司他韦
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

71. 可引起眩晕或幻觉的药物是

- A: 东莨菪碱
- B: 阿米洛利
- C: 右美沙芬
- D: 氯苯那敏

答案：C

72. (妊娠的危险性分级)在有对照组的早期妊娠妇女中未显示对胎儿有危险(并在中、晚期妊娠中亦无危险的证据)，可能对胎儿的伤害极小

- A: B 级
- B: A 级
- C: D 级
- D: C 级

答案：B

73. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

- A: A 级
- B: X 级
- C: B 级
- D: C 级

答案：C

74. 治疗良性前列腺增生症的药物中，可引起性功能减退的药物为

- A: 坦索罗辛
- B: 特拉唑嗪
- C: 非那雄胺
- D: 奥昔布宁

答案：C

75. 患者，男，56 岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA ≥ 20000 IU/ml。ALT200 U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素 α 和核苷（酸）类抗病毒药物。

- A: 中性粒细胞计数 $\leq 0.75 \times 10^9$ /L，应减量
- B: 中性粒细胞计数 $< 0.5 \times 10^9$ /L，应停药
- C: 血小板计数 $< 100 \times 10^9$ /L，应减量
- D: 出现体温升高、肌肉酸痛可服用对乙酰氨基酚

答案：C

76. 药学服务的重要人群不包括

- A: 合并患有心脏病、高血压、糖尿病的患者
- B: 新生儿患者

C: 流感患者

D: 慢性支气管哮喘患者

答案: C

77. 痛风急性发作期应选用

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 阿司匹林

D: 丙磺舒

答案: B

78. 能早期发现患者伤害、尽快地采取干预措施的是

A: 病历审查

B: 岗位工作问责

C: 计算机检测方法

D: 直接观察

答案: C

79. 患者,女,75岁,近来因家庭变故出现焦虑相关的精神和躯体症状,入睡困难,多梦易惊醒,诊断为焦虑症、核查其用药记录,患者在服用氨氯地平、阿托伐他汀钙。

A: 三环类抗抑郁药

B: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

C: 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂

D: 苯二氮?类药物

答案: D

80. 下列不属于药物警戒工作范畴的是

- A: 发现药物相互作用
- B: 指导制定临床治疗方案
- C: 发现药物不良反应
- D: 药品致死率估计

答案：B

81. 抗菌谱广，属于碳青霉烯类的药物是

- A: 氨曲南
- B: 亚胺培南
- C: 头孢哌酮
- D: 克拉维酸

答案：B

82. 一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是

- A: 低水溶性的药物
- B: 分布容积小的药物
- C: 血浆蛋白结合率高的药物
- D: 分子量大于 500 的药物

答案：B

83. 同时服用，有利于铁吸收的药物是（）

- A: 维生素 A
- B: 维生素 C
- C: 维生素 D
- D: 维生素 B

答案：B

84. 除常规检查外，需要检查有无瘪粒、变形、膨胀等变质现象的制剂是

- A: 软膏剂
- B: 丸剂
- C: 胶囊剂
- D: 注射剂

答案：C

85. 属于苯二氮卓类药物的是

- A: 米氮平
- B: 艾司唑仑
- C: 唑吡坦
- D: 阿戈美拉汀

答案：B

86. 中国药学会医院药学专业委员会推荐的国内药历格式不包括

- A: 正文
- B: 基本情况
- C: 病历摘要
- D: 用药记录

答案：A

87. “1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍”是针对

- A: 半衰期大于 24 小时的药品
- B: 半衰期小于 30 分钟的药品
- C: 半衰期大于 30 小时的药品

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 半衰期 8~24 小时的药品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/638110056062007022>