

## 2024 年广东省梅江区《执业药师之西药学专业二》资格考试王牌题库及参考答案（典型题）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是  
( )

- A: 克拉维酸
- B: 阿莫西林
- C: 亚胺培南
- D: 氨曲南

答案：B

2. （2020 年真题）关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 为了加强疗效，可以一日多次给药
- B: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用
- C: 不宜用于皮肤皱褶部位
- D: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

答案：A

3. 亲脂性较强，易通过血—脑屏障

- A: 巯嘌呤
- B: 环磷酰胺
- C: 氟尿嘧啶
- D: 卡莫司汀

**答案：D**

4. 对钩虫皮下组织的超微结构破坏严重，导致细胞核消失或破坏、线粒体消失，对其肠管中心层线粒体等结构均有破坏，产生驱虫作用的药物是

- A: 氯硝柳胺
- B: 三苯双脒
- C: 伯氨喹
- D: 葡萄糖酸锑钠

**答案：B**

5. 下列哪种疼痛不用吗啡治疗

- A: 急性锐痛
- B: 癌性剧痛
- C: 胆绞痛及肾绞痛
- D: 神经压迫性疼痛

**答案：D**

6. 适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

- A: 瑞格列奈
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 利拉鲁肽
- D: 骨化三醇

**答案：A**

7. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘 9%~12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

- A: 聚维酮碘
- B: 氯己定
- C: 依沙吖啶
- D: 过氧乙酸

**答案：A**

8. （2020 年真题）与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

- A: 柔红霉素
- B: 甲氨蝶呤
- C: 阿糖胞苷
- D: 右雷佐生

**答案：A**

9. 伊立替康的监护要点不包括

- A: 脱发
- B: 迟发性腹泻
- C: 急性胆碱能综合征
- D: 骨髓抑制

**答案：A**

10. （2019 年真题）镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是（）

- A: 癫痫
- B: 低蛋白血症
- C: 糖尿病

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 重症肌无力

答案: D

11. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是()

- A: 利多卡因
- B: 苯妥英钠
- C: 胺碘酮
- D: 地高辛

**答案：A**

12. 选择性抑制 COX-2 的药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 塞来昔布
- C: 布洛芬
- D: 对乙酰氨基酚

**答案：B**

13. (2021 年真题) 血浆消除半衰期相对较长 (14~16min)，可间隔 30min 静脉注射 2 次……药物是 ( )

- A: 重组链激酶
- B: 替奈普酶
- C: 瑞替普酶
- D: 尿激酶

**答案：C**

14. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 定向力障碍
- B: 血糖升高
- C: 低镁血症

D: 血尿酸升高

**答案: C**

15. 对  $\alpha$  受体和  $\beta$  受体均有强大的激动作用的是

A: 多巴胺

B: 肾上腺素

C: 去甲肾上腺素

D: 可乐定

**答案: B**

16. 临床治疗铜绿假单胞菌感染可选用的抗生素是()

A: 哌拉西林

B: 苯唑西林

C: 阿莫西林

D: 氨苄西林

**答案: A**

17. 高钠血症是指

A: 血钠 $>145\text{mmol/L}$

B: 血钠 $>140\text{mmol/L}$

C: 血钠 $>135\text{mmol/L}$

D: 血钠 $>130\text{mmol/L}$

**答案: A**

18. 与 PABA 竞争细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的是

A: 磺胺类

B: 氨基糖苷类

C: 青霉素类

D: 喹诺酮类

**答案: A**

19. 强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

A: 室性期前收缩

B: 二联律

C: 房颤

D: 房性期前收缩

**答案: A**

20. 可使前者作用加强或延长的是

A: 红霉素

B: 他莫昔芬

C: 氯丙嗪

D: 维生素 C

**答案: C**

21. 孟鲁司特的作用机制是

A: 阻断白三烯受体

B: 抑制磷酸二酯酶

C: 阻断 M 受体

D: 阻断  $\alpha$  受体

**答案: A**

22. 次水杨酸铋是

A: 抗分泌药

B: 吸附剂

C: 抗动力药

D: 微生态制剂

**答案: A**

23. (2020 年真题) 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

A: 曲妥珠单抗

B: 环磷酰胺

C: 长春新碱

D: 甲氨蝶呤

**答案: C**

24. 对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是()

A: 抑制 DNA 回旋酶

B: 抑制蛋白质合成

C: 干扰叶酸合成

D: 形成 NAD 的同系物，抑制结核菌生长

**答案: D**

25. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

A: 亚叶酸钙

B: 卡铂

C: 顺铂

D: 奥沙利铂

**答案: C**

26. 对于吗啡药动学特点的表述，错误的是

A: 大部分经肝脏代谢、经肾排泄

- B: 口服不易吸收
- C: 皮下注射吸收快
- D: 可通过胎盘屏障

**答案: B**

27. (2017 年真题) 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是 ( )

- A: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂
- B: 长效  $\beta_2$  受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂
- C: 吸入性糖皮质激素+长效  $\beta_2$  受体激动剂
- D: 吸入性糖皮质激素+短效  $\beta_2$  受体激动剂

**答案: C**

28. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

- A: 阿司匹林
- B: 布桂嗪
- C: 哌替啶
- D: 可待因

**答案: C**

29. 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是 ( )

- A: 甘精胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 地特胰岛素

**答案: C**

30. 蛔虫病和鞭虫病治疗首选

- A: 吡嗪酮
- B: 甲苯咪唑
- C: 三苯双脒
- D: 噻嘧啶

**答案：B**

31. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌症

- A: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者
- B: 肝肾功能不全者
- C: 心力衰竭患者
- D: 有子宫内膜癌症状和体征者

**答案：C**

32. 每 1mg 硫酸鱼精蛋白可中和肝素约

- A: 10U
- B: 1U
- C: 100U
- D: 1000U

**答案：C**

33. 对抗香豆素过量引起出血可选用

- A: 垂体后叶素
- B: 维生素 K1
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素

**答案：B**

34. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

- A: 肝脏损害
- B: 中枢神经系统毒性
- C: 眼部水肿
- D: 白细胞减少

**答案：B**

35. 可能导致牙龈增生的药物是

- A: 依诺肝素
- B: 普伐他汀
- C: 拉西地平
- D: 普萘洛尔

**答案：C**

36. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

- A: 地尔硫?
- B: 依那普利
- C: 比索洛尔
- D: 氨氯地平

**答案：C**

37. 下列不属于治疗前列腺增生的药物是

- A: 坦洛新
- B: 非那雄胺
- C: 西地那非
- D: 特拉唑嗪

**答案：C**

38. 对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是

- A: 头孢西丁
- B: 头孢吡肟
- C: 氨曲南
- D: 拉氧头孢

**答案：C**

39. (2019 年真题) 竞争性抑制胃肠道的  $\alpha$ -葡萄糖苷酶活性减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收，可降低餐后血糖的药物是 ( )

- A: 伏格列波糖
- B: 吡格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 格列吡嗪

**答案：A**

40. 关于氟喹诺酮类药物的说法不正确的是

- A: 口服吸收好，组织药物浓度高
- B: 与其他药物有交叉耐药性
- C: 不良反应少
- D: 抗菌谱广，抗菌力强

**答案：B**

41. 不能用于隐球菌感染的抗真菌药是

- A: 氟康唑
- B: 卡泊芬净
- C: 伊曲康唑
- D: 伏立康唑

**答案：B**

42. 适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

- A: 肼屈嗪
- B: 氢氯噻嗪
- C: 拉贝洛尔
- D: 卡托普利

**答案：D**

43. 高浓度使细胞膜的渗透性增加，钾离子和其他内容物漏出，细胞死亡的是

- A: 特比萘芬
- B: 环吡酮胺
- C: 阿莫罗芬
- D: 制霉菌素

**答案：B**

44. 抗心绞痛的首选联合治疗方案是()

- A: 短效硝酸酯类+螺内酯
- B: 长效硝酸酯类+普萘洛尔
- C: 维拉帕米+氢氯噻嗪
- D: 维拉帕米+普萘洛尔

**答案：B**

45. (2021 年真题) 属于 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 ( )

- A: 吗氯贝胺
- B: 艾司西酞普兰
- C: 马普替林

D: 文拉法辛

**答案: D**

46. 下列哪项不是血管紧张素转化酶抑制药的主要临床应用()

A: 心肌梗死

B: 心律失常

C: 充血性心力衰竭

D: 高血压

**答案: B**

47. 异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

C: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

D: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

**答案: C**

48. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

A: 维生素 K1

B: 达肝素钠

C: 香豆素类

D: 维生素 B12

**答案: B**

49. (2019 年真题) 易产生耐药性，极少单独用药，临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是()

- A: 卡泊芬净
- B: 氟康唑
- C: 特比萘芬
- D: 氟胞嘧啶

**答案：D**

50. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 应用前应询问药物过敏史，对磺胺药过敏者不宜使用
- B: 静脉注射时宜用葡萄糖注射液稀释
- C: 静脉用药剂量为口服的 1 / 2 时即可达到同样疗效
- D: 肠道外用药宜静脉给药，不主张肌肉注射

**答案：B**

51. （2019 年真题）对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是（）

- A: 特拉唑嗪
- B: 坦洛新
- C: 十一酸睾酮
- D: 西地那非

**答案：B**

52. 糖尿病患者低血糖时，可导致患者不适甚至生命危险，也是血糖达标的主要障碍。为了预防低血糖事件的发生，应用胰岛素或促胰岛素分泌剂时，需要注意的事项不包括

- A: 个体化给药，直接给予所需治疗剂量

- B: 谨慎地调整剂量
- C: 患者应定时定量进餐
- D: 有可能误餐时应提前做好准备

**答案：A**

53. 影响骨和牙齿生长的是

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 四环素

**答案：D**

54. 需要 1 周才起效的是

- A: 吗氯贝胺
- B: 吡拉西坦
- C: 文拉法辛
- D: 氟西汀

**答案：C**

55. 有激素样作用，长期服用可导致男性乳房发育、阳痿、女性月经失调的是

- A: 醛固酮
- B: 依他尼酸
- C: 氢氯噻嗪
- D: 乙酰唑胺

**答案：A**

56. 青光眼患者应慎用

- A: 沙美特罗
- B: 噻托溴铵
- C: 沙丁胺醇
- D: 孟鲁司特

**答案：B**

57. 关于链激酶的叙述不正确的是

- A: 链球菌感染可增强其作用
- B: 是  $\beta$  溶血链球菌产生的一种蛋白质
- C: 对各种早期栓塞有溶解作用
- D: 可促使纤溶酶原激活形成纤溶酶

**答案：A**

58. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是

- A: 氨甲苯酸
- B: 维生素 K1
- C: 维生素 B12
- D: 硫酸鱼精蛋白

**答案：B**

59. (2017 年真题) 奎宁或氯喹日剂量超过 1g 或持续长时间应用，可见耳鸣、头疼、视力与听力减退等，停药后即可恢复，临床成为 ( )

- A: 郝氏反应
- B: 双硫仑样反应
- C: 神经毒性反应
- D: 金鸡纳反应

**答案：D**

60. 治疗肺孢子菌病的首选药物是()

- A: 呋喃妥因
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 左氧氟沙星
- D: 氯霉素

**答案：B**

61. 滴眼后可能导致再生障碍性贫血的抗菌药物是

- A: 氯霉素
- B: 左氧氟沙星
- C: 庆大霉素
- D: 妥布霉素

**答案：A**

62. 艾司奥美拉唑的活性形式是

- A: 亚磺酰胺
- B: 奥沙拉嗪
- C: 巴柳氮
- D: 美沙拉嗪

**答案：A**

63. 患者，女，41岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日6~8次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞8~10/HP，红细胞3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2片，口服，3次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2次/日。

- A: 修复消化道黏膜
- B: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动

C: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素

D: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能

**答案：B**

64. 维生素 C 的主要适应证是

A: 防治坏血病

B: 治疗厌食症

C: 治疗脂溢性皮炎

D: 治疗佝偻病

**答案：A**

65. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

A: 氢氯噻嗪

B: 双氯芬酸

C: 特拉唑嗪

D: 美托洛尔

**答案：A**

66. 可用于肝性脑病的治疗的是

A: 赖氨酸

B: 复方氨基酸注射液 (18AA)

C: 精氨酸

D: 复方氨基酸注射液 (3AA)

**答案：C**

67. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

- A: 减少呼吸道腺体分泌
- B: 减少麻醉药的用量
- C: 预防心动过缓
- D: 增强麻醉效果

**答案: A**

68. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效  $\beta$  受体激动剂是

- A: 福莫特罗
- B: 丙卡特罗
- C: 沙丁胺醇
- D: 沙美特罗

**答案: A**

69. 对军团菌有效的药物是

- A: 甲硝唑
- B: 阿奇霉素
- C: 链霉素
- D: 两性霉素 B

**答案: B**

70. 属于硝基咪唑类的是()

- A: 夫西地酸
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 呋喃妥因
- D: 甲硝唑

**答案: D**

71. 对偶发性失眠者可选择()。

- A: 夸西泮
- B: 艾司唑仑
- C: 氟西泮
- D: 唑吡坦

**答案: D**

72. 大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿液呈黄色

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B
- C: 维生素 B
- D: 维生素 B

**答案: D**

73. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 氟维司群
- C: 依西美坦
- D: 来曲唑

**答案: A**

74. 属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 氟他胺
- B: 炔雌醇
- C: 他莫昔芬
- D: 阿那曲唑

**答案: D**

75. (2015 年真题) 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是 ( )。

- A: 伯氯喹
- B: 奎宁
- C: 青蒿素
- D: 氯喹

**答案: C**

76. 可用于骨和关节感染的药物是 ( )

- A: 万古霉素
- B: 林可霉素
- C: 青霉素
- D: 四环素

**答案: B**

77. 具有预防和逆转血管平滑肌增厚及左心室肥厚的抗高血压药物是

- A: 氨氯地平
- B: 阿利克伦
- C: 卡托普利
- D: 呋塞米

**答案: C**

78. 下列哪项不能提高镇静催眠药用药安全性

- A: 应尽量避免长期使用同一种镇静催眠药
- B: 与易成瘾的药物合用不会产生依赖性
- C: 镇静催眠药可交替使用
- D: 服用后应避免高速高空作业

**答案: B**

79. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金 (非霍奇金) 淋巴瘤的单克隆抗体是 ( )

- A: 西妥昔单抗
- B: 贝伐珠单抗
- C: 曲妥珠单抗
- D: 利妥昔单抗

**答案: D**

80. 氨基酸的主要作用不包括

- A: 转变为糖或脂肪
- B: 合成蛋白质
- C: 调节体内酸碱平衡
- D: 维持氮平衡

**答案: C**

81. 患者，男，58 岁。最近出现多饮、多尿和体重下降等不正常身体状况就诊，检查发现血糖高，诊断为 2 型糖尿病，轻度心功能不全，医嘱选择磺酰脲类促胰岛素分泌药治疗。

- A: 须在进餐前即刻或餐中服用，服药后不进餐会引起低血糖
- B: 不良反应风险较高
- C: 不适用于 I 型糖尿病
- D: 容易引发“继发失效”问题

**答案: D**

82. (2018 年真题) 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是 ( )

- A: 头孢他啶

- B: 头孢唑林
- C: 头孢呋辛
- D: 头孢米诺

**答案：D**

83. 维生素 B

- A: 拮抗华法林过量导致的出血
- B: 拮抗肝素过量导致的出血
- C: 恶性贫血和巨幼红细胞性贫血
- D: 纤溶亢进所致的出血

**答案：C**

84. 属于耐酸耐酶的青霉素类药物是()

- A: 青霉素
- B: 阿莫西林
- C: 丙匹西林
- D: 甲氧西林

**答案：D**

85. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法

- A: 未使用的胰岛素应在 2℃~8℃ 冷藏保存
- B: 混悬型胰岛素可以静脉注射
- C: 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类
- D: 每次注射需要更换不同部位

**答案：B**

86. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/645304203122012033>