

# 2024年浙江丽水市第二人民医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、孕妇尿中与胎儿、胎盘功能关系密切的激素是（ ）。

- A. 雌酮
- B. 雌二醇
- C. 雌三醇
- D. 孕酮
- E. 睾酮

【正确答案】

C

【答案解析】

雌三醇于妊娠10周后主要由胎儿胎盘单位合成。

2、乳牙最晚于何时出齐？（ ）

- A. 1岁
- B. 1.5岁
- C. 2.5岁
- D. 3岁
- E. 3.5岁

【正确答案】

C

【答案解析】

牙齿可分为乳牙及恒牙两类。乳牙多于生后6~8个月开始萌出，最早4个月，如12个月尚未出牙者可视为异常，2~2.5岁时出齐，共20个。

3、生后第1年身高增长约（ ）。

- A. 35cm
- B. 32cm
- C. 30cm
- D. 27cm
- E. 25cm

【正确答案】

E

【答案解析】

正常新生儿出生时身高平均约为50cm。1岁内前半年平均每月增长2.5cm，后半年平均每月增长1.5cm。1周岁时约为75cm，故生后第1年身高增长约25cm。

4、频发室性期前收缩的定义是（ ）。

- A. 室性期前收缩>5次/h
- B. 室性期前收缩>30次/h
- C. 室性期前收缩>10次/h
- D. 室性期前收缩>60次/h
- E. 室性期前收缩>100次/h

【正确答案】

B

## 【答案解析】

频发室性期前收缩是指>6次/min或30次/h以上的室性早搏，多在器质性心脏病基础上出现，最常见的心脏疾病是高血压、冠心病、心肌病、风湿性心脏病与二尖瓣脱垂病人。

5、肺毛细血管楔压（PCWP）的正常值是（ ）。

- A. 2.1~2.5kPa
- B. 0.8~2.0kPa
- C. 0.5~0.7kPa
- D. 2.6~2.9kPa
- E. 3.0~3.3kPa

## 【正确答案】

B

## 【答案解析】

应用Swan-Ganz漂浮导管可测得肺动脉压（PAP）和肺毛细血管楔压（PCWP），可反映肺静脉、左心房和左心室的功能状态。PAP的正常值为10~22mmHg，PCWP的正常值为6~15mmHg（0.8~2.0kPa），与左心房内压接近。PCWP低于正常值反映血容量不足（较CVP敏感）；PCWP增高可反映左心房压力增高例如急性肺水肿时。因此，临床上当发现PCWP增高时，即使CVP尚属正常，也应限制输液量以免发生或加重肺水肿。

6、母乳喂养儿佝偻病患病率低于人工喂养儿的原因是母乳中（ ）。

- A. 含钙质丰富
- B. 含磷高
- C. 钙磷比例适宜
- D. 维生素D含量丰富
- E. 乳白蛋白含量高

## 【正确答案】

C

## 【答案解析】

暂无解析。

7、泌尿系肿瘤中最常见的是（ ）。

- A. 膀胱癌
- B. 肾盂癌
- C. 肾细胞癌
- D. 前列腺癌
- E. 输尿管癌

## 【正确答案】

A

## 【答案解析】

暂无解析。

8、骨肉瘤的典型临床表现不包括（ ）。

- A. 早期肺转移
- B. 好发于骨骺生长活跃部位
- C. 骨膜下三角形新生骨（Codman三角）
- D. 为一密度减低的阴影，病灶内有钙化斑点或絮状斑片
- E. 多见于年轻人

## 【正确答案】

D

## 【答案解析】

骨肉瘤好发年龄青少年，好发部位股骨远端、胫骨近端和肱骨近端的干骺端。主要症状为局部疼痛，多为持续性，逐渐加剧，夜间尤重，并伴有全身恶液质，附近关节功能活动受限。肿瘤表面皮温增高，静脉怒张，红外线照射更明显。溶骨性骨肉瘤因侵蚀皮质骨面而导致病理性骨折。常早期血行转移至肺。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/645342223340011112>