

给药护理理论知识考核

一、选择题

1.下列外文缩写正确的是() [单选题] *

A.每晚一次 qod

B.每周一次 qn

C.每晨一次 qm✓

D.每晚一次 biw

E.隔日一次 qd

2.表示临睡前的外文缩写是() [单选题] *

A.pc

B.ac

C.hs✓

D.DC

E. 12n

3.服用下列药物时需常规测量脉搏或心率的是() [单选题] *

A.安定

B.洋地黄✓

C.氯丙嗪

D.泼尼松(强的松)

E.普萘洛尔(心得安)

4.青霉素 8 万 U qid im 的译意是 () [单选题] *

A.每 4h 一次，肌内注射

B.每日四次，肌内注射✓

C.每日六次，静脉注射

D.每日三次，皮下注射

E.每日一次，皮内注射

5. “prn” 的译意是 () [单选题] *

A.临睡前

B.临时备用必要时

C.长期备用需要时✓

D.每晚一次

E.隔日一次

6.在执行给药原则中最重要的一项是 () [单选题] *

A.给药时间要准确

B.给药途径要准确

C.给药后要注意观察疗效

D.注意给药不良反应

E.遵医嘱给药✓

7.剧毒药及麻醉药的保管原则是 () [单选题] *

A.药名用中、外文对照

B.与内服药、外用药分别放置

C.装密封瓶中保存放于阴凉处

D.应加锁专人管理，严格交班✓

E.药名上应有明显黑色边框标签

8.需避光使用的药物是（ ）[单选题] *

A.硝普钠✓

B.脂肪乳

C.垂体后叶素

D.尼可刹米

E. 复方氨基酸

9.药瓶标签标识正确的是（ ）[单选题] *

A.内服药标签为红色边框

B.外用药标签为蓝色边框

C.内服药标签为蓝色边框✓

D.外用药标签为黑色边框

E.剧毒药标签为红色边框

10.按照药物保管要求，应放置在 2~10℃冰箱内的药品是（ ）[单选题] *

A.维生素

B.氨茶碱

C.酵母片

D.抗毒血清 C✓

E.苯巴比妥钠

11.服用时避免与牙接触的药物是（ ）[单选题] *

A 止咳糖浆

B 硫酸亚铁✓

C 10%氯化钾

D 碳酸氢钠

E 颠茄合剂

12.分发口服药时错误的做法是 () [单选题] *

A 严格执行查对制度

B 按照药物的性能给予合理指导

C 因故暂不能服药者应将药物带回并交班

D 患者提问疑问时，应查询无误，解释后给药

E 带手术需禁食的患者可提前发药✓

13.超声波雾化吸入的正确操作方法是 () [单选题] *

A 可在开机状态下添加药剂✓

B 药物用温水稀释后加入雾化罐

C 停用时先关电源开关再关雾化开关

D 水槽内加温水

E 使用时先开雾化开关，再开电源开关

14.氧气雾化吸入时氧流量控制标椎是(B)[单选题]

A 1-2 升每分

B 6-8 升每分✓

C 8-12 升每分

D 2-4 升每分

E 4-6 升每分

15.氧气雾化吸药时湿化瓶内 () [单选题] *

A 加蒸馏水

B 勿加水✓

C 加温开水

D 加 20% ~ 30%乙醇

E 加生理盐水

16.配备口服药时不正确的操作是 () [单选题] *

A 片剂：用药匙取药

B 缓释剂：研碎溶解后倒入药杯✓

C 油剂：药杯中加水后倒入或滴入药物

D 少于 1 毫升：药杯中加水后滴管滴入

E 水剂：摇匀后量杯取药

17.发药时不正确的做法是 () [单选题] *

A 喂服不能自理的患者

B 严格执行三查七对

C 确认患者服用后方可离开

D 镇静、安眠药一次发给患者，嘱必要时分次服用✓

E 患者咨询时应给予合理解释

18.不属于口服给药评估内容的是 () [单选题] *

A 意识状态

B 咀嚼能力✓

C 吞咽能力

D 合作程度和意愿

E 药物的性质

19.宜饭前服用的药物是 () [单选题] *

A 氨茶碱

B 胃蛋白酶合剂✓

C 维生素 C

D 溴化铵

E 颠茄合剂

20.服磺胺类药物需多饮水的目的是 () [单选题] *

A 避免影响血液酸碱度

B 减轻服药引起的恶心

C 减少对肾脏的损害✓

D 增加药物疗效

E 避免发生尿潴留

21.选择注射针头型号的依据不包括 () [单选题] *

A 患者年龄

B 注射方法

C 药物黏稠度

D 注射部位的组织状态

E 药物剂量✓

22.有关各种注射法操作中共同点的叙述错误的是 () [单选题] *

A 掌握进针深度

B 注意选择部位

C 必须抽回血✓

D 掌握进针角度

E 均需要紧绷皮肤

23.皮内注射是将药液注入 () [单选题] *

A 表皮与真皮间✓

B 真皮与皮下组织之间

C 皮下组织

D 表皮

E 真皮

24.皮内注射时操作不正确的是 () [单选题] *

A 严格三查七对

B 注入剂量不超过 0.1 毫升

C 拔针后立即用无菌棉签按压穿刺点✓

D 用 75%乙醇消毒注射部位

E 针尖与皮肤呈 5 度角刺入

25.用皮内注射法接种卡介苗正确的步骤是 () [单选题] *

A 进针部位在前臂掌侧上段

B 注射前询问过敏史

C 注入药物前要先抽回血

D 进针时针头与皮肤呈 5 度角✓

E 拔针后用干棉签轻压针刺处

26.不符合注射原则的事 () [单选题] *

A 凡发生过敏反应的药物应暂停使用✓

B 药物应现用现配

C 根据给药途径选择注射部位

D 严格检查药物质量

E 严格执行查对制度

27.手可接触无菌注射器及针头的部分是 () [单选题] *

A 乳头, 针栓

B 针尖, 空筒

C 针栓, 活塞柄✓

D 针梗 活塞抽

E 活塞柄, 针梗

28.注射时消除潜在感染的正确护理施是 () [单选题] *

A.消毒时注射部位时应从外向内螺旋式涂擦

B.避开硬结或瘢痕处进针✓

C.选择符合消毒要求的一次性注射器

D.注射区域消毒范围小于 5cm

E.用碘酊消毒待于后再脱碘

29.不符合无痛注射措施的是 () [单选题] *

A.避开瘢痕或硬结处

B.安置正确的姿势体位

C.进针后注射前忌抽动活塞✓

D.注射时做到“二快一慢”

E.分散患者注意力

30.自安瓿内吸取药液时错误的方法是() [单选题] *

A.将安瓿头端药液弹至体部

B.严格检查药液质量

C.认真核对药物的名称、浓度

D.将针头全部插入液面下抽取✓

E.用砂轮在安瓿颈部划痕，消毒后折断

31.臀大肌注射的正确体位是() [单选题] *

A.仰卧位:足尖相对，足跟分开

B.俯卧位:足尖分开，足跟相对

C.侧卧位:上腿弯曲，下腿伸直

D.侧卧位:上腿伸直，下腿弯曲✓

E.仰卧位:双腿稍弯曲

32.2岁以下婴幼儿禁止臀大肌注射的原因不包括() [单选题] *

A.臀部区域小

B.部位不宜暴露✓

C.臀肌不发达

D.距大的神经血管近，易于损伤

E.潜在危险大

33.2岁以下婴幼儿肌肉注射的最佳部位是() [单选题] *

A.臀大肌

B.股内侧肌

C.股外侧肌✓

D.前臂中段

E.上臂三角肌

34.肌肉注射时常选臀大肌的主要原因是 () [单选题] *

A.定位方法简单

B.易于暴露

C.位置表浅

D.容纳剂量大

E.肌质丰厚、神经和血管细少✓

35.对静脉注射要点陈述错误的是 () [单选题] *

A.进针角度 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$

B.根据病情控制推注速度

C.注射部位常规消毒

D.确认回血无渗漏后推药

E.选择细小静脉✓

36.对皮下注射要点陈述错误的是 () [单选题] *

A.推注剂量 $\leq 2\text{ mL}$

B.仅用于胰岛素注射✓

C.进针角度 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$

D.常选择三角肌下缘处

E.注射部位用碘伏消毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/646015130142010050>