

2024 年安徽省五河县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题通关秘籍题库【黄金题型】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 抗凝，抗血小板治疗

- A: 血凝酶
- B: 华法林
- C: 硝苯地平
- D: 多非利特

答案：B

2. 可能增加严重心血管疾病风险，减肥治疗的风险大于获益，已于 2010 年 10 月在我国停止生产、销售和使用的减重药是

- A: 西布曲明
- B: 安非拉酮
- C: 奥利司他
- D: 芬特明

答案：A

3. 延缓或降低抗药性的联合用药是

- A: 头孢哌酮 / 舒巴坦复方制剂
- B: 磷霉素联用其他抗菌药物
- C: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- D: 硫酸阿托品联用吗啡

答案：B

4. 一般成人血液总量约为

A: 3000~3500ml

B: 2500~3000ml

C: 5000~6000ml

D: 1500~2000ml

答案：C

5. 在导致药源性胃肠道疾病的药品中，引起局部缺血性结肠炎、重者可致死亡等风险的药品是

A: 阿洛司琼

B: 利血平

C: 呋塞米

D: 阿米替林

答案：A

6. 不宜咽或吞下所用药品；用药后不宜马上进食或饮水的是

A: 舌下片

B: 阴道栓剂

C: 含漱剂

D: 咀嚼片

答案：C

7. 以下药物中，可引起粒细胞减少症的是()。

A: 吲哚美辛

B: 甲氨蝶呤

C: 巯嘌呤

D: 环磷酰胺

答案：A

8. 长期慢性便秘者不宜长期大量使用的是

- A: 乳果糖
- B: 番泻叶
- C: 硫酸镁
- D: 开塞露

答案：B

9. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 5%葡萄糖注射液

答案：C

10. 其含量用生育酚当量表示的是

- A: 维生素 A
- B: 维生素 D
- C: 维生素 B
- D: 维生素 E

答案：D

11. 患者,男,49岁,近1个月出现血压升高, BP155/95mmHg,同时伴有高尿酸血症,血尿酸 $508\mu\text{mol/L}$ 。使用别嘌醇 100mgbid,氯沙坦钾 50mgqd,碳酸氢钠 1gtid 治疗。关于该患者用药指导的说法,正确的是
()

- A: 氯沙坦钾可引起血尿酸升高

- B: 别嘌醇用药后可出现眩晕,用药后不宜驾车
- C: 严格限制蛋白质的摄入,每天不超过 0.6g/kg
- D: 关节疼痛时可选用贝诺酯止痛

答案: B

12. “-沙星”的药名词干缩写是

- A: #NAME?
- B: eef-
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案: D

13. 低比重尿主要见于

- A: 急性肾小球肾炎
- B: 急性肾衰竭少尿期
- C: 尿崩症
- D: 糖尿病

答案: C

14. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 心绞痛
- B: 胃溃疡
- C: 支气管哮喘

D: 胃食管反流病

答案：D

15. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症，根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg，药师为其推荐碳酸钙(0.5g/片)，该患者适宜的用法用量是()

A: 2 片 tid

B: 4 片 qd

C: 1 片 tid

D: 6 片 qd

答案：C

16. 临床可作为氨基糖苷类药物的替代品的是

A: 亚胺培南

B: 头孢哌酮

C: 氨曲南

D: 克拉维酸

答案：C

17. 合并三度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

A: 维拉帕米

B: 哌唑嗪

C: 多沙唑嗪

D: 卡托普利

答案：A

18. (2018 年真题) 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是 ()

A: 异烟肼

B: 链霉素

C: 对氨基水杨酸钠

D: 乙胺丁醇

答案: D

19. 一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是

A: 血浆蛋白结合率高的药物

B: 低水溶性的药物

C: 分子量大于 500 的药物

D: 分布容积小的药物

答案: D

20. “头孢-”的药名词干缩写是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: eef-

答案: D

21. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低

B: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

C: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

D: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

答案: D

22. 发病急剧，常累及双眼（或间隔 1~2 天）伴有大量的黏液性分泌物（眼屎），于夜间分泌较多，在晨起时常会被分泌物糊住双眼的是

- A: 急性卡他性结膜炎
- B: 流行性出血性结膜炎
- C: 过敏性结膜炎
- D: 流行性结膜炎

答案：A

23. 患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊，住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 华法林钠
- D: 氯吡格雷

答案：D

24. 下尿路感染的最突出表现是（）

- A: 发热
- B: 伴明显腰痛
- C: 肾区叩击痛
- D: 膀胱刺激征

答案：D

25. 可迅速崩解和释放药物的制剂

- A: 透皮贴剂
- B: 膜剂

C: 滴丸剂

D: 泡腾片剂

答案: D

26. 尿毒症患者维生素 D

A: 药物生物转化障碍

B: 经肾排泄的药物消除减慢

C: 组织吸收有自限性

D: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积

答案: A

27. 原发性失眠首选

A: 唑吡坦

B: 氯氮

C: 米氮平

D: 阿戈美拉汀

答案: A

28. 在患者药物治疗的每一个不同阶段（入院、转科或出院时），药师通过与患者沟通或复核，了解其在医疗交接前后的整体用药情况是否一致，与医疗团队一起对不适当的用药方案进行调整，并做详细全面的记录，从而预防医疗过程中的药物不良事件，保证患者用药安全的过程。这一深入开展的药学服务属于

A: 药物评价

B: 药学干预

C: 药物重整

D: 处方审核

答案: C

29. (2019 年真题) 关于处方开具和调剂的说法，正确的是

- A: 查处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量
- B: 调剂处方时应做到“四查十对”
- C: 处方开具后 7 日内有效
- D: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品

答案: B

30. 患者，女，72 岁，有青霉素过敏史，主诉尿痛、尿频。尿常规检查示大量白细胞，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml。诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 阿奇霉素片
- B: 阿莫西林胶囊
- C: 复方磺胺甲噁唑片
- D: 莫西沙星片

答案: C

31. 正常高值的血压范围是()。

- A: 收缩压 120~139mmHg，舒张压 80~89mmHg
- B: 收缩压 ≥ 180 mmHg，舒张压 ≥ 110 mmHg
- C: 收缩压 140~159mmHg，舒张压 90~99mmHg
- D: 收缩压 160~179mmHg，舒张压 100~109mmHg

答案: A

32. 肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

- A: $1/2 \sim 1/5$
- B: $1/5 \sim 1/7$
- C: $1/5 \sim 1/10$

D: 3/4~3/5

答案：A

33. 患者,77 岁,因感冒发热咳嗽,自服酚麻美敏片、维 C 银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是()

A: 氯苯那敏

B: 对乙酰氨基酚

C: 维生素

D: 银翘

答案：A

34. 不易产生耐受性,对 CYP2C19 快代谢的胃食管反流病人群,推荐长期维持治疗的抑酸剂是

A: 泮托拉唑

B: 法莫替丁

C: 奥美拉唑

D: 伊托必利

答案：A

35. 患者,男,72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入,氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

A: 缬沙坦

B: 维拉帕米

C: 普萘洛尔

D: 非洛地平

答案：A

36. 属于选择性 GABAA 复合受体拮抗剂

- A: 米氮平
- B: 阿戈美拉汀
- C: 唑吡坦
- D: 艾司唑仑

答案：C

37. 是空腹血浆中的主要脂蛋白，可将胆固醇运输到肝外组织的为

- A: 三酰甘油酯
- B: 低密度脂蛋白胆固醇
- C: 血清总胆固醇
- D: 极低密度脂蛋白胆固醇

答案：B

38. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

- A: 男性>90cm，女性>80cm
- B: 男性>85cm，女性>80cm
- C: 男性>90cm，女性>85cm
- D: 男>95cm，女性>85cm

答案：D

39. 非那雄胺用于治疗充盈性尿失禁、前列腺增生症，其主要不良反应是

- A: 体位性低血压
- B: Q-T 间期延长
- C: 性功能减退、乳房增大
- D: 眼内压升高

答案：C

40. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性罗音；WBC $>13\times10^9/L$ 。

- A: 红霉素
- B: 左氧氟沙星
- C: 链霉素
- D: 利福霉素

答案：B

41. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

- A: 丙磺舒
- B: 阿司匹林
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：A

42. 急性肾盂肾炎常见

- A: 颗粒管型、透明管型
- B: 细胞管型
- C: 蜡样管型
- D: 白细胞管型

答案：D

43. 服用西咪替丁等 H₂ 受体阻断剂、地西泮等苯二氮革类药物应该禁用的是

- A: 烟
- B: 食醋

C: 酒

D: 浓茶

答案: A

44. 双侧肾动脉狭窄患者禁用的抗高血压药物为 ()。

A: 利尿剂 (袢利尿药)

B: ACEI

C: 利尿剂 (噻嗪类)

D: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

答案: B

45. 血清 γ -谷氨酰转移酶正常参考区间是

A: 男性 $<40\text{U/L}$

B: 男性 $11\sim50\text{U/L}$

C: 成人 $<40\text{U/L}$

D: 成人 $<50\text{U/L}$

答案: B

46. 以下关于抑郁症的介绍错误的是

A: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

B: 抑郁症的病因明确

C: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点

D: 抑郁症的好发年龄在 $20\sim50$ 岁

答案: B

47. 属于 MA-B 抑制剂的是

A: 司来吉兰

B: 恩托卡朋

C: 苯海索

D: 普拉克索

答案: A

48. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 15~20mg/L 并且长疗程的患者

B: 肝功能不全者

C: 肾功能不全者

D: 老年人

答案: B

49. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

A: 氯苯那敏

B: 唑吡坦

C: 地西泮

D: 文拉法辛

答案: A

50. 患者，女，26 岁，临床诊断为“甲状腺功能亢进症”，给予丙硫氧嘧啶 450mg/d 治疗，应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

- A: 嗜酸粒细胞
- B: 红细胞
- C: 血红蛋白
- D: 白细胞

答案：D

51. 口服氯化铵用于解救

- A: 氯丙嗪中毒
- B: 苯丙胺中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 硝西泮中毒

答案：B

52. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 干扰蛋白质合成
- B: 破坏 DNA 结构和功能
- C: 嵌入 DNA 干扰核酸合成
- D: 干扰核酸生物合成

答案：B

53. （2021 年真题）患者，女，58 岁，诊断为骨性关节炎，经洛索洛芬单药治疗疼痛缓解不理想可联合使用的药物是（）

- A: 美洛昔康
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸
- D: 曲马多

答案：D

54. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

- A: 支气管哮喘？
- B: 慢性阻塞性肺病？
- C: 肺结核？
- D: 肺炎？

答案：C

55. 适用于夜间服用的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 利尿药
- C: 他汀类
- D: 氨基糖苷类

答案：C

56. 一 2 型糖尿病患者，伴高血压、高胆固醇血症，如有胃部不适或感冒即需联合用药。对该患者的用药教育应该是适宜清晨服用的药品是

- A: 阿司匹林
- B: 格列美脲
- C: 呋塞米
- D: 普伐他汀

答案：C

57. 正常人的体温在 37℃ 左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A: 腋下温度超过 36.6℃

B: 口腔温度超过 37.0℃

C: 口腔温度超过 37.3℃

D: 直肠温度超过 36.3℃

答案: C

58. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mg bid+枸橼酸铋钾 220mg bid，疗程 2 周

B: 阿莫西林 1000mg bid+克拉霉素 500mg bid+艾司奥美拉唑 20mg bid+枸橼酸铋钾 220mg bid，疗程 2 周

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid, 疗程 2 周

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 克拉霉素 500mgbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程 2 周

答案：A

59. 药物治疗结核病的原则及早用药以利于杀灭结核菌株

A: 联合

B: 规律

C: 适量

D: 早期

答案：D

60. 妥布霉素可导致药源性肾病的机制是

A: 前列腺素合成障碍

B: 肾小球滤过率下降

C: 结晶沉积

D: 不可逆性肾小管坏死

答案：B

61. 应用两种以上药物以增强与确保疗效

A: 适量

B: 早期

C: 联合

D: 规律

答案：C

62. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 39.1℃～41.0℃

B: 38.1℃～39.0℃

C: 37.0℃～38.3℃

D: 37.4℃～38.0℃

答案：B

63. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A: 氯化氢？

B: 克拉霉素？

C: 奥美拉唑？

D: 碳酸氢钠？

答案：A

64. 查找药物信息的正确顺序是（）。

A: 一级信息源→二级信息源→三级信息源

B: 二级信息源→三级信息源→一级信息源

C: 三级信息源→二级信息源→一级信息源

D: 二级信息源→一级信息源→三级信息源

答案：C

65. 可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

A: 铁剂

B: 乳果糖

C: 阿法骨化醇

D: 对乙酰氨基酚

答案：B

66. 对于铁剂的使用，正确的为（）

- A: 待血红蛋白恢复正常后，仍需继续服 3~4 个月
- B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- C: 需要快速补铁的情况下，可以选择口服治疗
- D: 口服铁剂宜选用三价铁

答案：B

67. 降纤治疗

- A: 巴曲酶
- B: 阿替普酶
- C: 低分子肝素
- D: 阿司匹林

答案：A

68. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少烟酸主要会造成

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 嗜碱性粒细胞增多
- C: 嗜酸性粒细胞减少
- D: 中性粒细胞减少

答案：C

69. 服药饮酒可致使低血糖、呼吸抑制的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 格列本脲
- C: 普萘洛尔
- D: 吲哚美辛

答案：B

70. 医疗机构制剂申请要求临床研究受试例数不得少于

- A: 40 例
- B: 80 例
- C: 20 例
- D: 60 例

答案：D

71. 心力衰竭的常用药方案是

- A: 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+强心苷类
- B: 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+ACEI
- C: 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+钙通道阻滞剂
- D: 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+B 受体阻断剂

答案：B

72. (2018 年真题) 患者, 男, 60 岁, 因水疱型足癣到药店购药药师应推荐的药品是 ()

- A: 10%樟脑软膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 特比萘芬乳膏
- D: 利巴韦林软膏

答案：C

73. 药物的成本与产生的收益之间进行对比, 评价治疗方案的经济性, 以货币为单位。该药物经济学评价方法是

- A: 成本-效益分析
- B: 成本-效果分析
- C: 成本-效用分析

D: 最小成本分析

答案：A

74. 适宜餐后服用的是

A: 呋塞米

B: 格列美脲

C: 普伐他汀

D: 阿司匹林

答案：D

75. 患者，女，18 岁，近半年来食欲亢进，多汗，体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次 / 分。化验结果：血清促甲状腺激素（TSH） $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝、肾功能基本正常，白细胞计数正常。诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是

A: 甲状腺全切除手术

B: 碘化钾治疗，定期复查

C: 注意休息与补充营养，使用甲巯咪唑治疗

D: 选用放射性 ^{131}I 治疗

答案：C

76. 孕妇使用四环素可使胎儿牙齿黄染、牙釉质发育不全，骨生长障碍，发生的时间是

A: 妊娠 3 个月内

B: 妊娠 5 个月后

C: 妊娠 4~9 个月

D: 妊娠 2 个月后

答案：B

77. 痛风急性发作期应选用

- A: 阿司匹林
- B: 丙磺舒
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：D

78. 低危患者

- A: 立即使用抗高血压药物
- B: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗
- C: 立即进行抢救治疗
- D: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗

答案：B

79. 急性结膜炎患者禁用的药品是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 利福平滴眼剂
- C: 醋酸可的松滴眼剂
- D: 硫酸锌滴眼剂

答案：D

80. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的药物是

- A: 依折麦布
- B: 辛伐他汀
- C: 甲基多巴
- D: 非诺贝特

答案：B

81. 下述“关于肺结核的治疗原则”中，不正确的是

- A: 整个治疗方案分为强化期和巩固期两个阶段
- B: 防止耐药菌产生
- C: 整个治疗方案分为 3 个阶段
- D: 减少结核菌的传播

答案：C

82. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 微生态制剂不可用于消化不良的治疗
- B: 乳腺癌、机械性肠梗阻患者禁用多潘立酮
- C: 过量的干酵母和乳酶生可以引起腹泻
- D: 胰酶片必须用肠溶衣片，口服时不可嚼碎，应整片吞下

答案：A

83. 糖尿病患者一旦出现尿酮体阳性，可以提示患者

- A: 生长激素分泌过度
- B: 伴甲状腺功能亢进
- C: 病情尚未控制
- D: 胰岛素分泌过度

答案：C

84. 原料血浆包装、贮存、运输的温度应控制在

- A: -4℃ 以下
- B: -20℃ 以下
- C: -15℃ 以下

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: -10°C 以下。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/646035220102011030>