北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《新生儿专业考试试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：足月新生儿，生后 5 天出现黄疸，体温不升，拒奶，呕吐，嗜睡，抽搐 3 次，有尖叫。查体：双眼凝视，前囟饱满，心肺正常，脐部少许黄色分泌物，白细胞总数 30×10 / L，中性 85%，考虑诊断为（　）。A. 新生儿败血症

B. 新生儿败血症、化脓性脑膜炎

C. 新生儿颅内出血

D. 新生儿低钙血症

E. 新生儿核黄疸

2、单项选择题：预防 MAS（胎粪吸入综合征）的关键是（　）。A. 防止早产

B. 防止胎儿缺氧

C. 防止 PPHN（新生儿持续肺动脉高压）

D. 防止维生素 K 缺乏

E. 防止 ABO 溶血

3、单项选择题：新生儿生后 4～6 个月时，体重每日增加（　）。A. 100～200g

B. 300～400g

C. 500～600g

D. 700～800g

E. 900～1000g

4、单项选择题：一足月新生儿，因脐带绕颈引起胎儿窘迫，娩出时 Apgar 评分 1 分钟、5 分钟及 10 分钟分别为 2、5、7 分。由于窒息可致下述表现，但不可能的是（　）。A. 意识改变，惊厥

B. 肾脏损害

C. 溶血性贫血

D. 坏死性小肠结肠炎

E. 持续胎儿循环

5、单项选择题：新生儿溶血症的换血量约为婴儿全血量的（　）。A. 1 倍

B. 1.5 倍

C. 2 倍

D. 2.5 倍

E. 3 倍

6、单项选择题：新生儿尤其是早产儿易发生寒冷伤综合征的病理生理中，错误的是（　）。A. 体温调节中枢发育不成熟

B.皮肤表面积相对较大

C.血流较丰富

D.棕色脂肪含量较多

E.体内能量储存少

7、单项选择题：足月新生儿生后第二天出现黄疸，间接胆红素 220μmol／L，最不可能的诊断是（　）。A.新生儿 ABO 溶血

B.新生儿 Rh 溶血

C.新生儿败血症

D.先天性胆道闭锁

E.G6PD 缺乏症

8、单项选择题：月新生儿母乳喂养，生后 6d 出现皮肤黄染，吃奶好，血清胆红素 205μmol／L（12mg/dl），你认为首先应采用何种治疗方法（　）。A.光照疗法

B.口服苯巴比妥

C.输血浆

D.暂停母乳 24～72h 后复查血清胆红素

E.换血疗法

9、单项选择题：治疗轻度新生儿寒冷损伤，首先采取（　）。A.中药治疗

B.激光治疗

C.维生素 C 治疗

D.复温治疗

E.光疗

10、单项选择题：一足月新生儿，静脉血细胞压积 75%。生后 12h 小儿嗜睡。引起本例嗜睡最不可能的因素是（　）。A.脑血栓形成

B.低血糖

C.缺氧缺血所致症状

D.核黄疸

E.持续肺动脉高压

11、单项选择题：新生儿肝脏对胆红素代谢的特点，错误的是（　）。A.摄取胆红素必需的 Y、Z 蛋白低

B.UDPGT 的量和活性不足

C.排泄结合胆红素的功能差

D.Y、Z 蛋白在生后 5～15 天后达成人水平

E.UDGPT 生后 1 周内达到成人水平

12、单项选择题：新生儿衣原体感染首选药物为（　）。A.红霉素

B.庆大霉素

C.青霉素

D.头孢拉定

E.氨苄西林

13、单项选择题：早产儿胎龄 36 周，出生时有窒息史，生后 8 小时开始人工喂养。于生后第 5 天出现精神萎靡，胃纳减退，恶心、呕吐，腹胀，大便隐血试验阳性。腹部 X 线平片符合坏死性小肠结肠炎。下列 X 线表现除哪一项外均提示病情加重（　）。A.气腹

B.腹腔渗液

C.门静脉积气

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/647024201016006102