

主管护师-护理学（中级）专业知识押题密卷 1

单选题（共 100 题，共 100 分）

(1.) 正式临产的标志是

- A. 见红
- B. 胎膜早破
- C. 下腹隐痛
- D. 有规律的子宫收缩
- E. 先露（江南博哥）入盆

正确答案： D

参考解析：临产诊断是有规律且逐渐增强的子宫收缩，同时伴有进行性子宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降。

(2.) 放置节育环的禁忌证不包括

- A. 轻度贫血
- B. 急性盆腔炎
- C. 月经过频
- D. 生殖道肿瘤
- E. 宫颈口过松

正确答案： A

参考解析：宫内节育器禁忌证：①急、慢性生殖道炎症；②生殖器官肿瘤；③月经紊乱：月经过多过频或不规则出血；④子宫畸形；⑤宫颈口过松、重度陈旧性宫颈裂伤或子宫脱垂；⑥严重全身性疾病。

(3.) 女性，检查为念珠菌阴道炎。护士指导其选用阴道清洗液为

- A. 呋喃西林
- B. 1%乳酸
- C. 氯己定
- D. 1：5000 高锰酸钾
- E. 2%~4%碳酸氢钠

正确答案： E

参考解析：念珠菌在酸性环境适于其生长，因此阴道灌洗应用 2%~4%碳酸氢钠灌洗或坐浴，消灭其生长环境。

(4.) 急性下壁心肌梗死易发生的心律失常为

- A. 室上性心动过速
- B. 心室颤动
- C. 房性期前收缩
- D. 病窦综合征
- E. 心房纤颤

正确答案： D

参考解析：

下壁心肌梗死常易发生慢性心律失常，如房室传导阻滞等，并伴有血压下降。

(5.) 牵引复位的适应证是

- A. 跟骨压缩骨折
- B. 桡骨裂缝骨折
- C. 胫骨青枝骨折
- D. 股骨干斜形骨折
- E. 骨盆骨折

正确答案： D

参考解析：牵引术适应于骨干骨折或关节脱位复位后不稳定需保持对位者。B、C 属于稳定性骨折，不需要牵引复位。

跟骨的压缩性骨折一般石膏固定，可逐渐愈合，同时应消炎消肿治疗避免周围的软组织的并发症。如果有明显的错位影响关节应手术复位固定治疗恢复正常的形状。A 错。

使用外固定器治疗骨盆骨折是急诊外科抢救患者生命的治疗方法，目前它已被公认为对严重骨盆创伤患者能确实稳定骨盆骨折的一种治疗方法。既可控制骨断端出血，又能迅速减轻疼痛和便于翻身。E 错。

(6.) 以下哪项症状或体征对于肝硬化失代偿期的诊断最有意义

- A. 右上腹间歇性隐痛
- B. 肝功能异常
- C. 食欲缺乏
- D. 腹水
- E. 大便情况

正确答案： D

参考解析：失代偿期主要为肝功能减退和门脉高压症两类临床表现，脾大、侧支循环的建立和开放、腹水是门脉高压的三大表现。

(7.) 关于消化性溃疡疼痛特点描述正确，除外

- A. 长期性、周期性、节律性
- B. 胃溃疡疼痛位于剑突下正中偏左
- C. 十二指肠溃疡疼痛多发生于空腹或夜间
- D. 十二指肠溃疡疼痛常在进食后 0.5~1 小时出现
- E. 十二指肠溃疡疼痛时进食可帮助缓解

正确答案： D

参考解析：十二指肠溃疡的疼痛多在餐后 3~4 小时出现，持续至下次进餐，进食后可减轻或缓解。

(8.) 孕妇 24 岁，妊娠 6 周，早孕表现不包括

- A. 停经
- B. 尿频
- C. 晨起呕吐

- D. 腹泻
- E. 乳头刺痛

正确答案： D

参考解析：停经是妊娠最早、最重要的症状。在妊娠 6 周左右出现恶心、晨起呕吐等早孕反应，12 周左右消失。尿频是因增大的子宫压迫膀胱而引起；在雌、孕激素的影响下，乳房逐渐增大。孕妇自觉乳房轻度胀痛及乳头刺痛。

(9.)女，13 岁。右胫前有一鸡蛋大小隆起，质硬，边界欠清，局部剧痛，夜间痛尤甚，皮温高，X 线片有骨膜反应。考虑患者最可能出现

- A. 骨巨细胞瘤
- B. 软骨肉瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 尤文肉瘤
- E. 骨肉瘤

正确答案： E

参考解析：根据病人发病年龄和临床表现，可以判断出病人患有骨肉瘤。

(10.)女，50 岁。患 1 型糖尿病 10 年。5 年前开始使用胰岛素治疗。近 2 周擅自停用胰岛素，改服中药。3 天前患者腹股沟处长一疖子，经抗生素治疗未见好转，并出现恶心、呕吐、头痛、呼吸深快、脉细速。急送医院检查：血糖 24mmol/L，血酮升高，尿酮强阳性，白细胞增高。该患者被诊断为

- A. 感染性休克
- B. 酮症酸中毒
- C. 高渗性非酮症性昏迷
- D. 乳酸性酸中毒
- E. 低血糖昏迷

正确答案： B

参考解析：病人为 1 型糖尿病，有停用胰岛素和感染史，结合临床表现可判断为酮症酸中毒。

(11.)急性呼吸性酸中毒的主要治疗措施是

- A. 应用 5%碳酸氢钠溶液
- B. 增加通气量
- C. 积极补充液体
- D. 限制摄入高钾食物
- E. 利尿增加酸从肾排出

正确答案： B

参考解析：呼吸性酸中毒的主要治疗措施是改善肺泡通气量，一般不宜补碱。

(12.)初孕妇，26 岁，妊娠 12 周，出现厌食、恶心、呕吐及右上腹疼痛，皮肤黄疸。肝功能检查：均高于正常，乙型肝炎表面抗原阳性。该孕妇最可能的情况是

- A. 妊娠剧吐
- B. 妊娠肝内胆汁淤积症
- C. 妊娠合并急性胆囊炎
- D. 妊娠合并乙型肝炎
- E. 先兆子痫

正确答案： D

参考解析：HBsAg 是 HBV 感染的特异性标志，见于慢性肝炎、病毒携带者。因此该病人可诊断为妊娠合并乙型肝炎。

(13.) 现将 2 份生理盐水配上 1 份 1.4% 碳酸氢钠液体，护士计算其张力为

- A. 等张
- B. 2/3 张
- C. 1/2 张
- D. 1/4 张
- E. 2/5 张

正确答案： A

参考解析：2 份生理盐水：1 份 1.4% 碳酸氢钠液体的张力为 $(2+1) / (2+1)$ ，即等张。

(14.) 下列哪种物质适用于金属物质中毒的解毒

- A. 亚甲蓝
- B. 胆碱酯酶复活剂
- C. 二巯基丙醇
- D. 维生素 C
- E. 阿托品

正确答案： C

参考解析：金属解毒药：依地酸二钠钙多用于铅中毒；二巯基丙醇多用于治疗锑、铅、汞、砷、铜等中毒。以上药物与金属结合，形成稳定而可溶的金属螯合物排出体外。

(15.) 肺气肿患者，双肺叩诊音呈

- A. 鼓音
- B. 实音
- C. 浊音
- D. 过清音
- E. 清音

正确答案： D

参考解析：肺气肿叩诊为过清音。

(16.) 法洛四联症患儿，男，2 岁，今晨突然晕厥、抽搐，最可能的原因是

- A. 合并脑血栓
- B. 合并脑肿瘤

- C. 合并脑膜炎
- D. 高热
- E. 肺动脉漏斗部肌肉痉挛

正确答案： E

参考解析：法洛四联症脑缺氧发作机制。

(17.)左半结肠癌的主要表现应除外

- A. 腹泻、便秘
- B. 腹胀
- C. 腹痛
- D. 肠梗阻
- E. 腹部肿块

正确答案： E

参考解析：腹部肿块是右半结肠癌的表现。

(18.)关于左侧小脑幕切迹疝的临床表现描述正确的是

- A. 昏迷、右侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪
- B. 昏迷、左侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪
- C. 昏迷、左侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪
- D. 昏迷、双侧瞳孔散大，双侧肢体瘫痪
- E. 昏迷、双侧瞳孔散大，左侧肢体瘫痪

正确答案： C

参考解析：小脑幕切迹疝的表现是同侧瞳孔变化，对侧肢体瘫痪。

(19.)女，29岁。停经52天，阵发性腹痛伴阴道出血2天。妇科检查：子宫饱满，双附件(-)，宫口开大1cm，该患者最可能的情况是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 稽留流产
- D. 习惯性流产
- E. 感染性流产

正确答案： B

参考解析：难免流产由先兆流产发展而来，表现为阴道出血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查：子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，但组织尚未排出。

(20.)治疗休克首要和最基本的措施是

- A. 积极处理原发病
- B. 纠正酸碱平衡失调
- C. 应用血管活性药物
- D. 纠正微循环障碍
- E. 尽快恢复有效血容量

正确答案： E

参考解析：扩容是治疗休克首要而基本的措施。

(21.) 乙肝疫苗第 1 次接种时间是

- A. 出生后 1~2 天
- B. 出生 1 个月以上
- C. 出生 4 个月以上
- D. 出生 8 个月以上
- E. 1 岁以上

正确答案： A

参考解析：乙肝疫苗接种第 1 次为出生后 24 小时内，第 2 次为第 1 个月时，第 3 次为第 6 个月时。

(22.) 在新生儿期，先天性甲状腺功能减退症患儿最早出现的症状是

- A. 低体温
- B. 易哭闹
- C. 不能正常饮食
- D. 腹胀
- E. 生理性黄疸延长

正确答案： E

参考解析：先天性甲状腺功能减退症在新生儿期最早出现的表现为生理性黄疸时间延长，达 2 周以上。

(23.) 新生儿 Apgar 评分指标不包括

- A. 心率
- B. 体温
- C. 呼吸
- D. 皮肤颜色
- E. 喉反射

正确答案： B

参考解析：Apgar 评分包括心率、呼吸、肌张力、喉反射、皮肤颜色。

(24.) 患儿男，11 个月。自 5 个月起常有抽搐发作，至今不能独坐和认识父母。查体：表情呆滞，皮肤白皙，头发黄褐色，尿有鼠臭味。该患儿最可能的情况是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 21-三体综合征
- C. 苯丙酮尿症
- D. 脑肿瘤
- E. 癫痫

正确答案： C

参考解析：

典型的苯丙酮尿症表现为智力低下，出生后3~6个月可出现呕吐、喂养困难、生长缓慢等症状，逐渐加重，1岁左右症状明显。90%的患儿的毛发逐渐变为棕色或黄色、皮肤变白、1/3患儿皮肤干燥，常有湿疹、虹膜色泽变浅，尿液和汗液有鼠尿味。

(25.) 患儿，女，3天，生后持续性发绀，最可能的情况是

- A. 肺透明膜病变
- B. 室间隔缺损
- C. 法洛四联症
- D. 动脉导管未闭
- E. 主动脉狭窄

正确答案： C

参考解析：因心脏结构的异常，静脉血流入右心后不能全部流入肺循环达到氧合作用，有一部分或大部分自右心或肺动脉流入左心或主动脉，直接进入体循环，出现持续性发绀。常见有法洛四联症、大动脉错位等。

(26.) 颈椎骨折脱位合并颈髓横贯伤的早期会出现

- A. 心动过速
- B. 呼吸运动减弱
- C. 胸部以下感觉障碍
- D. 大、小便失禁
- E. 上肢肌肉无力

正确答案： B

参考解析：颈髓内有呼吸中枢。

(27.) 呼吸系统疾病最常见的症状是

- A. 咳嗽
- B. 咳痰
- C. 痰中带血
- D. 呼吸困难
- E. 发热

正确答案： A

参考解析：咳嗽是呼吸系统疾病最常见的症状之一。

(28.) 对于臀位阴道分娩不正确的说法是

- A. 临产发动后卧床保持体力
- B. 严密监测胎心
- C. 勿灌肠
- D. 少做肛门检查
- E. 阴道口见胎足，为子宫颈口开全

正确答案： E

参考解析：阴道口见胎足，不能作为子宫颈口开全的标志。

(29.)初产妇，28 岁，宫口已开全 2.5 小时后，胎儿还未娩出。该产妇发生了

- A. 第二产程延长
- B. 潜伏期延长
- C. 胎盘滞留
- D. 胎盘嵌顿
- E. 活跃期停滞

正确答案： A

参考解析：第二产程初产妇超过 2 小时，经产妇超过 1 小时尚未分娩，为第二产程延长。

(30.)女，32 岁。停经 6 周。现厌食，恶心，呕吐频繁，饮水也吐，尿量少，无发热，精神萎靡，皮肤干燥。妇科检查：宫体如孕 6 周大小，宫体软，附件（-）。实验室检查：妊娠试验(+)，尿酮体（+++）。最可能的情况是

- A. 早期妊娠合并传染性肝炎
- B. 妊娠剧吐
- C. 葡萄胎
- D. 妊娠合并胃肠道感染
- E. 妊娠合并肾炎

正确答案： B

参考解析：妊娠剧吐、不能进食等可出现酮尿。又因病人妊娠试验阳性，因此可判断为妊娠剧吐。

(31.)女，57 岁。患肺脓肿，住院治疗 5 个月余仍反复咯血，首选的治疗方法是

- A. 稀释痰液及体位引流
- B. 大剂量联合使用抗生素
- C. 超声雾化吸入药物
- D. 抗炎及输血
- E. 肺叶切除

正确答案： E

参考解析：肺脓肿病程超过 3 个月，经内科治疗病变未见明显吸收，并有反复感染、咯血者可手术切除。

(32.)女，45 岁。因车祸致颅内血肿，昏迷，并频繁呕吐。拟手术清除血肿，术前预防脑疝形成的有效措施是

- A. 冬眠低温疗法
- B. 避免剧烈咳嗽和便秘
- C. 限制液体输入量
- D. 静脉注射氢化可的松
- E. 快速静脉滴注甘露醇

正确答案： E

参考解析：降低颅内压最快的方式是使用甘露醇。

(33.)肺炎球菌肺炎在炎症消散后常见有

- A. 肺部遗留纤维化
- B. 形成空洞，迁延不愈
- C. 肺组织完全恢复正常
- D. 造成胸膜粘连、增厚
- E. 以上都不是

正确答案： C

参考解析：因肺炎球菌不产生毒素，故不引起原发性组织坏死和形成空洞，炎症消散后肺组织结构多无破坏，不留瘢痕。

(34.) 区分轻型与重型腹泻的依据是

- A. 呕吐、腹泻的次数
- B. 有无水、电解质紊乱
- C. 大便镜检可见脂肪球
- D. 酸中毒程度
- E. 患者精神状态

正确答案： B

参考解析：重型与轻型腹泻的区别不仅参考腹泻次数及量，最主要是有无水电和酸碱平衡紊乱。

(35.) 一侧面部和肢体瘫痪为

- A. 截瘫
- B. 偏瘫
- C. 局部性瘫痪
- D. 交叉性瘫痪
- E. 软瘫

正确答案： B

参考解析：偏瘫：表现为一侧面部和肢体瘫痪，常见于一侧大脑半球病变，如脑梗死等。

(36.) 对于淋病的描述正确的是

- A. 潜伏期长达 3~5 周
- B. 病理分急性和慢性两种
- C. 下肢水肿
- D. 慢性淋病时，淋菌存在于生殖器分泌物中
- E. 镜下血尿为早期症状

正确答案： B

参考解析：临床表现：潜伏期 3~7 天，60%~70% 病人无症状。病理分为急性和慢性两种。急性淋病最早症状为尿痛、尿频、排尿困难。慢性淋病淋菌可长期潜伏在尿道旁腺、前庭大腺深处并反复发作。

(37.) 患儿，男，7 岁，诊断为“急性淋巴细胞白血病”。以下症状提示有中枢神经系统受累的是

- A. 关节疼痛明显
- B. 发热
- C. 头痛、呕吐、嗜睡
- D. 皮肤出血点
- E. 肝、脾大及淋巴结肿大

正确答案： C

参考解析：发生脑膜白血病时可出现头痛、呕吐、嗜睡、惊厥等。

(38.)女，5岁。下午突然呕吐数次，随之抽搐，以昏迷待查急诊入院。查体：唾液过多，心率缓慢，瞳孔缩小，呈浅昏迷状态，本患儿最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 食物中毒
- C. 有机磷中毒
- D. 药物中毒
- E. 脑炎

正确答案： C

参考解析：毒蕈碱样症状：食欲缺乏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、流涎、多汗、视物模糊、瞳孔缩小、呼吸道分泌物增加、支气管痉挛、呼吸困难、肺水肿。该患儿表现符合毒蕈碱样症状，故医疗诊断为有机磷中毒。

(39.)护士在向慢性胃炎患者进行健康宣教，其中不应该包括下列哪项

- A. 养成良好饮食习惯
- B. 注意休息，避免精神高度紧张
- C. 戒烟、戒酒
- D. 长期服用抑制胃酸分泌的药物
- E. 避免服用刺激性药物和食物

正确答案： D

参考解析：慢性胃炎中胃体胃炎胃酸缺乏，胃窦胃炎胃酸多正常，因此不需长期服用抑制胃酸分泌药物。

(40.)正常6月龄小儿异常表现为

- A. 前囟未闭
- B. 不能保持坐位
- C. 乳牙萌出
- D. 俯卧时不能抬胸
- E. 两手不会传递玩具

正确答案： D

参考解析：小儿6个月如在俯卧时仍不能抬胸提示发育异常。

(41.)颅底骨折类型为

- A. 闭合性骨折
- B. 开放性骨折

- C. 完全性骨折
- D. 压缩性骨折
- E. 粉碎性骨折

正确答案： B

参考解析：由于颅底骨骼与硬脑膜连接紧密，颅底骨折常伴随硬脑膜撕裂，引起脑脊液漏，为开放性骨折。

(42.)有关小儿急性肾小球肾炎的描述正确的是

- A. 秋冬季多发，2岁以下常见
- B. 常有链球菌感染前驱史
- C. 最先出现的症状为水肿，凹陷性
- D. 镜下血尿持续较短
- E. 预后较差

正确答案： B

参考解析：急性肾小球肾炎是小儿泌尿系统最多见的疾病。秋、冬季呼吸道感染是急性肾炎主要的前驱病，其中多数发生于急性溶血性链球菌感染后。发病年龄以5-10岁为多见，<2岁者少见。

(43.)新生儿保健的关键时期是

- A. 出生后24小时
- B. 出生后3天内
- C. 出生后7天内
- D. 出生后10天内
- E. 出生后14天内

正确答案： C

参考解析：生后1周是新生儿发病率和死亡率最高时期，故应将此期作为保健重点。

(44.)产妇进入产房后，护士不正确的处理是

- A. 再次清洁、消毒外阴
- B. 铺无菌巾
- C. 给予产妇精神支持
- D. 当胎头着冠时，指导病人开始向下屏气
- E. 严密监测胎心

正确答案： D

参考解析：宫缩时产妇会不由自主地向下屏气用力，主动增加腹压。

(45.)导致婴儿期心力衰竭的最常见病因是

- A. 心肌炎
- B. 心内膜弹性纤维增生症
- C. 肺透明膜病变
- D. 先天性心脏病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/647046164021010056>