

2024 年陕西省《执业药师之西药学专业二》 考试内部题库（达标题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 一般来讲，复方己酸羟孕酮注射液的注射时间与剂量是

- A: 第一次于月经来潮第 5 日注射 1 支
- B: 第一次于月经来潮后 10~12 日注射 2 支
- C: 第二次及以后于月经来潮后 10~12 日每月注射 1 支
- D: 第二次及以后于月经来潮第 5 日每月注射 1 支

答案：C

2. 用药时需关注肺毒性的药物是

- A: 博来霉素
- B: 紫杉醇
- C: 长春新碱
- D: 柔红霉素

答案：A

3. 神经毒性较严重的是

- A: 顺铂
- B: 卡铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 奥沙利铂

答案：D

4. 对血吸虫具有杀灭活性的药物是()。

- A: 噻嘧啶
- B: 阿苯达唑
- C: 甲硝唑
- D: 吡喹酮

答案：D

5. 基于甲状旁腺激素研发出的促进骨形成的药是

- A: 唑来膦酸
- B: 依普黄酮
- C: 特立帕肽
- D: 雷洛昔芬

答案：C

6. 用药过程中需注意监护心脏毒性的是()

- A: 多柔比星
- B: 丝裂霉素
- C: 伊立替康
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

7. 用于青春期前隐睾症的诊断和治疗的是

- A: 米非司酮
- B: 硝苯地平
- C: 噻嘧啶
- D: 绒促性素

答案：D

8. 下列不属于凝血因子 X 抑制剂的是

- A: 利伐沙班
- B: 阿哌沙班
- C: 华法林
- D: 磺达肝癸钠

答案：C

9. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 减少房水生成
- B: 防止激光手术后的反应性眼压升高
- C: 术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用
- D: 用于白内障人工晶状体植入手术中缩瞳

答案：A

10. 以上药物镇咳作用最强的是

- A: 右美沙芬
- B: 吗啡
- C: 可待因
- D: 喷托维林

答案：B

11. 容积性泻药()

- A: 硫酸镁
- B: 地芬诺酯
- C: 甘油
- D: 乳果糖

答案：A

12. 仅对浅表真菌感染有效的药物()

- A: 两性霉素 B
- B: 伊曲康唑
- C: 氟康唑
- D: 灰黄霉素

答案：D

13. 属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要()

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 赖氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(18AA)
- D: 精氨酸

答案：B

14. (2018 年真题) 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是 ()

- A: 布美他尼
- B: 乙酰唑胺
- C: 依托塞米
- D: 依他尼酸

答案：D

15. 长期使用可使血钾水平升高的药品是

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋达帕胺
- C: 氨苯蝶啶
- D: 呋塞米

答案：C

16. (2015 年真题) 属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂的是 ()。

- A: 氯吡格雷
- B: 替罗非班
- C: 阿司匹林
- D: 奥扎格雷

答案：A

17. 复方左炔诺孕酮片、复方孕二烯酮片均含有的成份是

- A: 维生素 B6
- B: 去氧孕烯
- C: 炔雌醇
- D: 雌二醇

答案：C

18. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D

- A: 莫沙必利
- B: 多潘立酮
- C: 甲氧氯普胺
- D: 昂丹司琼

答案：B

19. 关于阿司匹林在心血管疾病治疗中的作用描述，错误的是

- A: 调节血脂
- B: 可抑制血小板聚集
- C: 抑制细胞因子的合成
- D: 抑制血管损伤后内膜增生

答案：A

20. 半合成青霉素类中，属于广谱青霉素类的是()

- A: 甲氧西林
- B: 替莫西林
- C: 羧苄西林
- D: 氨苄西林

答案：D

21. 可以引起低钾血症和低镁血症，增加洋地黄中毒危险的是

- A: 胺碘酮
- B: 克拉霉素
- C: 呋塞米
- D: 硫酸镁

答案：C

22. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

- A: 阿利克仑（阿利吉仑）
- B: 氨氯地平
- C: 硝普钠
- D: 阿托普利

答案：D

23. 在肠内吸收水分后膨胀形成胶体，使肠内容物变软，体积增大，反射性增加肠蠕动而刺激排便的是

- A: 乳果糖
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 甘油
- D: 酚酞

答案：B

24. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 高钠血症
- B: 高尿酸血症
- C: 高镁血症
- D: 高钾血症

答案：B

25. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

- A: 二甲双胍
- B: 静脉用胰岛素
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：B

26. (2017 年真题) 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是 ()

- A: 依诺肝素
- B: 华法林
- C: 氨甲环酸
- D: 达比加群酯

答案：B

27. 婴儿尿布皮炎外用激素制剂应限于

- A: 2 周
- B: 3~5 天
- C: 5~7 天

D: 3 天

答案：C

28. 现有调脂药中降低 LDL 作用最强的一类药是

A: 抗氧化剂

B: 他汀类药物

C: 胆固醇吸收抑制剂

D: 胆汁酸结合树脂

答案：B

29. 静脉注射速度不宜超过 50mg/min 的是

A: 氯化钠

B: 氯化钾

C: 氯化钙

D: 枸橼酸钾

答案：C

30. 可使维生素 B

A: 异烟肼

B: 雌激素

C: 丙磺舒

D: 糖皮质激素

答案：B

31. (2016 年真题) 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是

A: 舒巴坦

B: 磷霉素

C: 替考拉宁

D: 利福平

答案: D

32. 抗高血压药物不包括

A: 血管紧张素转化酶抑制药

B: 血管收缩药

C: α 、 β 受体阻断药

D: 肾素抑制药

答案: B

33. 应用阿托品治疗肠痉挛引起口干、心悸、排尿困难是药物的

A: 继发反应

B: 副作用

C: 变态反应

D: 毒性反应

答案: B

34. 呋塞米的利尿作用部位在()

A: 远曲小管初段

B: 肾小球

C: 集合管

D: 髓袢升支粗段

答案: D

35. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

A: 羟基树碱

B: 长春碱

C: 紫杉醇

D: 他莫昔芬

答案: B

36. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

A: 网织红细胞计数

B: 巨核细胞计数

C: 血红蛋白

D: 血清铁蛋白

答案: B

37. 下列不属于一线抗结核药的是

A: 乙硫异烟胺

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 链霉素

答案: A

38. (2015 年真题) 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是 ()。

A: 吗氯贝胺

B: 阿米替林

C: 氟西汀

D: 文拉法辛

答案: A

39. 糖皮质激素隔日疗法用于 ()

A: 抑制器官移植急性排斥危象

B: 肾病综合征

C: 变态反应性疾病

D: 湿疹

答案: B

40. (2015 年真题) 可抑制鲨烯环氧酶的活性, 属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是 ()。

A: 特比萘芬

B: 阿莫罗芬

C: 制霉菌素

D: 联苯苄唑

答案: A

41. 患者男性, 26 岁。主诉发热、全身酸痛, 头痛、乏力等, 伴有阵发性刺激性干咳, 红细胞冷凝集素试验阳性, 血清肺炎支原体抗体阳性。

A: 肝脏损害

B: 过敏反应

C: 胃肠道反应

D: 二重感染

答案: D

42. 阵发性室上性心动过速首选

A: 维拉帕米

B: 阿托品

C: 普罗帕酮

D: 奎尼丁

答案: A

43. 氯霉素的抗菌作用机制是 ()

- A: 抑制细菌的 DNA 合成
- B: 干扰细菌的细胞壁合成
- C: 干扰细菌的 RNA 转录
- D: 抑制细菌的蛋白质合成

答案：D

44. 抑制磷酸二酯酶而加强心肌收缩力的药物是()

- A: 米力农
- B: 螺内酯
- C: 毛花苷丙
- D: 地高辛

答案：A

45. 适用于 IIa、IIb 型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

- A: 烟酸
- B: 考普罗布
- C: 考来烯胺
- D: 洛伐他汀

答案：C

46. 肾功能不全者不需要调整剂量的药物是

- A: 红霉素
- B: 罗红霉素
- C: 氯霉素
- D: 青霉素

答案：A

47. 下列药物中不属于降压药的是()

- A: 左旋多巴
- B: 利血平
- C: 阿利克仑
- D: 肼屈嗪

答案: A

48. 治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

- A: 阿利吉仑
- B: 沙库巴曲缬沙坦
- C: 阿托品
- D: 胺碘酮

答案: C

49. 服用叶酸治疗巨幼细胞贫血，需同时联合使用的药品是()

- A: 维生素 B12
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 B1

答案: A

50. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

- A: 巯嘌呤
- B: 紫杉醇
- C: 枸橼酸他莫昔芬
- D: 吉非替尼

答案: B

51. 以下不属于抗雌激素类药物的是

- A: 他莫昔芬
- B: 来曲唑
- C: 托瑞米芬
- D: 氟他胺

答案：D

52. 以下维生素在注射前需要进行皮肤敏感试验的是

- A: 维生素 B1
- B: 维生素 B6
- C: 维生素
- D: 维生素 B2

答案：A

53. 需要嚼碎服用的药品是

- A: 乳酸菌素片
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 胰酶肠溶片
- D: 泮托拉唑肠溶片

答案：A

54. 巨幼红细胞性贫血可选用()

- A: 尿激酶
- B: 维生素 K
- C: 肝素
- D: 叶酸

答案：D

55. 甲氧苄啶联用利福平使

- A: 半衰期缩短
- B: 白细胞减少风险增加
- C: 抗凝作用增强
- D: 肾毒性增加

答案：A

56. 脂溶性强，能透过血—脑屏障，可通过阻断 M1 受体产生镇静、失眠、意识混乱和认知障碍等不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

- A: 奥昔布宁
- B: 托特罗定
- C: 索利那新
- D: 黄酮哌酯

答案：A

57. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内的 cAMP 含量，缓解慢性心力衰竭症状 ()

- A: 多巴酚丁胺
- B: 氨力农
- C: 地高辛
- D: 硝普钠

答案：B

58. 可用于治疗阴茎勃起功能障碍的药物是

- A: 丙酸睾酮
- B: 炔诺酮
- C: 米非司酮

D: 他达拉非

答案: D

59. 属于吗啡的前药，过量或长期使用易产生成瘾性的是

A: 右美沙芬

B: 可待因

C: 氨溴索

D: 苯丙哌林

答案: B

60. 铂类化合物治疗期间，需要每周检查的项目是

A: 全血计数

B: 血钙

C: 肾功能

D: 肝功能

答案: A

61. 脓疱型痤疮可选用()

A: 酮康唑

B: 阿达帕林

C: 维 A 酸

D: 林旦霜

答案: B

62. 甲氧氯普胺治疗呕吐和促胃肠运动的机制是()

A: 抑制胃壁细胞的 H

B: 阻断 H

C: 抗幽门螺杆菌

D: 阻断 CTZ 的 D

答案：D

63. 患者，女，49 岁。身高 164cm，体重 55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

A: 阿奇霉素

B: 左氧氟沙星

C: 头孢西丁

D: 克林霉素

答案：C

64. 关于维生素用药时间的说法正确的是

A: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐后服用

B: 水溶性维生素应该在餐前服用，脂溶性维生素应该在餐后服用

C: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐前服用

D: 水溶性维生素应该在餐后服用，脂溶性维生素应该在餐中服用

答案：D

65. 排痰功能不良引起的痰液黏稠而不易咳出者可选用

A: 氨溴索

B: 喷托维林

C: 噻托溴铵

D: 沙丁胺醇

答案：A

66. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

A: 来曲唑

B: 甲氨蝶呤

C: 卡莫氟

D: 喜树碱

答案: A

67. (2016 年真题) 对杆菌属类厌氧菌敏感，属于头霉素

A: 氨曲南

B: 头孢美唑

C: 头孢吡肟

D: 亚胺培南

答案: B

68. 用硝基咪唑类药物后出现神经系统反应的是

A: 新生儿

B: 妊娠期妇女

C: 有活动性中枢神经系统疾病者

D: 老人

答案: C

69. 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是()。

A: 头孢他啶

B: 罗红霉素

C: 利奈唑胺

D: 头孢曲松

答案: B

70. 肥胖型 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是()

A: 格列齐特

B: 格列吡嗪

C: 格列本脲

D: 二甲双胍

答案: D

71. 通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

A: 左旋咪唑

B: 哌嗪

C: 甲苯咪唑

D: 阿苯达唑

答案: C

72. 烷化剂

A: 顺铂

B: 喜树碱类

C: 丝裂霉素

D: 环磷酰胺

答案: D

73. (2016 年真题) 12 岁以下儿童禁用的非甾体抗炎药是

A: 阿司匹林

B: 双氯芬酸

C: 塞来昔布

D: 尼美舒利

答案: D

74. 有性激素样副作用的是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氨苯蝶啶
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：C

75. 甲氨蝶呤主要用于

- A: 神经母细胞瘤
- B: 儿童急性白血病
- C: 室管膜瘤
- D: 慢性粒细胞性白血病

答案：B

76. 哌拉西林

- A: 对支原体有效
- B: 对 G⁺、G⁻ 球菌，特别是对 G⁻ 杆菌有效
- C: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效
- D: 对 G⁺、G⁻ 球菌及螺旋体等有效

答案：C

77. 具有利胆作用的药物是()

- A: 肾上腺素
- B: 熊去氧胆酸
- C: 阿托品
- D: 甲氧氯普胺

答案：B

78. 属于环氧酶抑制剂的是

- A: 乙酰唑胺
- B: 双嘧达莫
- C: 替格瑞洛
- D: 阿司匹林

答案：D

79. 变异型心绞痛不宜选用的是

- A: 普萘洛尔
- B: 胍乙啶
- C: 硝苯地平
- D: 硝酸甘油

答案：A

80. 对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是

- A: 拉氧头孢
- B: 氨基糖苷类
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢西丁

答案：B

81. 下列关于睾酮替代治疗的描述，正确的是()

- A: 可直接改善勃起功能障碍
- B: 不能改善性腺功能低下
- C: 通过提高性欲治疗继发性勃起功能障碍
- D: 对年轻患者的作用较老年患者更显著

答案：C

82. 预防脑卒中作用最强的降压药是

- A: 硝苯地平
- B: 沙拉新
- C: 缬沙坦
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

83. 与其他袢利尿药相比，不良反应更大，因此临床使用受到限制，主要用作对磺酰胺类药物过敏或不耐受患者替代药物的是

- A: 布美他尼
- B: 呋塞米
- C: 托拉塞米
- D: 依他尼酸

答案：D

84. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

- A: 氯霉素眼膏
- B: 阿托品滴眼剂
- C: 红霉素眼膏
- D: 左氧氟沙星滴眼剂

答案：D

85. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 链霉素引起的神经毒性
- B: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用
- C: 链霉素引起的过敏性休克

D: 链霉素引起的肾毒性

答案: C

86. 常见体位性低血压的是

A: 十一酸睾酮

B: 非那雄胺

C: 舍尼通

D: 多沙唑嗪

答案: D

87. 属于长效 B₂ 受体激动剂的平喘

A: 多索茶碱

B: 布地奈德

C: 沙美特罗

D: 沙丁胺醇

答案: C

88. 小剂量就有抗焦虑作用的药物是

A: 吗啡

B: 地西泮

C: 苯巴比妥

D: 苯妥英钠

答案: B

89. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: G

B: G

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: M 期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/647053142140010024>