

三基医学试题含答案

一、单选题（共 50 题，每题 1 分，共 50 分）

1、正常止血过程决定于以下哪个因素（ ）

- A、凝血因素正常，骨髓正常，血小板质和量正常
- B、血小板的质和量、血管壁及凝血因素正常
- C、血小板质和量及血管壁的正常
- D、皮肤的完整性及凝血因素的正常
- E、血小板质和量正常，凝血因素正常

正确答案：B

2、在事故现场应将完全离断的断肢（指）（ ）

- A、用乙醇消毒后浸泡于冰水中
- B、冲洗后置塑料袋内，放入有冰块的容器中
- C、直接放入有冰块的容器中
- D、浸泡在冰水中
- E、用清洁布包好放入塑料袋后置加盖容器中，四周放冰块

正确答案：E

3、不是超短波疗法的绝对禁忌证的是（ ）

- A、机体极度衰弱者
- B、戴人工心脏起搏器者
- C、高热病人
- D、使用足够剂量抗癌药物的癌症病人
- E、妇女月经期下腹部

正确答案：D

4、《中华人民共和国医师法》第十一条规定：以师承方式学习中医满（ ），或者经多年实践医术确有专长的，经县级以上人民政府卫生健康主管部门委托的中医药专业组织或者医疗卫生机构考核合格并推荐，可以参加中医医师资格考试

- A、二年
- B、六年
- C、四年
- D、五年
- E、三年

正确答案：E

5、排卵一般发生在何时

- A、下次月经来潮前 10 天
- B、本次月经干净后 14 天左右
- C、月经干净后 3~7 天
- D、下次月经来潮前 14 天左右

正确答案：D

6、毒蛇咬伤早期局部最佳用药为（ ）

- A、中草药局部外敷
- B、0.5%普鲁卡因局部及套式封闭
- C、季德胜蛇药片局部外敷
- D、高锰酸钾溶液冲洗
- E、胰蛋白酶局部注射

正确答案：E

7、慢性肺心病肺动脉高压形成的最主要原因是（ ）

- A、血液黏稠度增加
- B、缺氧引起肺小动脉痉挛
- C、血容量增加
- D、肺小动脉炎
- E、肺气肿压迫及肺光壁破坏使肺毛细血管床减少

正确答案：B

8、下列哪项不是手术日晨护理的内容

- A、进行药物过敏试验
- B、遵医嘱术前用药
- C、取下假牙、发夹、首饰等，并妥善保管
- D、测量生命体征

正确答案：A

9、结节性多动脉炎与系统性红斑狼疮鉴别，下列哪项最具有诊断价值（ ）

- A、白细胞计数增加、嗜酸性粒细胞增加，血小板增加
- B、肾脏损害
- C、关节痛
- D、皮肤红斑
- E、ANA 阳性

正确答案：A

10、急性渗出性湿疹选择哪种剂型最好

- A、软膏
- B、洗剂
- C、溶液
- D、酊剂
- E、霜剂

正确答案：C

11、分析结核菌素试验的结果，下述说法哪项错误（ ）

- A、阳性程度与结核病变严重程度无关
- B、阴性反应不一定排除
- C、如近数月由阴性转为阳性，示近期有结核感染，且肯定为活动性结核病
- D、新近感染或活动性结核病常为强阳性
- E、对未种过卡介苗者，年龄愈小，阳性反应愈表示体内有活动性结核病灶

正确答案：C

12、关于 IgG 的叙述，下列哪项是错误的（ ）

- A、能通过胎盘
- B、IgG1、IgG2、IgG4 的 Fc 段能与 SPA 结合
- C、其作用与抗体完全一样
- D、血清中含量最多
- E、是一种球蛋白

正确答案：C

13、下列哪种属于类固醇激素（ ）

- A、促甲状腺激素
- B、卵泡刺激素
- C、氢化可的松
- D、1, 25 (OH) 2D3
- E、甲状旁腺激素

正确答案：C

14、老年人用药特点，错误的是

- A、强调个体化用药
- B、药物剂型要考虑安全与方便
- C、药物品种宜少且有效
- D、开始剂量宜大

正确答案：D

15、氧疗对哪型缺氧效果最好（ ）

- A、循环性缺氧
- B、低张性缺氧
- C、血液性缺氧
- D、混合性缺氧
- E、组织性缺氧

正确答案：B

16、院前急救中，早期电除颤要求在下列哪项时限内完成（ ）

- A、急救医师到达现场 5 分钟内
- B、接到求救后 5 分钟内
- C、开始救助后 5 分钟内
- D、目击者发现病人 5 分钟内
- E、病人发病后 5 分钟内

正确答案：B

17、头部外伤后昏迷 1 小时即发现右侧肢体轻瘫，腰穿呈血性脑脊液，以后逐渐好转恢复。应考虑为（ ）

- A、脑震荡
- B、急性硬膜下血肿
- C、脑内血肿
- D、脑挫裂伤
- E、急性硬膜外血肿

正确答案：D

18、18 岁女性病人，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄 4 年，近半个月游走性痛，气促，以下哪项最可能提示病人发生了风湿性全心肌炎（ ）

- A、心尖区收缩期Ⅲ级杂音
- B、心包摩擦音
- C、急性肺水肿发作
- D、心电图 PR 间期延长
- E、心脏向双侧扩大

正确答案：B

19、婴幼儿容易发生急性化脓性中耳炎的主要原因是（ ）

- A、咽鼓管峡部较窄
- B、婴幼儿抵抗力低

- C、咽鼓管发育不成熟
- D、婴幼儿上呼吸道感染较常见
- E、咽鼓管短、宽、平直

正确答案：E

20、尿路结石的临床表现，错误的是

- A、膀胱结石典型症状为排尿突然中断, 变换体位又能继续排尿
- B、尿道结石表现为排尿困难和排尿终末疼痛
- C、膀胱结石的临床表现主要是膀胱刺激症状
- D、肾和输尿管结石的主要临床表现有疼痛、血尿

正确答案：B

21、短暂性脑缺血发作的临床特征中不应出现（ ）

- A、发作突然
- B、恢复较快，一般仅遗留较轻的神经功能缺损
- C、常反复发作
- D、用小剂量阿司匹林治疗有效
- E、持续时间短暂，症状和体征在 24 小时内应完全消失

正确答案：B

22、被狂犬咬伤的伤口最好采用（ ）

- A、食醋冲洗
- B、20%肥皂水冲洗
- C、弱酸冲洗
- D、过氧化氢溶液冲洗
- E、90%乙醇冲洗

正确答案：B

23、正常胎动每小时多少次

- A、5~6 次
- B、3~5 次
- C、2~3 次
- D、1~2 次

正确答案：B

24、机械通气时，吸痰操作错误的是

- A、用吸引口鼻腔的吸痰管再吸引气道
- B、吸引负压不超过 19
- C、吸痰前，结合翻身、拍背使痰液从周边肺野向中心集中

D、吸痰前后，适当提高吸入氧浓度

正确答案：A

25、急性肾小球肾炎产生全身性水肿的主要机制是（ ）

A、醛固酮分泌增加

B、肾小球钠水滤过下降

C、血浆胶体渗透压减低

D、抗利尿素释放增多

E、肾小球毛细血管通透性升高

正确答案：B

26、深部脓肿的特点是（ ）

A、局部波动感明显

B、局部仅有红肿现象，但无压痛

C、全身中毒症状不明显

D、局部红、肿、热、痛明显

E、局部红肿，压痛明显，穿刺可抽到脓液

正确答案：E

27、除了哪一项外，下列均为胃溃疡的肉眼病变特点（ ）

A、溃疡深达肌层或浆膜层

B、溃疡呈圆形或椭圆形

C、溃疡通常只有一个

D、溃疡直径一般大于 2cm

E、溃疡底部干净、光滑、边缘整齐

正确答案：D

28、输入大量库存过久的血液易导致（ ）

A、低镁血症

B、高钾血症

C、低钾血症

D、低钠血症

E、高钠血症

正确答案：B

29、牙拔除术后几小时可进食

A、1 小时

B、2 小时

C、3 小时

D、4 小时

正确答案：B

30、拔牙前后不需要常规给予抗生素预防并发症的是（ ）

A、先天性心脏病病

B、糖尿病病人

C、慢性肾病病人

D、慢性肝炎病人

E、风湿性心脏病病人

正确答案：D

31、绿色瘤是（ ）

A、绒毛膜癌阴道转移性结节

B、原始粒细胞在骨组织、骨膜下或软组织中浸润，聚集成肿块

C、血管肉瘤出血，产生胆绿蛋白所致

D、胆管上皮癌因淤胆所致

E、原发性肝细胞癌转移到皮下，分泌胆汁所致

正确答案：B

32、闭式二尖瓣交界分离术最适用于（ ）

A、隔膜型二尖瓣狭窄，心功能 II—III 级

B、二尖瓣狭窄合并关闭不全

C、先天性二尖瓣狭窄

D、二尖瓣狭窄合并房间隔缺损

E、二尖瓣狭窄扩张术后再狭窄

正确答案：A

33、在下列术后出血的原因中，除外哪项

A、未施行加压包扎

B、凝血机制障碍

C、术中止血不完善

D、术后结扎线脱落

正确答案：A

34、内生肌酐清除率 0_{cr} 的正常值为

A、 $>120\text{ml}/\text{min}$

B、 $<50\text{ml}/\text{min}$

C、 $<80\text{ml}/\text{min}$

D、 $80\sim 120\text{ml}/\text{min}$

正确答案：D

35、性病是指

- A、一组通过皮肤接触传染的传染病
- B、一组不能治愈的传染病
- C、一组以性行为作为主要传播途径的传染病
- D、一组以多种不良卫生习惯为主要传播途径的传染病

正确答案：C

36、男，3kg，初生 1 日。皮肤黏膜正常，心肺正常，肝肋下 2cm，脾未扪及，Hb 190g/L，RBC $6.0 \times 10^{12}/L$ ，末梢血涂片可见少量有核红细胞及少量幼稚粒细胞，HbF 0.65，可能诊断是（ ）

- A、新生儿溶血病
- B、新生儿败血症
- C、正常新生儿
- D、新生儿血红蛋白病
- E、新生儿红白血病

正确答案：C

37、正常静脉肾盂造影、肾盂肾盏显影最浓的时间是静脉内注射对比剂后（ ）

- A、60~120 分钟
- B、1~2 分钟
- C、6~10 分钟
- D、15~30 分钟
- E、3~5 分钟

正确答案：D

38、有关急性肾小球肾炎预后，下列哪项叙述是错误的（ ）

- A、因急性肾衰竭救治不当而死亡的多为高龄病人
- B、小于 3%的病人可因急性肾衰竭救治不当而死亡
- C、少数病人镜下血尿及微量尿蛋白有时可迁延半年至 1 年才消失
- D、绝大多数病人于 1~4 周出现利尿、消肿、降压，尿化验也常随之好转
- E、血清 C3 在 4~8 周内恢复正常

正确答案：B

39、急性腹痛伴休克，最常见的病因是（ ）

- A、急性坏死性胰腺炎
- B、大叶性肺炎

- C、急性坏疽性胆囊炎
- D、胃、十二指肠溃疡穿孔
- E、急性心肌梗死

正确答案：A

40、急性呼吸窘迫综合征给氧的浓度为

- A、29%~38%
- B、>50%
- C、21%~28%
- D、39%~50%

正确答案：B

41、下列有关原发性痛经叙述，正确的是

- A、由盆腔炎引起
- B、由宫颈狭窄引起
- C、由子宫内膜异位症引起
- D、生殖器官无器质性病变

正确答案：D

42、发生心室颤动时最主要的处理措施是

- A、安装起搏器
- B、静脉注射利多卡因
- C、电除颤
- D、电复律

正确答案：C

43、周围血片中出现幼红细胞最可能是（ ）

- A、缺铁性贫血
- B、淋巴瘤
- C、溶血性贫血
- D、脾功能亢进
- E、再生障碍性贫血

正确答案：C

44、以下哪项不符合《中华人民共和国医师法》的规定（ ）

- A、医师不得出具与自己执业范围无关或者与执业类别不相符的医学证明文件
- B、执业医师按照国家有关规定，经所在医疗卫生机构同意，可以通过互联网等信息技术提供部分常见病、慢性病复诊等适宜的医疗卫生服务

- C、医师因自愿实施急救造成受助人损害的，需承担民事责任
- D、除按照规范用于诊断治疗外，医师不得使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、放射性药品等
- E、医师开展临床试验应符合国家有关规定，依法通过伦理审查，取得书面知情同意

正确答案：C

45、下列哪一种食物中毒以神经系统症状为主要临床表现，且病死率较高（ ）

- A、沙门菌食物中毒
- B、变形杆菌食物中毒
- C、葡萄球菌食物中毒
- D、肉毒杆菌食物中毒
- E、嗜盐菌食物中毒

正确答案：D

46、下列哪一类肺癌对放射疗法最为敏感（ ）

- A、鳞癌
- B、大细胞
- C、小细胞
- D、细支气管肺泡癌
- E、腺癌

正确答案：C

47、预防切口感染最关键的措施是

- A、改善病人的营养状况
- B、定期更换切口敷料
- C、严格执行无菌操作
- D、足量使用抗生素

正确答案：C

48、肾病综合征病人 24 小时尿蛋白定量常为

- A、 $>3g$
- B、 $>4g$
- C、 $>2g$
- D、 $>3.5g$

正确答案：D

49、肝硬化所致的食管胃底静脉破裂出血病人开始进食的时间应为出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648031004060006035>