专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年四川省沙湾区《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题大全含答案（B卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.对视觉起作用的是

A：视黄醛

B：视黄醇

C：视黄酸

D：维生素A

答案：A

2.属于雄激素类的是

A：他莫昔芬

B：睾酮

C：己烯雌酚

D：甲地孕酮

答案：B

3.药粉接触患者的眼睛，可导致眼睛疼痛、结膜充血的是

A：布地奈德

B：噻托溴铵

C：沙美特罗

D：特布他林

答案：B

4.对抗新产生的血栓应首选

A: 华法林

B: 肝素

C: 尿激酶

D: 右旋糖酐

答案：C

5.维A酸类药物不能用于下述哪种疾病

A: 鱼鳞病

B: 角化异常性皮肤病

C: 银屑病

D: 光敏性皮肤病

答案：D

6.半合成青霉素类中，属于耐青霉素酶青霉素类的是()

A: 甲氧西林

B: 氨苄西林

C: 替莫西林

D: 羧苄西林

答案：A

7.青霉素的抗菌谱不包括

A: 脑膜炎双球菌

B: 破伤风杆菌

C: 伤寒杆菌

D: 肺炎球菌

答案：C

8.治疗血吸虫病的药物是()

A: 氯喹

B: 吡喹酮

C: 乙胺嗪

D: 甲硝唑

答案：B

9.磺酰脲类降糖药的作用机制是

A: 抑制胰岛素降解

B: 加速胰岛素合成

C: 提高胰岛 β 细胞功能

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：D

10.用1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

A: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

B: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

C: 收缩血管，减轻炎症反应

D: 收缩血管，降低其通透性

答案：B

11.常见不良反应为关节痛的药物是()

A: 对氨基水杨酸

B: 吡嗪酰胺

C: 异烟肼

D: 利福平

答案：B

12.关于地高辛作用特点的说法，正确的是

A: 地高辛不经细胞色素P450酶代谢，以原型药物从肾脏排泄

B: 地高辛通过激动Na+-K+-ATP酶增强心肌收缩力

C: 地高辛静脉注射后作用持续时间为2-3h

D: 地高辛口服生物利用度小于50%

答案：A

13.患儿，男，5日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下2．5cm，脾肋下1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

A: 新生儿对头孢曲松不敏感

B: 新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松

C: 新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

D: 新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

答案：B

14.钾离子竞争性酸抑制剂的作用机制是

A: 通过竞争胃壁细胞膜腔面的钾离子来发挥作用

B: 通过二硫键与质子泵的硫基呈不可逆性的结合

C: 抑制乙酰胆碱M受体

D: 竞争性拮抗组胺与胃壁细胞上的H?受体结合

答案：A

15.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1期)伴出血。13C呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史8年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0．9%氯化钠注射液100ml+注射用埃索美拉唑钠40mg，静脉滴注，2次／日；阿莫西林胶囊1g，口服，2次／日；克拉霉素缓释胶囊0．5g，口服，2次／日；注射用蛇毒血凝酶1U，静脉滴注，1次／日；替米沙坦40mg，15服，1次／日；硝苯地平缓释片30mg，口服，1次／日；美托洛尔12．5mg，口服，2次／日；胶体果胶铋胶囊100mg，口服，3次／日。

A: 硝苯地平缓释片

B: 克拉霉素

C: 胶体果胶铋胶囊

D: 埃索美拉唑钠

答案：D

16.阻断白三烯受体,起效缓慢,作用较弱,仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是（）

A: 氟替卡松

B: 茶碱

C: 沙美特罗

D: 孟鲁司特

答案：D

17.以下抗寄生虫药的使用方法错误的是

A: 左旋咪唑驱蛔虫空腹或睡前顿服

B: 蛲虫病易自身重复感染，故在阿苯达唑治疗2周后应重复治疗一次

C: 阿苯达唑治疗蛲虫病一次即为一疗程，药片需用水吞服

D: 氯硝柳胺驱牛带绦虫和猪带绦虫应空腹吞服

答案：D

18.急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

A: 环磷酰胺

B: 甲氨蝶呤

C：长春新碱

D：曲妥珠单抗教师

答案：C

19.呋塞米利尿的主要作用部位是()

A：远曲小管远端

B：远曲小管近端

C：肾小管髓袢升支粗段

D：集合管

答案：C

20.属于广谱抗病毒药物的是

A：阿昔洛韦

B：奥司他韦

C：干扰素

D：阿糖腺苷

答案：C

21.能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中,渗入结核菌体,在菌体内特定酶的作用下化,且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是()

A：乙胺丁醇

B：利福平

C：链霉素

D：吡嗪酰胺

答案：D

22.氨基糖苷类药的主要作用靶点是

A：核糖体的30S亚基

B：核糖体的50S亚基

C：细胞内膜PBP

D：细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案：A

23.患者,男,52岁,BMI28kg/m2,既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病,患者诉昨晚8点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

A：秋水仙碱

B：别嘌醇

C：非布司他

D：碳酸氢钠

答案：A

24.（2017年真题）可以引起耳蜗神经、肾损害的药物是（）

A：多西环素

B：庆大霉素

C：加替沙星

D：甲砜霉素

答案：B

25.用于严重饥饿性酮症严重者的治疗方案是

A：应用高渗透压的25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与20%甘露醇注射液联合应用

B：一般采用50%葡萄糖注射液20～40ml，快速静脉注射

C：可予10%～25%葡萄糖注射液滴注，每日100g葡萄糖即可控制病情

D：一般可给予10%～25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

答案：C

26.长期、单一应用 β

A: 耐药性

B: 头痛

C: 暂时性低血糖

D: 支气管痉挛

答案：A

27.患者，男，25岁。咽炎，注射青霉素后1分钟呼吸急促、面部发绀，心率130次/分，血压60/40mmHg。

A: 青霉素本身诱导机体发生变态反应

B: 青霉素加速抗原抗体结合

C: 青霉素促进机体释放组胺、白三烯等致敏原

D: 青霉素的降解产物诱导机体发生变态反应

答案：D

28.患者男,8岁,静脉滴注美洛西林后立即出现胸气短、呼吸困难喉头水肿,考虑为青霉素类抗生素的过敏反应按照其发生机制,该患者发生的过敏反应在分型上属于（）

A: Ⅰ型变态反应

B: Ⅱ型变态反应

C: Ⅳ型变态反应

D: Ⅲ型变态反应

答案：A

29.（2016年真题）鼻减充血药所致的典型不良反应是

A: 血压升高

B: 血管舒张

C: 心率减慢

D: 共济失调

答案：A

30.静脉滴注促皮质素20～25单位使肾上腺皮质达到最大兴奋，需维持静脉滴注

A: 4小时

B: 10～25分钟

C: 7～12分钟

D: 8小时

答案：D

31.患者男性，26岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

A: 过敏反应

B: 胃肠道反应

C: 二重感染

D: 肝脏损害

答案：C

32.具有负性肌力、负性频率、负性传导作用的药物是

A: 卡托普利

B: 维拉帕米

C: 硝酸甘油

D: 哌唑嗪

答案：B

33.育龄女性在无防护的性生活或避孕失败72小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是（）

A: 炔雌醇去氧孕烯（30g/150g）

B: 十一酸睾酮（40mg）

C: 左炔诺孕酮（1

D: 复方醋酸环丙孕酮（35μg/2mg）

答案：C

34.（2020年真题）患者，男，66岁。BMI24kg/m2，高血压病史15年，冠心病史3年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服1片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体:血压163/83mmHg，心率80次1分。临床诊断为:(1)心绞痛急性发作;(2)心功能不全、心功能III级;(3)高血压病3级;(4)高脂血症。

A: 贝那普利

B: 氨氯地平

C: 呋塞米

D: 阿托伐他汀

答案：C

35.（2019年真题）伴有炎性肠病、溃疡、胃肠道梗阻和腹部手术史的糖尿病患者，不宜使用的降糖药物是（）

A: 吡格列酮

B: 格列美脲

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案：D

36.有明显耳毒性的药物是()

A: 青霉素

B: 四环素

C: 链霉素

D: 磺胺嘧啶

答案：C

37.可增高甲氨蝶呤血浆浓度的药物不包括

A: 水杨酸类

B: 磺胺类

C: 碳酸氢钠

D: 氯霉素

答案：C

38.抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

A: 子宫不规则出血

B: 肾功能损坏

C: 多毛、痤疮

D: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

答案：A

39.其缓释片剂应与食物同服的是

A: 阿奇霉素

B: 红霉素

C: 氨曲南

D: 克拉霉素

答案：D

40.属于III类抗心律失常药的是

A：胺碘酮

B：普罗帕酮

C：利多卡因

D：奎尼丁

答案：A

41.属于芳基乙酸类的是

A：阿司匹林

B：吲哚美辛

C：对乙酰氨基酚

D：塞来昔布

答案：B

42.以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

A：梗阻性肥厚型心肌病

B：急性前壁心肌梗死

C：重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄

D：收缩压<90mmHg的严重低血压

答案：B

43.可引起尖端扭转型室性心律失常的药物是

A：异烟肼

B：吡嗪酰胺

C：红霉素

D：乙胺丁醇

答案：C

44.属于白三烯受体阻断剂的平喘药物是

A：异丙托溴铵

B：孟鲁司特

C：沙丁胺醇

D：茶碱

答案：B

45.患者，男，24岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A：出血性膀胱炎

B：神经毒性

C：骨髓功能抑制

D：药物性肝炎

答案：C

46.用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘，也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

A：沙丁胺醇

B：茶碱

C：孟鲁司特

D：沙美特罗

答案：C

47.关于氢氧化铝叙述正确的是

A：促进肠道磷酸盐的重吸收

B：与胃液混合形成凝胶保护膜

C: 减少胃酸分泌

D: 不易引起便秘

答案：B

48.防止急性深静脉血栓形成的药物是

A: 达肝素钠

B: 维生素B12

C: 香豆素类

D: 维生素K1

答案：A

49.（2018年真题）肾病综合征患者长期使用泼尼松时，用法为隔日清晨给药一次，这种给药方法的原理是（）

A: 利用糖皮质激素与盐皮质激素互为补充的原理

B: 利用糖皮质激素的脉冲式分泌原理

C: 利用人体糖皮质激素分泌的昼夜节律性原理

D: 利用外源性糖皮质激素的生物等效原理

答案：C

50.下列维生素中，属于水溶性的是()。

A: 维生素

B: 维生素A

C: 维生素

D: 维生素

答案：D

51.临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌或对β-内酰胺类抗菌药物过敏的严重感染的抗生素为()

A: 氨曲南

B: 万古霉素

C: 哌拉西林

D: 阿莫西林

答案：B

52.用于血氨升高所致精神症状的治疗

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 精氨酸

C: 复方氨基酸(18AA)

D: 赖氨酸

答案：B

53.（2021年真题）血浆消除半衰期相对较长（14~16min），可间隔30min静脉注射2次……药物是（）

A: 尿激酶

B: 瑞替普酶

C: 替奈普酶

D: 重组链激酶

答案：B

54.促使脓性痰中DNA分解，使脓痰黏度下降的药物是

A: 表面活性剂

B: 乙酰半胱氨酸

C: 糜蛋白酶

D: 氨溴索

答案：C

55.按作用时间分类，属于速效的胰岛素的是()

A：地特胰岛素

B：甘精胰岛素

C：谷赖胰岛素

D：短效胰岛素

答案：C

56.可诱导肝药酶活性的抗结核病药是()

A：吡嗪酰胺

B：利福平

C：异烟肼

D：对氨基水杨酸

答案：B

57.以下属于袢利尿剂禁忌证的是

A：对磺胺过敏的患者

B：高钾血症

C：高血压

D：高血糖

答案：A

58.（2019年真题）患者，女，55岁，诊断为“甲癣”，宜使用的药物是（）

A：氟康唑

B：氟胞嘧啶

C：卡泊芬净

D：特比萘芬

答案：D

59.对急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是()

A: 利多卡因

B: 苯妥英钠

C: 地高辛

D: 胺碘酮

答案：A

60.利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭(肌酐清除率<30ml/min)时可作为首选治疗的利尿药为()

A: 噻嗪类利尿药

B: 碳酸酐酶抑制剂

C: 袢利尿药

D: 留钾利尿药

答案：C

61.谷维素适用于

A: 原发性失眠

B: 神经源性尿崩症

C: 急慢性脑功能不全

D: 内分泌失调引起的失眠

答案：D

62.引起妇女面部和躯体的多毛症，男性若长期应用，可表现为男子女性乳房的是()

A: 十一酸睾酮

B: 普适泰

C：非那雄胺

D：特拉唑嗪

答案：A

63.属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

A：阿那曲唑

B：炔雌醇

C：他莫昔芬

D：氟他胺

答案：A

64.下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

A：毛果芸香碱

B：丙美卡因

C：噻吗洛尔

D：左氧氟沙星

答案：A

65.吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是氢化可的松的

A：15倍

B：100倍

C：25倍

D：40倍

答案：B

66.属于人体必需、人体不能合成或合成速度不能满足人体需要

A：精氨酸

B：复方氨基酸注射液(3AA)

C：赖氨酸

D：复方氨基酸(18AA)

答案：C

67.下列不属于肽类抗生素的是

A：万古霉素

B：去甲万古霉素

C：多黏菌素B

D：利奈唑胺

答案：D

68.主要用于口服给药的广谱青霉素类是

A：庆大霉素

B：头孢哌酮

C：阿莫西林

D：头孢噻肟

答案：C

69.氨基糖苷类的作用特点是

A：在酸性环境中抗菌作用增强

B：口服给药可治疗全身性感染

C：只对繁殖期细菌有杀茵作用

D：日剂量一次给药可达到满意杀菌效果

答案：D

70.属于5-HT3受体阻断剂的止吐药物是

A：甲氧氯普胺

B：甲地孕酮

C：格雷司琼

D：阿瑞吡坦

答案：C

71.以下使用雌激素类药物的方法错误的是

A：有子宫的女性在周期的最后5～7日加用孕激素

B：女性子宫切除后患者采用周期性治疗，即用药3周后停药1周

C：应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应

D：男性患者采用周期性治疗。即用药3周后停药1周

答案：A

72.李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是

A：二甲双胍

B：阿司匹林

C：米氮平

D：辛伐他汀

答案：C

73.噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

A：碳酸酐酶

B：磷酸二酯酶

C：Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运子

D：Na^+-Cl^-共转运子

答案：D

74.下述药物中，不属于促动力药的是

A：氢氧化铝

B：莫沙必利

C：甲氧氯普胺

D：多潘立酮

答案：A

75.大剂量碘剂

A：使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

B：对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

C：使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

D：抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

答案：A

76.下述不属于抗血小板类药物的是

A：磷酸二酯酶抑制剂

B：非特异性纤溶酶原激活剂

C：血栓素A2（TXA2）抑制剂

D：二磷酸腺苷P2Y12受体激动剂

答案：B

77.属于第四代头孢菌素的药物是

A：头孢拉定

B：头孢吡肟

C：头孢噻肟

D：头孢克洛

答案：B

78.属于P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

A：红霉素

B：地高辛

C：利福平

D：烟酸

答案：B

79.作用广泛，主要用于急性心衰，不宜作为心衰常规治疗的药物是

A：地高辛

B：洋地黄毒苷

C：米力农

D：多巴胺

答案：D

80.口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A：妥布霉素

B：新霉素

C：庆大霉素

D：异烟肼

答案：C

81.急性广泛性肺栓塞宜选用()

A：叶酸

B：维生素K

C：尿激酶

D：肝素

答案：C

82.（2018年真题）下列药物中,属于抗乙型肝炎病毒的药物是（）

A：喷昔洛韦

B: 阿德福韦酯

C: 奥司他韦

D: 齐多夫定

答案：B

83.（2018年真题）可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是（）

A: 精蛋白锌胰岛素注射液

B: 普通胰岛素注射液

C: 预混胰岛素注射液

D: 甘精胰岛素注射液

答案：B

84.属于贝丁酸类的调节血脂药是()

A: 非诺贝特

B: 辛伐他汀

C: 依折麦布

D: 烟酸

答案：A

85.糖皮质激素禁用于严重高血压患者是因为

A: 水钠潴留

B: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌

C: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解

D: 抑制蛋白质合成

答案：A

86.阿托品在使用中应注意

A：糖尿病患者避免使用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/648043103124007022