

2024 甘肃省静宁县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题王牌题库【真题汇编】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 链霉素引起的过敏性休克
- B: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用
- C: 链霉素引起的肾毒性
- D: 链霉素引起的神经毒性

答案：A

2. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

- A: 痛风
- B: 骨关节炎
- C: 胃溃疡
- D: 肾绞痛

答案：B

3. 下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

- A: 非诺贝特
- B: 盐酸
- C: 依折麦布
- D: 瑞舒伐他汀

答案：C

4. 不宜与三环类抗抑郁药合用

A: 赛洛唑啉

B: 羟甲唑啉

C: 酚甘油滴耳液

D: 麻黄碱

答案：D

5. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

A: 环氧酶抑制剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 整合素受体阻断剂

D: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

答案：A

6. 维生素 K 为

A: 抗凝血药

B: 抗出血药

C: 抗血小板药

D: 抗贫血药

答案：B

7. 患者，男，63 岁，慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者。因近来夜间喘息加重就诊。对其因迷走神经张力过高所致的气道狭窄，宜选用的药物是

A: 白三烯调节剂

B: 异丙托溴铵

C: 吸入型糖皮质激素

D: 沙丁胺醇

答案: B

8. 下列药物与甲氧氯普胺合用，可增加锥体外系不良反应风险的是

A: 金刚烷胺

B: 干扰素

C: 奥司他韦

D: 阿昔洛韦

答案: A

9. 与奥美拉唑、替硝唑三联治疗胃溃疡的药物是

A: 克林霉素

B: 氨曲南

C: 红霉素

D: 克拉霉素

答案: D

10. (2016 年真题) 不属于口服避孕药所致不良反应的是

A: 增加血栓栓塞性疾病风险

B: 突破性出血

C: 低钙血症

D: 月经失调

答案: C

11. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

- A: 修复消化道黏膜
- B: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动
- C: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- D: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素

答案：B

12. 主要用于口服给药的广谱青霉素类是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢哌酮
- C: 阿莫西林
- D: 庆大霉素

答案：C

13. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和 () 联合有协同作用。

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: β 受体阻断剂
- C: 人促红素
- D: 留钾利尿剂

答案：B

14. 为最受推荐的常规避孕药，择期手术和长期卧床者，需在手术前一个月停止使用的是

- A: 孕激素

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 长效避孕药
- C: 雌激素
- D: 短效口服避孕药

答案：D

15. 大剂量雌激素用于()

- A: 痛经
- B: 回奶
- C: 绝经期综合征
- D: 再生障碍性贫血

答案：B

16. 下述药物用于治疗消化性溃疡时，不属于抑制胃酸分泌的药物是

- A: 氢氧化铝
- B: 泮托拉唑
- C: 奥美拉唑
- D: 雷尼替丁

答案：A

17. 以下关于 PPI 用法用量的描述，错误的是

- A: 泮托拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次
- B: 艾司奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次
- C: 泮托拉唑静脉给药用于急性上消化道出血时，一次 40mg~80mg，每日 1~2 次
- D: 奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

答案：D

18. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是()

- A: 硫酸鱼精蛋白
- B: 氨甲苯酸
- C: 维生素 B

D: 维生素 K

答案：D

19. 患者，女，十二指肠溃疡，幽门螺杆菌(+)，可选用

A: 双氯西林

B: 阿莫西林

C: 万古霉素

D: 苄星青霉素

答案：B

20. 与克拉霉素和兰索拉唑联合治疗幽门螺杆菌感染的药物是

A: 羟氨苄青霉素

B: 大观霉素

C: 庆大霉素

D: 替考拉宁

答案：A

21. 对曲霉属无效的药物是()

A: 两性霉素 B

B: 伏立康唑

C: 伊曲康唑

D: 氟康唑

答案：D

22. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌证()

A: 心力衰竭患者

B: 有子宫内膜癌症状和体征者

C: 肝、肾功能不全者

D: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者

答案: A

23. 链激酶的作用机制是

A: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子

B: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用

C: 抑制血小板聚集

D: 促进纤维蛋白溶解

答案: D

24. 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法错误的是()

A: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物

B: 甲硝唑有致突变和致畸作用

C: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深

D: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短

答案: A

25. 肝素过量可选用的拮抗药是()

A: 鱼精蛋白

B: 氨甲苯酸

C: 葡萄糖酸钙

D: 维生素 K1

答案: A

26. (2015 年真题) 长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充()。

A: 维生素 E 和叶酸

B: 维生素 A 和维生素 D

C: 维生素 C 和烟酸

D: 维生素 B 和维生素 K

答案：D

27. 下列药物能抑制尿酸生成的是

A: 丙磺舒

B: 非布司他

C: 秋水仙碱

D: 呋塞米

答案：B

28. 服用时必须坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是

A: 依普黄酮

B: 依降钙素

C: 阿仑膦酸钠

D: 雷洛昔芬

答案：C

29. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物是()

A: 胺碘酮

B: 苯妥英钠

C: 利多卡因

D: 地高辛

答案：B

30. 与甘露醇相比，甘油果糖具有的特点不包括

A: 起效更快，维持作用时间较长

- B: 对患者电解质的平衡无明显影响
- C: 利尿作用小
- D: 可为患者提供一定的能量

答案：A

31. 易在甲状腺功能减退患者体内蓄积的药物是()

- A: 阿托品
- B: 哌替啶
- C: 洋地黄毒苷
- D: 利多卡因

答案：C

32. 与 DNA 结合，进而抑制 DNA 和 RNA 合成

- A: 高三尖杉酯碱
- B: 顺铂
- C: 氟尿嘧啶
- D: 紫杉醇

答案：B

33. 壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

- A: pH
- B: 浓度
- C: 作用面积
- D: 剂型

答案：A

34. 下列利尿剂中，属于碳酸酐酶抑制剂的是

- A: 阿米洛利

- B: 布美他尼
- C: 氢氯噻嗪
- D: 乙酰唑胺

答案：D

35. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ的药物是()

- A: 阿莫西林
- B: 红霉素
- C: 氧氟沙星
- D: 异烟肼

答案：C

36. 临床常用的以原型药从尿液中排出的中效强心苷类药是

- A: 洋地黄毒苷
- B: 毛花苷丙（西地兰 C）
- C: 地高辛
- D: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

答案：C

37. 属于维生素 K 类抗出血药的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 氨甲环酸
- C: 艾曲泊帕乙醇胺
- D: 酚磺乙胺

答案：A

38. （2016 年真题）具有抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取作用，用于难治性抑郁症且疗效明显的抗抑郁药是

- A: 文拉法辛
- B: 阿米替林
- C: 西酞普林
- D: 马普替林

答案：A

39. 甲氧苄啶的抗菌机制是

- A: 抑制二氢叶酸还原酶
- B: 破坏细菌细胞壁
- C: 抑制二氢蝶酸合成酶
- D: 抑制 DNA 螺旋酶

答案：A

40. 痛风缓解期(关节炎症控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是()。

- A: 泼尼松龙
- B: 布洛芬
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：C

41. 次水杨酸铋是

- A: 抗分泌药
- B: 微生态制剂
- C: 抗动力药
- D: 吸附剂

答案：A

42. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

- A: 红霉素
- B: 罗红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 万古霉素

答案：D

43. 不可逆地抑制血小板 I 相和 II 相聚集的药物是

- A: 尿激酶
- B: 噻氯匹定
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：B

44. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

- A: 制霉菌素
- B: 膦甲酸钠
- C: 奥司他韦
- D: 两性霉素 B

答案：D

45. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

- A: 绒毛膜性素
- B: 噻啉啉
- C: 米非司酮
- D: 硝苯地平

答案：A

46. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

- A: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄
- B: 收缩压<90mmHg 的严重低血压
- C: 急性前壁心肌梗死
- D: 梗阻性肥厚型心肌病

答案：C

47. 普芦卡必利为泻药的作用机制是

- A: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用
- B: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快
- C: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- D: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

答案：D

48. 有耳毒性的药物是

- A: 螺内酯
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：D

49. 可用于配合防治肝性脑病的泻药为

- A: 硫酸镁
- B: 酚酞
- C: 甘油
- D: 乳果糖

答案：D

50. 促进子宫颈成熟的是()

- A: 达那唑
- B: 米非司酮
- C: 戈那瑞林
- D: 普拉睾酮

答案：D

51. 单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

- A: 帕洛诺司琼
- B: 甲氧氯普胺
- C: 氯丙嗪
- D: 劳拉西泮

答案：D

52. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: 大剂量碘制剂
- B: 甲状腺素
- C: 小剂量碘制剂
- D: None

答案：B

53. 使用后可产生抗体，1 年内不宜再次使用的药物是

- A: 链激酶
- B: 瑞替普酶
- C: 阿替普酶
- D: 尿激酶

答案：A

54. 羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶 A 的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶（HMG—CoA 还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B 水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

- A: 20mg 瑞舒伐他汀，每日 1 次
- B: 40mg 洛伐他汀，每日 1 次
- C: 40mg 氟伐他汀，每日 1 次
- D: 10mg 阿托伐他汀钙，每日 1 次

答案：D

55. 适用于各型疟疾，但主要用于抗氯喹恶性疟治疗和凶险型恶性疟的急救的药物是

- A: 双氢青蒿素
- B: 蒿甲醚
- C: 奎宁
- D: 乙胺嘧啶

答案：B

56. (2015 年真题) 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是 ()。

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 噻托溴铵
- D: 多索茶碱

答案: C

57. 主要经胆汁排泄 (仅有 5% 左右经肾排泄)，可用于肾功能轻中度不全患者的磺酰脲类药物是 ()

- A: 格列齐特
- B: 格列喹酮
- C: 格列吡嗪
- D: 格列美脲

答案: B

58. 常用于痤疮的治疗，因易引起前庭神经毒性，已不作为脑膜炎治疗药的是

- A: 氯霉素
- B: 多西环素
- C: 青霉素
- D: 米诺环素

答案: D

59. (2017 年真题) 眼部病毒感染宜选用 ()

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 碘苷滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂

D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：B

60. 抗生素类抗真菌药()

A: 阿莫罗芬

B: 特比萘芬

C: 氟康唑

D: 两性霉素

答案：D

61. (2020 年真题) 为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

A: 孟鲁司特片

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 羧甲司坦口服液

D: 布地奈德福莫特罗吸入剂

答案：D

62. 体内缺乏维生素 E 会导致

A: 孕育异常

B: 脚气病

C: 夜盲症

D: 佝偻病

答案：A

63. 合用可减轻氟尿嘧啶所引起的骨髓功能抑制，并可能改进治疗指数的是

A: 西咪替丁

B: 别嘌醇

C: 甲氨蝶呤

D: 阿司匹林

答案: B

64. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

A: 甲萘氢醌

B: 氨甲环酸

C: 酚磺乙胺

D: 鱼精蛋白

答案: B

65. (2019 年真题) 用于治疗水肿性疾病，当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时，可追加剂量，每日最大剂量可达 600mg，但一般应控制在 100mg 以内的利尿剂是 ()

A: 呋塞米

B: 布美他尼

C: 依他尼酸

D: 托拉塞米

答案: A

66. 属于第三代喹诺酮类药物的是

A: 诺氟沙星

B: 萘啶酸

C: 吡哌酸

D: 莫西沙星

答案: A

67. (2016 年真题) 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

- A: 罗红霉素
- B: 头孢曲松
- C: 利奈唑胺
- D: 头孢他啶

答案：A

68. 不可与氟西汀合用的是

- A: 单胺氧化酶抑制剂
- B: 竞争性 β -内酰胺酶抑制剂
- C: 核酸合成抑制剂
- D: 肝药酶抑制剂

答案：A

69. 眼底检查时的快速短效扩瞳药

- A: 异丙肾上腺素
- B: 去氧肾上腺素
- C: 多巴胺
- D: 去甲肾上腺素

答案：B

70. 下述可用于治疗甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血的是

- A: 叶酸
- B: 亚叶酸钙
- C: 维生素 B
- D: 叶酸+维生素 B

答案：B

71. 现有调脂药中降低 LDL 作用最强的一类药是

- A: 他汀类药物
- B: 抗氧化剂
- C: 胆汁酸结合树脂
- D: 胆固醇吸收抑制剂

答案：A

72. 关于胶体果胶铋用药教育的说法,错误的是()

- A: 胶体果胶铋宜与牛奶同时服用
- B: 胶体果胶铋使用后口中可能有氨味
- C: 妊娠期妇女禁用胶体果胶铋
- D: 胶体果胶铋使用后大便可能会变黑

答案：A

73. (2019 年真题) 长期用药易发生低镁血症的药物是 ()

- A: 胶体果胶铋
- B: 复方碳酸钙
- C: 奥美拉唑
- D: 替普瑞酮

答案：C

74. (2018 年真题) 仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是 ()

- A: 雷洛昔芬
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 骨化三醇
- D: 阿法骨化醇

答案：A

75. 属于润滑性泻药的是

- A: 甘油（开塞露）
- B: 酚酞
- C: 乳果糖
- D: 聚乙二醇 4000

答案：A

76. 抑制骨髓造血功能的是

- A: 氯霉素
- B: 庆大霉素
- C: 四环素
- D: 红霉素

答案：A

77. （2017 年真题）属于抗孕激素类药，用于终止早孕的药物是（）

- A: 甲地孕酮
- B: 黄体酮
- C: 米非司酮
- D: 左炔诺孕酮

答案：C

78. 关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述错误的是（）

- A: 利妥昔单抗主要用于淋巴瘤的治疗
- B: 贝伐珠单抗作用于血管内皮生长因子
- C: 对癌细胞和正常体细胞都有"杀灭"作用
- D: 静脉滴注可致过敏样反应

答案：C

79. 被称为餐时血糖调节剂，无需餐前 0.5h 服用的是

- A: 艾塞那肽
- B: 格列齐特
- C: 利拉鲁肽
- D: 瑞格列奈

答案：D

80. (2016 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的是

- A: 非诺贝特
- B: 阿昔莫司
- C: 阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：D

81. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 紫杉醇
- B: 枸橼酸他莫昔芬
- C: 吉非替尼
- D: 巯嘌呤

答案：B

82. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 两药合用正常情况下不会引发低血糖
- B: 可能出现的不良反应有腹痛、腹泻、腹胀
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 服药过程中适当补充维生素 B12

答案：A

83. 肝素的抗凝作用特点是

- A: 必须有维生素 K 辅助
- B: 仅在体内有效
- C: 作用缓慢
- D: 体内、体外均有效

答案：D

84. β_1 受体激动后的影响是

- A: 脂肪分解
- B: 肌肉震颤
- C: 支气管扩张
- D: 增加心率

答案：D

85. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

- A: 普通胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 格列喹酮

答案：D

86. 患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是（
）

- A: 蓖麻油
- B: 硫酸镁
- C: 普芦卡必利

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 乳果糖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/648053010042007022>