

# 医务人员分级防护

1. 普通防护
2. 一级防护
3. 二级防护
4. 三级防护

# 医务人员分级防护

## 普通防护

- 适合用于在医院传染病区、发烧门急诊以外从事诊疗工作医护人员
- 工作时应穿工作服、戴工作帽和医用口罩

# 普通防护



# 医务人员分级防护

## ■ 一级防护：

适合用于初筛门诊、发烧门（急）诊医务人员。

- 工作时应穿工作服、隔离衣、戴工作帽和防护口罩，必要时戴乳胶手套。

# 一级防护



# 医务人员分级防护

- **二级防护**：适合用于进入发烧留观室、专门病区医务人员，接触从病人身上采集标本、处理其分泌物、排泄物、使用过物品和死亡病人尸体工作人员，转运病人医务人员和司机。
- 医务人员必须戴防护口罩，穿工作服、防护服或隔离衣、鞋套，戴手套、工作帽

# 二级防护



# 医务人员分级防护

- **三级防护：** 适合用于为病人实施吸痰、气管插管和气管切开医务人员。除二级防护外，还应该加戴面罩或全方面型呼吸防护器。
-

# 三级防护



4/29/2003


# 物品准备

1. 防护口罩
2. 一次性帽子
3. 防护服
4. 眼罩
5. 胶鞋、防渗透围裙
6. 一次性手套
7. 加强型防护手套
8. 污物袋

# 穿戴防护用具次序

- 1洗手
- 2戴帽子
- 3戴口罩
- 4穿防护服
- 5戴眼罩
- 6穿鞋套
- 7洗手
- 7戴手套

# 戴口罩程序



1. 穿过口罩带托起口罩




2. 罩住口鼻

3. 固定颈部口罩带

4. 固定头部口罩带

5. 固定鼻夹

6. 密合测试




# 口罩分类

- 普通医用口罩

对致病性微生物防护作用不确切，可用于普通环境下一次性卫生护理，或者致病性微生物以外颗粒如花粉等阻隔或防护。

## ■ 医用外科口罩

适合用于医务人员或相关人员基本防护，以及在有创操作过程中阻止血液、体液和飞溅物传输防护



- 医用防护口罩（ N95口罩）

适合用于医务人员和相关工作人员对经空气传输呼吸道传染病防护，防护等级高

- N95型口罩是NIOSH（美国国家职业安全卫生研究所）认证9种防颗粒物口罩中一个。“N”意思是不适合油性颗粒（炒菜产生油烟就是油性颗粒物，而人说话或咳嗽产生飞沫不是油性）；“95”是指，在NIOSH标准要求检测条件下，过滤效率到达95%。N95不是特定产品名称。只要符合N95标准，而且经过NIOSH审查产品就能够称为“N95型口罩”。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648054065127006111>