

## 2024 年河北省《执业药师之西药学专业二》 资格考试必刷 200 题内部题库及参考答案 AB 卷

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 重症肌无力、癫痫患者避免使用的抗菌药是

- A: 甲硝唑
- B: 哌拉西林
- C: 左氧氟沙星
- D: 米诺环素

答案：C

2. 可能诱发心绞痛的降压药是

- A: 肼屈嗪
- B: 可乐定
- C: 普萘洛尔
- D: 哌唑嗪

答案：A

3. 属于 I B 类抗心律失常药

- A: 胺碘酮
- B: 奎尼丁
- C: 普萘洛尔
- D: 利多卡因

答案：D

4. 下列不属于中效利尿药的是

- A: 氢氟噻嗪
- B: 氨苯蝶啶
- C: 呋噻帕胺
- D: 氢氯噻嗪

**答案：B**

5. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 尿激酶
- B: 瑞替普酶
- C: 阿替普酶
- D: 链激酶

**答案：D**

6. （2019 年真题）原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是（）

- A: 地塞米松片 10mgqd
- B: 泼尼松片 50mgqd
- C: 泼尼松片 30mgqd
- D: 泼尼松片 20mgqd

**答案：B**

7. 长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

- A: 普罗帕酮
- B: 利多卡因
- C: 索他洛尔

D: 胺碘酮

**答案：D**

8. 两性霉素 B 与 ( ) 合用具有协同作用。

A: 利福平

B: 酮康唑

C: 伊曲康唑

D: 氟胞嘧啶

**答案：D**

9. (2016 年真题) 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是

A: 甲氧氯普胺

B: 阿瑞吡坦

C: 维生素 B6

D: 托烷司琼

**答案：B**

10. 高血压合并脑血管功能不全不宜选用

A: 氢氯噻嗪

B: 普萘洛尔

C: 胍乙啶

D: 肼屈嗪

**答案：C**

11. 以下所列药物中，能促进小肠对维生素 D 的吸收是

A: 矿物油

B: 硫酸铝

C: 雌激素

D: 考来烯胺

**答案: C**

12. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者应禁用

A: 伯氨喹

B: 哌嗪

C: 替硝唑

D: 奎宁

**答案: A**

13. 治疗青光眼宜选用

A: 拉坦前列素滴眼剂

B: 托吡卡胺滴眼剂

C: 碘苷滴眼剂

D: 氯霉素滴眼剂

**答案: A**

14. (2016 年真题) 减少钠离子内流而使神经细胞稳定, 属于乙内酰脲类的是抗癫痫药

A: 丙戊酸钠

B: 卡马西平

C: 苯妥英钠

D: 苯巴比妥

**答案: C**

15. 全身用药毒性大, 仅局部用的抗病毒药是()

A: 金刚烷胺

B: 阿昔洛韦

C: 碘苷

D: 阿糖腺苷

**答案: C**

16. 能明显抑制骨髓造血功能的药物是

A: 庆大霉素

B: 红霉素

C: 青霉素 G

D: 氯霉素

**答案: D**

17. 异烟肼抗结核杆菌的作用原理是

A: 抑制蛋白质合成

B: 抑制 RNA 多聚酶

C: 抑制分枝菌酸合成

D: 与锌离子络合、影响戊糖代谢

**答案: C**

18. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是()

A: 促进 K

B: 促进 Ca

C: 抑制 Na

D: 抑制 Ca

**答案: C**

19. 糖尿病合并心血管疾病者可选用()

A: 格列吡嗪

B: 格列齐特

C: 格列喹酮

D: 胰岛素

**答案：A**

20. 抗菌谱极窄，仅对细胞外的结核分枝杆菌有抑制作用的是

A: 克拉霉素

B: 对氨基水杨酸

C: 红霉素

D: 氟曲南

**答案：B**

21. 用于治疗焦虑、镇静、催眠、惊厥症、肌紧张性头痛的药物是

A: 地西泮

B: 苯巴比妥

C: 唑吡坦

D: 卡马西平

**答案：A**

22. 以下属于袢利尿剂禁忌证的是

A: 高钾血症

B: 高血压

C: 高血糖

D: 对磺胺过敏的患者

**答案：D**

23. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

。

- A: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加
- B: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素
- C: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- D: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

**答案：D**

24. 口服吸收少，用于肠道感染的是

- A: 甲氧苄啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 呋喃唑酮
- D: 氧氟沙星

**答案：C**

25. （2019 年真题）沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

- A: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换
- B: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- C: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- D: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

**答案：B**

26. 下列属于非选择性  $\beta$  受体阻断剂的是

- A: 比索洛尔
- B: 阿替洛尔
- C: 美托洛尔
- D: 普萘洛尔

**答案：D**

27. 下列说法中错误的是

- A: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬
- B: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药
- C: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑
- D: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者

**答案：D**

28. 高血压伴甲状腺功能亢进者宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 利血平
- C: 普萘洛尔
- D: 尼莫地平

**答案：C**

29. 有关阿莫西林特点的说法正确的是()

- A: 对耐药金黄色葡萄球菌有效
- B: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效
- C: 耐酸、耐酶
- D: 口服吸收差，生物利用度小

**答案：B**

30. 对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

- A: 洗剂
- B: 油剂
- C: 粉剂
- D: 乳膏剂

**答案：D**

31. 治疗绝经后妇女的骨质疏松选用

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 阿法骨化醇
- C: 鲑降钙素
- D: 奥利司他

**答案：A**

32. 可用于肝性脑病的治疗的是

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸注射液（3AA）
- C: 精氨酸
- D: 复方氨基酸注射液（18AA）

**答案：C**

33. 代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性（）

- A: 环磷酰胺
- B: 纳武利尤单抗
- C: 巯嘌呤
- D: 氟尿嘧啶

**答案：A**

34. 下列关于蛇毒血凝酶的给药途径，错误的是

- A: 皮下注射
- B: 肌肉注射
- C: 口服给药
- D: 静脉注射

**答案：C**

35. (2017 年真题) 属于抗雄性激素的肿瘤药是 ( )

- A: 炔雌醇
- B: 氟他胺
- C: 他莫昔芬
- D: 阿那曲唑

**答案: B**

36. 克拉霉素与环孢素合用 ( )

- A: 后者血药浓度下降，药效降低
- B: 药理作用拮抗
- C: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- D: 不良反应叠加

**答案: C**

37.  $\beta$ -溶血性链球菌产生的一种蛋白质，现已有基因重组产品的是 ( )

- A: 叶酸
- B: 尿激酶
- C: 链激酶
- D: 重组人促红素

**答案: C**

38. 地衣芽孢杆菌活菌以活菌形式进入肠道后，拮抗的致病菌是

- A: 乳酸杆菌
- B: 葡萄球菌
- C: 拟杆菌
- D: 双歧杆菌

**答案: B**

39. 激动 I<sub>1</sub> 咪唑啉受体的降压药是

- A: 利血平
- B: 吡那地尔
- C: 可乐定
- D: 胍屈嗪

**答案：C**

40. 长期大量服用维生素 A 会出现

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

**答案：C**

41. 下列不属于强心苷类正性肌力药的是

- A: 洋地黄毒苷
- B: 地高辛
- C: 去乙酰毛花苷
- D: 多巴胺

**答案：D**

42. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

- A: 紫杉醇
- B: 长春碱
- C: 羟喜树碱
- D: 他莫昔芬

**答案：B**

43. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活
- B: 能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除
- C: 体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程
- D: 通过增强抗凝血酶 III (AT-III) 的活性，抑制凝血因子 IIa 和 Xa 发挥抗凝作用

**答案：D**

44. (2020 年真题) 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 甲氨蝶呤
- C: 曲妥珠单抗
- D: 长春新碱

**答案：D**

45. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向选用

- A: 尿激酶
- B: 氨甲环酸
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 K

**答案：D**

46. 目前治疗肺孢子菌病首选的药物是

- A: 卡泊芬净

- B: 氨曲南
- C: 特比萘芬
- D: 复方磺胺甲噁唑

**答案：D**

47. 主要不良反应为踝部关节水肿的药物是()

- A: 依那普利
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 硝酸甘油

**答案：B**

48. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

- A: 碱化尿液，促进尿酸排泄
- B: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿酸量
- C: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- D: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

**答案：D**

49. (2016 年真题) 属于碳青霉烯类

- A: 亚胺培南
- B: 头孢美唑
- C: 氨曲南
- D: 头孢吡肟

**答案：A**

50. 长期使用可引起骨质疏松的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 依替膦酸二钠
- C: 甲状腺素
- D: 胰岛素

**答案：A**

51. 存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 表柔比星
- B: 卡莫司汀
- C: 多西他赛
- D: 泼尼松

**答案：A**

52. 关于钙制剂临床应用中的注意事项描述，错误的是()

- A: 钙在体内的吸收随着钙的摄入量增加而增加
- B: 补钙应选用含钙量高、生物利用度好、溶出度高的制剂
- C: 同时补充维生素 D
- D: 钙制剂与肾上腺皮质激素、异烟肼、四环素或含铝抗酸药不宜同时服用

**答案：A**

53. 氨基酸的主要作用不包括

- A: 维持氮平衡
- B: 合成蛋白质
- C: 调节体内酸碱平衡
- D: 转变为糖或脂肪

**答案：C**

54. 可使磷酰化胆碱酯酶复活的药物

- A: 毒扁豆碱
- B: 匹鲁卡品
- C: 碘解磷定
- D: 阿托品

**答案: C**

55. (2019 年真题) 与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是 ( )

- A: 多烯磷脂酸胆碱
- B: 甘草酸二铵
- C: 葡醛内酯
- D: 还原型谷胱甘肽

**答案: D**

56. 属于  $\beta$  受体阻断剂的降低眼压药是 ( )

- A: 噻吗洛尔
- B: 甘露醇
- C: 毛果芸香碱
- D: 曲伏前列素

**答案: A**

57. 阿司匹林的抗血小板作用机制为

- A: 抑制血小板中 TXA
- B: 抑制内皮细胞中 TXA
- C: 促进内皮细胞中 PGI
- D: 激活环氧酶

**答案：A**

58. 不属于茶碱适应证的是

- A: 喘息型支气管炎
- B: 阻塞性肺气肿
- C: 支气管哮喘
- D: 过敏性鼻炎

**答案：D**

59. 患者，男，56 岁，诊断为肝性脑病Ⅳ级，建议给予该患者使用的氨基酸是

- A: 芳香族氨基酸
- B: 杂环氨基酸
- C: 支链氨基酸
- D: 脂肪族氨基酸

**答案：C**

60. 小剂量孕激素用于

- A: 回奶
- B: 绝经期综合征
- C: 痛经
- D: 再生障碍性贫血

**答案：C**

61. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 赛洛唑啉
- C: 麻黄碱

D: 羟甲唑啉

**答案: D**

62. 关于替加环素的使用，错误的是

A: 替加环素是 P—gp 的底物

B: 肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整

C: 8 岁以下儿童禁用替加环素

D: 替加环素抑制 CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6 和 3A4 介导的药物代谢

**答案: D**

63. 作用机制是竞争雌激素受体的是

A: 枸橼酸他莫昔芬

B: 吉非替尼

C: 紫杉醇

D: 巯嘌呤

**答案: A**

64. 利多卡因的电生理作用错误的是()

A: ERP 相对延长

B: 降低自律性

C: 缩短 APD

D: 显著减慢传导

**答案: D**

65. 头孢噻吩

A: 用于非典型病原体感染

B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D: 肾毒性较大

**答案: D**

66. 下列药物中，没有降低眼压作用的药物是()

A: 阿托品

B: 比马前列素

C: 毛果芸香碱

D: 噻吗洛尔

**答案: A**

67. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A: 喹碘方

B: 依米丁

C: 替硝唑

D: 氯喹

**答案: D**

68. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

B: 阿托品+新斯的明

C: 胆碱酯酶复活药

D: 阿托品

**答案: A**

69. 以下抗心律失常药中，对光过敏的是

A: 利多卡因

B: 胺碘酮

C: 奎尼丁

D: 普萘洛尔

**答案: B**

70. 幼儿甲状腺素不足易患

A: 单纯性甲状腺肿

B: 呆小病

C: 侏儒症

D: 黏液性水肿

**答案: B**

71. 重组人促红素的最佳适应证是

A: 严重再生障碍性贫血

B: 严重缺铁性贫血

C: 慢性肾衰竭所致贫血

D: 化疗药物所致贫血

**答案: C**

72. 下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

A: 月经期妇女

B: 精神病患者

C: 中、老年人

D: 妊娠期妇女

**答案: D**

73. 直接舒张小动脉平滑肌的降压药是

A: 肼屈嗪

B: 硝苯地平

C: 氢氯噻嗪

D: 利血平

**答案: A**

74. 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

B: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

C: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

**答案: B**

75. (2017 年真题) 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是 ()

A: 氨甲环酸

B: 依诺肝素

C: 达比加群酯

D: 华法林

**答案: D**

76. 以下为广谱抗病毒药的是

A: 更昔洛韦

B: 碘苷

C: 利巴韦林

D: 阿糖腺苷

**答案: C**

77. 秋水仙碱的注意事项错误的是

- A: 尽量避免静脉注射和长期口服给药
- B: 肾功能下降时可造成蓄积
- C: 可致可逆性维生素 B
- D: 不可用于长期痛风的预防

**答案：C**

78. 辛伐他汀用于心血管事件高危人群的初始剂量是

- A: 10mg
- B: 15mg
- C: 5mg
- D: 20~40mg

**答案：D**

79. 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 头痛、胸闷、气急、出汗
- B: 喉头水肿、尿潴留
- C: 血压升高或降低、心率加快
- D: 发热、血管扩张、面色潮红

**答案：B**

80. 可用于单纯疱疹性角膜炎的药物是

- A: 碘苷
- B: 阿托品
- C: 奥布卡因
- D: 20%甘露醇

**答案：A**

81. 喹诺酮类药物作用机制

- A: 抑制细菌糖代谢
- B: 抑制细菌细胞壁合成
- C: 干扰细菌核酸代谢
- D: 抑制细菌蛋白质合成

**答案：C**

82. 吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是  
( )

- A: 金刚烷胺
- B: 奥司他韦
- C: 金刚乙胺
- D: 扎那米韦

**答案：B**

83. 特比萘芬属于 ( )

- A: 唑类抗真菌药
- B: 多烯类抗真菌药
- C: 棘白菌素类抗真菌药
- D: 丙烯胺类抗真菌药

**答案：D**

84. 以下哪个选项不是二磷酸果糖的不良反应

- A: 乳酸中毒
- B: 尿潜血、血色素尿
- C: 低钠及低磷血症
- D: 低钾血症

**答案：C**

85. 属于  $\alpha_1$  受体阻断药，用于治疗良性前列腺增生症的是()

- A: 坦洛新
- B: 西地那非
- C: 度他雄胺
- D: 他达拉非

**答案: A**

86. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

- A: 甲氧苄啶
- B: 复方新诺明
- C: 磺胺嘧啶
- D: 磺胺多辛

**答案: C**

87. 长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

- A: 动脉粥样硬化
- B: 应激性大出血
- C: 血小板减少症
- D: 骨质疏松性骨折

**答案: D**

88. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

- A: 磺胺甲
- B: 磺胺嘧啶
- C: 磺胺米隆

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 柳氮磺吡啶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/648065076045007022>