

临床药物治疗学考试模拟题含参考答案

一、单选题（共 70 题，每题 1 分，共 70 分）

1、肺炎治疗的最主要环节是

- A、药敏试验
- B、物理治疗
- C、抗感染治疗
- D、病情评价
- E、病原检查

正确答案：C

2、对高血压危象者宜选用

- A、硝普钠或硝酸甘油
- B、 α 受体阻断剂或利尿剂
- C、利尿剂或醛固酮受体拮抗剂
- D、血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素 II 受体阻断剂
- E、 β 受体阻断剂和血管紧张素转换酶抑制剂

正确答案：A

3、可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用的是

- A、喷托维林
- B、苯丙哌林
- C、可待因
- D、右美沙芬
- E、羧甲司坦

正确答案：D

4、为抑制胃酸分泌宜选用

- A、奥美拉唑+阿莫西林+克拉霉素
- B、兰索拉唑
- C、甲氧氯普胺
- D、颠茄
- E、硫糖铝

正确答案：B

5、下列症状不是高血压临床表现的是

- A、心悸
- B、口干
- C、头晕

D、耳鸣

E、头痛

正确答案：B

6、支气管哮喘典型的临床症状是

A、胸闷

B、干咳

C、反复发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难

D、咯血

E、胸痛

正确答案：C

7、铋盐的正确服用时间为

A、餐后

B、餐中

C、空腹

D、上腹痛前、腹痛时临时使用

E、餐前 30min

正确答案：C

8、服用利血平可能引起

A、心动过缓

B、血钾降低

C、血钾升高

D、面部潮红

E、下肢浮肿

正确答案：A

9、治疗肺炎链球菌肺炎首选的抗菌药物是

A、青霉素

B、链霉素

C、环丙沙星

D、氧氟沙星

E、红霉素

正确答案：A

10、治疗哮喘持续状态及危重发作的药物是

A、氢化可的松琥珀酸钠

B、异丙肾上腺素

- C、阿托品
- D、沙丁胺醇
- E、酮替芬

正确答案：A

11、对于严重的高脂血症患者常采用联合用药，下列不恰当的是

- A、鱼油+非诺贝特
- B、洛伐他汀+鱼油
- C、洛伐他汀+非诺贝特
- D、洛伐他汀+辛伐他汀
- E、洛伐他汀+烟酸

正确答案：D

12、甲状腺功能亢进症以中青年女性最多见，其发病的最主要内因是

- A、严重感染
- B、妊娠期
- C、强烈精神刺激
- D、哺乳期
- E、体内雌激素水平较高

正确答案：E

13、口服铁剂时，应同时服用

- A、碳酸氢钠
- B、氢氧化铝凝胶
- C、维生素
- D、西咪替丁
- E、喝茶

正确答案：C

14、患者，男，50岁，血压170/95mmHg伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

- A、利尿剂+ARB
- B、 β 受体阻滞剂+ARB
- C、利尿剂+CCB
- D、 α 受体阻滞剂+ACEI
- E、ACEI+CCB

正确答案：C

15、解热镇痛药的镇痛特点正确的是

- A、易产生成瘾性
- B、镇痛作用在中枢
- C、对慢性钝痛效果好
- D、可以两种同类药物联合使用
- E、镇痛作用强大

正确答案：C

16、控制慢性心功能不全患者急性发作症状宜选（ ）

- A、地高辛
- B、肾上腺素
- C、异丙肾上腺素
- D、洋地黄毒甙
- E、毒毛旋花甙K

正确答案：E

17、肺炎链球菌所致的社区获得性肺炎门诊治疗，经验性抗感染药宜首选

- A、头孢哌酮-舒巴坦
- B、阿莫西林
- C、克林霉素
- D、克拉霉素
- E、利巴韦林

正确答案：B

18、治疗医院获得性肺炎时选用氟康唑，那么该患者的病原是

- A、真菌
- B、不动杆菌属
- C、肠杆菌科细菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、厌氧菌

正确答案：A

19、II型变态反应性疾病最主要的治疗药物是

- A、H1受体阻断药
- B、肾上腺素
- C、去甲肾上腺素
- D、糖皮质激素
- E、H2受体阻断剂

正确答案：D

20、血管紧张素转换酶抑制剂最突出的副作用是

- A、胃肠道刺激
- B、白细胞减少
- C、咳嗽
- D、皮肤过敏
- E、血尿酸升高

正确答案：C

21、奎尼丁引起的金鸡纳反应，不包括

- A、头痛
- B、视觉障碍
- C、恶心
- D、血压上升
- E、耳鸣

正确答案：D

22、患者李女士，52岁，实验室检查：血红蛋白 95g/L 临床诊断为缺铁性贫血，医生开具口服硫酸亚铁片。下列向患者交代的用药注意事项中，错误的是()

- A、不宜与钙剂同时服用
- B、宜空腹服用
- C、宜同时补充维生素 C
- D、不宜同时进食牛奶和蛋类
- E、避免应用抑酸药

正确答案：B

23、应用地西泮可治疗

- A、丙酮与乳酸堆积的头痛
- B、反复性偏头痛
- C、紧张和焦虑性头痛
- D、原因不明头痛
- E、三叉神经痛

正确答案：C

24、用于5岁以下儿童高热时的紧急退热，应该选用的药品是

- A、20%阿司匹林溶液滴鼻
- B、布洛芬混悬液

- C、口服 20%对乙酰氨基酚溶液
- D、20%安乃近溶液滴鼻
- E、贝诺酯混悬液

正确答案：D

25、肝功能不全时，不宜使用（ ）

- A、洋地黄毒甙
- B、地高辛
- C、去乙酰毛花甙丙
- D、布洛芬
- E、毒毛旋花甙 K

正确答案：A

26、男，25 岁。夜间上腹痛 2 周，黑便 2 天，呕血伴头晕乏力 4 小时。

最适宜应用的药物是

- A、多潘立酮
- B、雷尼替丁
- C、枸橼酸铋钾
- D、奥美拉唑
- E、西咪替丁

正确答案：D

27、关于氯丙嗪的用途，错误的是：

- A、尿毒症.放射病引起的呕吐
- B、精神分裂症
- C、人工冬眠
- D、高血压
- E、顽固性呃逆

正确答案：D

28、患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大病史 3 年，临床上对该患者不宜选用

- A、苯海索
- B、金刚烷胺
- C、苄丝肼
- D、司来吉兰
- E、左旋多巴

正确答案：A

29、使用左旋多巴时，饮食方面应注意

- A、避免同时进食脂肪类食物
- B、避免同时进食淀粉类食物
- C、同时补充脂肪类食物
- D、同时补充蛋白质类食物
- E、避免同时进食蛋白质类食物

正确答案：E

30、WHO癌痛之阶梯疗法第一阶段是用

- A、强阿片类药
- B、弱阿片类药
- C、心理治疗
- D、非阿片类药
- E、神经阻滞

正确答案：D

31、苯海索治疗帕金森病的机制是：

- A、阻断中枢胆碱受体
- B、抑制多巴胺脱羧酶性
- C、激动多巴胺受体
- D、兴奋中枢胆碱受体
- E、补充纹状体中多巴胺

正确答案：A

32、“合理联用他汀类和贝特类”叙述中，最正确的

- A、早晚分别服用
- B、晚间服用
- C、晚上服用贝特类、而晨服用他汀类
- D、晨服用贝特类、而晚上服用他汀类
- E、早晨服用

正确答案：D

33、氯丙嗪不能阻断下列哪种受体：

- A、多巴胺受体
- B、N胆碱受体
- C、M胆碱受体
- D、 α 受体
- E、组胺H1受体

正确答案：B

34、属于哌啶酮类镇静催眠药的是

- A、格鲁米特
- B、甲丙氨酯
- C、阿米替林
- D、异戊巴比妥
- E、氯硝西泮

正确答案：A

35、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌引起的肺炎（）；

- A、克林霉素
- B、头孢哌酮
- C、阿奇霉素
- D、氟康唑
- E、万古霉素

正确答案：E

36、支气管哮喘患者，持续发作 24 小时，大汗淋漓，发绀，端坐呼吸，双肺散在哮鸣音。首选治疗的是

- A、色甘酸钠吸入+糖皮质激素
- B、沙丁胺醇雾化吸入+异丙托溴铵吸入
- C、654-2 静脉注射
- D、补液+氨茶碱+ β_2 受体激动剂
- E、补液+糖皮质激素静脉滴注+氨茶碱静脉滴注

正确答案：E

37、精神分裂症患者服用氯丙嗪 400mg/d，2 周疗效不明显，也无明显不良反应，下一步治疗应

- A、改用利培酮
- B、维持原剂量，继续观察
- C、双倍加大剂量
- D、改用奥氮平
- E、加大氯丙嗪的用量

正确答案：B

38、下列药物不属于用于治疗幽门螺杆菌感染的一线方案典型组方的是

- A、铋剂
- B、组胺 H₂受体阻断剂

- C、甲硝唑
- D、克拉霉素
- E、质子泵抑制剂

正确答案：B

39、糖尿病患者应用胰岛素以下哪项是正确的

- A、饭前半小时皮下注射
- B、饭后半小时肌肉注射
- C、饭后半小时皮下注射
- D、饭后1小时皮下注射
- E、饭前1小时肌肉注射

正确答案：A

40、地西泮(安定)不具有下列哪项优点：

- A、催眠作用较巴比妥类强
- B、治疗指数较大，
- C、对快动眼睡眠时间无明显缩短
- D、对肝药酶无明显诱导作用
- E、后遗反应轻，

正确答案：A

41、军团菌所致的社区获得性肺炎治疗，经验性抗感染药宜首选

- A、克拉霉素
- B、头孢哌酮-舒巴坦
- C、阿莫西林
- D、利巴韦林
- E、克林霉素

正确答案：A

42、下述属于非依赖性中枢性镇咳药的是

- A、氨溴索
- B、溴己新
- C、右美沙芬
- D、可待因
- E、苯丙哌林

正确答案：C

43、心室纤颤宜选用 A.利多卡因

- A、利多卡因

- 、普萘洛尔
- C、奎尼丁
- D、地高辛

正确答案：A

44、布洛芬的优势是

- A、退热作用与阿司匹林相似但较持久
- B、对胃肠道的不良反应较轻
- C、可诱发变态反应
- D、镇痛作用较强
- E、具有解热镇痛抗炎作用

正确答案：B

45、强心苷类药物产生正性肌力作用的机制是

- A、促进交感神经递质的释放
- B、除迷走神经对心脏的抑制
- C、使心肌细胞内 K^+ 增加
- D、使心肌细胞内 Ca^{2+} 增加
- E、减轻水肿

正确答案：D

46、消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法使用疗程

- A、8-12 周
- B、4-6 周
- C、6-8 周
- D、1-2 周
- E、8-10 周

正确答案：D

47、适用于高血压合并糖尿病、肾损害患者的药物是

- A、非洛地平
- B、缬沙坦
- C、赖诺普利
- D、美托洛尔
- E、氢氯噻嗪

正确答案：C

48、铁剂在胃肠道吸收特点是

- A、以二价铁形式主要从十二指肠吸收

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648111041045006131>