

2023 年主治医师之全科医学 301 高分通关题型题库 附解析答案

单选题（共 30 题）

1、26 岁初产妇，足月顺产，新生儿体重 3900g。产后 30 分钟阴道流血 400ml。挤压子宫有断续出血，时多时少，测血压 12/9.3kPa(90/70mmHg)，脉搏 108 次/分。

- A. 触摸子宫有无子宫收缩轮廓及硬度
- B. 重新检查胎盘胎膜
- C. 检查软产道
- D. 查血小板，凝血酶原时间，3P 试验
- E. 必要时 B 超探查宫内有无残留

【答案】 A

2、女性，24 岁，右下后牙突然自发痛 1 天。检查：局部牙龈乳头红肿、触痛。如果诊断为急性牙间乳头炎，最佳治疗措施为

- A. 调
- B. 牙周-牙髓联合治疗
- C. 牙髓治疗
- D. 洁治+3%H
- E. 含漱剂+抗生素

【答案】 D

3、男性 30 岁患者，发热伴牙龈出血 3 周。查体：皮肤黏膜苍白，有出血点，浅淋巴结未触及，肝右肋下 3cm，脾左肋下 2cm。骨髓检查：增生极度活跃，可见原始粒细胞 90%，过氧化酶染色阳性，未见 Auer 小体。初步诊断为

- A. 慢性粒细胞白血病慢性期

- B. 急性非淋巴细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. 慢性淋巴细胞白血病
- E. 骨髓异常增生综合征

【答案】 B

4、全科医学的基本原则不包括

- A. 以门诊为主体的服务
- B. 从生到死的全程服务
- C. 为服务对象协调各种医疗资源
- D. 提供以急诊室和家庭病床为主的服务
- E. 提供使社区群众易于利用的服务

【答案】 D

5、耳鼻咽喉科感染后引起的败血症、球结膜水肿、眼球突出，提示

- A. 脑脓肿
- B. 额骨骨髓炎
- C. 海绵窦血栓形成
- D. 横窦血栓形成
- E. Bezold 脓肿

【答案】 C

6、下述哪项不是结构式访谈的缺点

- A. 匿名保证差

- B. 易出现诱导性偏误
- C. 问卷回收率低
- D. 人力、物力和财力消耗大
- E. 调查对象分布局限

【答案】 C

7、已知 2500 个正常人血压的数据服从正态分布，计算出样本均值

- A. 任何一个人血压的 99%可信区间
- B. 样本均值的 95%波动范围
- C. 血压的 99%正常范围
- D. 总体均值的 95%可信区间
- E. 以上都不对

【答案】 D

8、患者，女性，71 岁。咳嗽、咳痰 30 余年，喘息 10 年，加重 1 周，2 天来嗜睡。查体：球结膜水肿，口唇发绀，BP170 / 90mmHg，R28 次 / 分，脉搏 90 次 / 分，双肺闻及干湿性啰音，双下肢可凹陷性水肿。

- A. 感染中毒性脑病
- B. 肺性脑病
- C. 高渗昏迷
- D. 高血压性脑病
- E. 脑血管意外

【答案】 B

9、常用于描述正态分布资料的集中趋势

- A. 算术均数
- B. 中位数
- C. 几何均数
- D. 标准差
- E. 百分位数

【答案】 A

10、人类生态学中疾病发生的三大要素是

- A. 理化因素、生物学因素、社会经济因素
- B. 感受性、传播途径、传染源
- C. 宿主、环境、致病因子
- D. 患者、潜在性患者、健康者
- E. 遗传、营养、锻炼身体

【答案】 C

11、大叶性肺炎可出现哪些症状和体征

- A. 胸部 X 线片大致正常
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 吸气性呼吸困难
- E. 桶状胸

【答案】 C

12、距骨颈骨折易引起

- A. 血管损伤
- B. 神经损伤
- C. 骨缺血性坏死
- D. 骨延迟愈合
- E. 骨筋膜室综合征

【答案】 C

13、 40岁已婚妇女，孕1产0，月经周期规律，4~5天/30天。末次月经为4月1日，持续5天，4月6日干净，现已妊娠6周。

- A. B超检查
- B. 羊水染色体检查
- C. 75g糖耐量试验
- D. 胎儿性别检查
- E. 血AFP检查

【答案】 D

14、 该组资料的95%医学参考值范围为

- A. $\bar{X} \pm 1.96S$
- B. $\bar{X} \pm t(0.05, v) S$
- C. $\bar{X} \pm 1.96S / n$
- D. P2.5~P97.5
- E. $1g^{-1}(1g\bar{X} \pm 1.96S1gX)$

【答案】 D

15、女性病人，32岁，已婚，工人，自诉半年来入睡困难，工作能力下降，近3个月来，无明显诱因，感觉紧张，过分担心，心慌，气促，坐立不安，常常通宵不能入睡，无家族史、既往史，体检、实验室检查无特殊

- A. 恐惧症
- B. 强迫症
- C. 疑病症
- D. 焦虑症
- E. 心因性精神障碍

【答案】 D

16、42岁男性，农民，生活懒散，不爱清洁，整天蒙头大睡，不愿出门，话少，已经5年余，家庭经济困难，要求门诊治疗。该患者最适合的治疗是

- A. 氯硝西泮
- B. 心理治疗
- C. 氯氮平
- D. 碳酸锂
- E. 电抽搐治疗

【答案】 C

17、易导致肺气肿和肺心病的是

- A. 原发型肺结核
- B. 亚急性血行播散型肺结核
- C. 浸润型肺结核
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 结核性胸膜炎

【答案】 D

18、患者，女性，20岁。新诊断为 Graves 病，服 PTU 治疗 1 个月后出现白细胞减少，其停药指征是

- A. $WBC < 4 \times 10$
- B. $WBC < 3 \times 10$
- C. $WBC < 2 \times 10$
- D. $WBC < 3.5 \times 10$
- E. $WBC < 2.5 \times 10$

【答案】 B

19、30 岁的男子因上消化道出血而住院，有肝炎病史。体检见腹壁静脉曲张，腹水征阳性，脾肿大。化验为 HBsAg (+)，血清总蛋白 50g/L，A/G:0.8。

- A. 冠状静脉结扎加脾切除术
- B. 贲门周围血管离断术
- C. 胃内曲张静脉缝扎术
- D. 肠-腔静脉分流术
- E. 门-腔静脉侧分流术

【答案】 B

20、患者，女性，27 岁。颜面及双下肢水肿，尿少 10 天，病前 10 天曾有咽痛。BP160/95mmHg。化验：尿蛋白 (++)，红细胞 (+++)，SCr250 μ mol/L，抗“O”阳性，血浆白蛋白 32g/L，Hb91g/L。

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 肾病综合征

- C. 急进性肾炎
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 急性肾衰竭
- F. 狼疮肾炎

【答案】 D

21、关于抽样误差，正确的是

- A. 抽样误差的大小是不可计算的
- B. 由于抽样产生的各观察值之间的差别
- C. 在搜集资料的过程中由于过失而产生的误差
- D. 样本统计量与总体参数之间的差别
- E. 以上均正确

【答案】 D

22、 26岁初产妇，足月顺产，新生儿体重3900g。产后30分钟阴道流血400ml。挤压子宫有断续出血，时多时少，测血压12/9.3kPa(90/70mmHg)，脉搏108次/分。

- A. 触摸子宫有无子宫收缩轮廓及硬度
- B. 重新检查胎盘胎膜
- C. 检查软产道
- D. 查血小板，凝血酶原时间，3P试验
- E. 必要时B超探查宫内有无残留

【答案】 A

23、煮沸灭菌法，下列哪项恰当

- A. 橡胶类应延长煮沸时间
- B. 玻璃制品可直接放入
- C. 煮沸用容器不必盖严
- D. 中途添物，重新设定时间
- E. 煮沸完毕，可存放一周

【答案】 D

24、患者，女性，25岁。右足癣并感染1周，2天前开始出现右小腿有片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚，右腹股沟淋巴结肿大。

- A. 1~2天
- B. 13~15天
- C. 6~9天
- D. 3~5天
- E. 10~12天

【答案】 D

25、男性，70岁。反复咳嗽，咳痰15年，高血压病史10年，有肾炎病史。目前体检：BP155/90mmHg，桶状胸，肺肝界位于第6肋间。心界缩小，R114次/分，可闻及早搏6次/分，P

- A. 冠心病心肌梗死
- B. 慢性肾炎肾功能不全
- C. COPD合并肺心病
- D. 慢性活动性肝炎
- E. 高血压性心脏病

【答案】 C

26、男性，46岁，脑梗死患者，发病两个月，意识清楚，语言不畅，左侧偏瘫及感觉障碍。CT诊断：右基底核梗死。运动功能评定：偏瘫BrunstromⅣ级，FMMS评分70分，为解决患者运动功能障碍。首选哪项治疗

- A. 药物治疗
- B. 日常生活活动能力训练
- C. 鲍巴斯训练
- D. 作业治疗
- E. 言语治疗

【答案】 C

27、脑卒中偏瘫病人，肢体运动功能训练中要改善痉挛模式要注意

- A. 增强肌张力
- B. 增加关节活动度
- C. 改善伸肌与屈肌的平衡
- D. 减低肌张力
- E. 注意多保持功能位

【答案】 C

28、影响评价结果真实性的选择偏倚因素是

- A. 干预组与对照组不均衡
- B. 自然灾害
- C. 调查问卷效度不好
- D. 接受第二次调查
- E. 调查员判断的主观性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648136013023006035>