

2024 湖南省雨花区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整题库 a4 版打印

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题） β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（ ）

- A: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸
- B: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦
- C: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- D: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

答案：D

2. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 链激酶
- B: 阿替普酶
- C: 瑞替普酶
- D: 尿激酶

答案：A

3. 阿奇霉素

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- B: 肾毒性较大
- C: 用于非典型病原体感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：C

4. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

- A: 孟鲁司特
- B: 多索茶碱
- C: 布地奈德
- D: 沙美特罗

答案：A

5. 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反是()。

- A: 胰腺坏死
- B: 急性肝衰竭
- C: 急性肾衰竭
- D: 肺部纹理加重

答案：C

6. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

- A: 万古霉素
- B: 罗红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 红霉素

答案：A

7. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

- A: 索他洛尔
- B: 硝酸甘油
- C: 美托洛尔
- D: 利多卡因

答案：D

8. (2019 年真题) 与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是 ()

- A: 多烯磷脂酸胆碱
- B: 葡醛内酯
- C: 甘草酸二铵
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：D

9. 关于硝基呋喃类，下列叙述哪项是错误的

- A: 抗菌谱广
- B: 耐药率低
- C: 口服吸收好
- D: 血浆药物浓度低

答案：C

10. 伊曲康唑属于 ()

- A: 唑类抗真菌药
- B: 棘白菌素类抗真菌药
- C: 多烯类抗真菌药
- D: 丙烯胺类抗真菌药

答案：A

11. 红霉素易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物。

- A: 克拉霉素
- B: 罗红霉素

C: 红霉素

D: 万古霉素

答案: C

12. 属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

A: 过氧化氢

B: 麻黄碱

C: 克罗米通

D: 酮替芬

答案: B

13. 扎那米韦的作用靶点是

A: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

B: 脱氧核糖核酸聚合酶

C: HIV-1 反转录酶

D: 神经氨酸酶

答案: D

14. 有指南推荐，为减少手术中和手术后出血风险，择期手术前需提前停用阿司匹林

A: 1~3 日

B: 7~10 日

C: 11~15 日

D: 4~6 日

答案: B

15. 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐，宜选用的止吐治疗方案是()

A: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

C: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案: C

16. 头孢哌酮的主要清除途径是

A: 主要经呼吸道排泄

B: 经肝、肾双途径清除

C: 主要经肝脏清除

D: 主要经肾脏排泄

答案: B

17. 高血压伴消化性溃疡患者慎用的药物是

A: 卡托普利

B: 哌唑嗪

C: 普萘洛尔

D: 利血平

答案: D

18. 可致男性胎儿外生殖器发育畸形,妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是 ()

A: 多沙唑嗪

B: 非那雄胺

C: 特拉唑嗪

D: 赛洛多辛

答案: B

19. 克拉霉素与阿伏唑啉合用，阿伏唑啉的血药浓度水平显著升高，这是因为克拉霉素抑制

A: p-糖蛋白

B: 血浆蛋白

C: CYP3A4

D: UGT287

答案：C

20. 患者，女，49岁。身高 164cm，体重 55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

A: 替考拉宁

B: 克拉霉素

C: 拉氧头孢

D: 米诺环素

答案：C

21. 阻断 H₂

A: 奥美拉唑

B: 哌仑西平

C: 雷尼替丁

D: 氢氧化铝

答案：C

22. 丙硫氧嘧啶起效慢的主要原因是

A: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

B: 肝内代谢转化快

C: 肾脏排泄速度快

D: 口服后吸收不完全

答案：A

23. 由我国学者发现并用于抗疟的是

A: 链霉素

B: 甲硝唑

C: 青蒿素

D: 二氯沙奈

答案：C

24. 具有心脏毒性的抗肿瘤药是

A: 博来霉素

B: 柔红霉素

C: 长春新碱

D: 紫杉醇

答案：B

25. 治疗绝经后妇女的骨质疏松选用

A: 阿仑膦酸钠

B: 鲑降钙素

C: 阿法骨化醇

D: 奥利司他

答案：A

26. 属于抗炎类保肝药的是

A: 异甘草酸镁

B: 还原型谷胱甘肽

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 双环醇

答案：A

27. 适用于吸烟的老年哮喘患者，且不易产生耐受性的药物是

A: 异丙托溴铵

B: 沙美特罗

C: 特布他林

D: 布地奈德

答案：A

28. 强心苷中毒引起的室性心律失常首选

A: 胺碘酮

B: 苯妥英钠

C: 利多卡因

D: 普萘洛尔

答案：B

29. 下列不属于一线抗结核药的是

A: 利福平

B: 乙硫异烟胺

C: 链霉素

D: 吡嗪酰胺

答案：B

30. 对军团菌有效的药物是

A: 阿奇霉素

B: 两性霉素 B

C: 链霉素

D: 甲硝唑

答案: A

31. (2018 年真题) 下列药物中, 属于抗乙型肝炎病毒的药物是 ()

A: 喷昔洛韦

B: 奥司他韦

C: 齐多夫定

D: 阿德福韦酯

答案: D

32. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是 ()

A: 阻断 CTZ 的 D

B: 抗幽门螺杆菌

C: 抑制胃壁细胞的 H

D: 阻断 H

答案: D

33. 降低肾素活性最强的药物是

A: 可乐定

B: 硝苯地平

C: 卡托普利

D: 普萘洛尔

答案: D

34. 促进钙剂吸收可选用

A: 葡萄糖酸钙

B: 阿仑膦酸钠

C: 阿法骨化醇

D: 依降钙素

答案: C

35. 长期使用可引起维生素 B12 缺乏的药物是

A: 二甲双胍

B: 阿司匹林

C: 头孢哌酮

D: 华法林

答案: A

36. 布地奈德口服给药的效能约为皮质醇的

A: 40 倍

B: 15 倍

C: 25 倍

D: 100 倍

答案: C

37. 左甲状腺素成人维持量是

A: 55-75ug

B: 25-75ug

C: 75-125ug

D: 125ug

答案: C

38. 与 PABA 竞争细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的是

A: 氨基糖苷类

B: 喹诺酮类

C: 磺胺类

D: 青霉素类

答案: C

39. 孟鲁司特的作用机制是

A: 阻断 M 受体

B: 阻断白三烯受体

C: 阻断 α 受体

D: 抑制磷酸二酯酶

答案: B

40. 纠正细胞内缺钾的是

A: 胰岛素

B: 二甲双胍

C: 磺酰脲类

D: A 和 B 均无效

答案: A

41. 咪唑类药物的抗真菌作用机制是()

A: 影响二氢叶酸合成

B: 影响真菌细胞膜通透性

C: 抑制以 DNA 为模板的 RNA 多聚酶，阻碍 mRNA 合成

D: 竞争性抑制鸟嘌呤进入 DNA 分子中，阻断核酸合成

答案: B

42. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

A: 瑞格列奈

B: 罗格列酮

C: 阿卡波糖

D: 艾塞那肽

答案: C

43. 服用磺胺多辛的方式不正确的是

A: 每次服药时饮水约 240ml

B: 餐中服用

C: 餐前 1 小时服用

D: 餐后 2 小时服用

答案: B

44. 甲亢术前准备的正确给药方法是()

A: 只给硫脲类

B: 先给硫脲类，术前 2 周再给碘化物

C: 先给碘化物，术前 2 周再给硫脲类

D: 只给碘化物

答案: B

45. (2018 年真题) 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是 ()

A: 塞来昔布

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 双氯芬酸

答案: C

46. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

A: 西沙必利

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 多潘立酮

答案: A

47. 可抑制细菌 β -内酰胺酶的是 ()。

A: 利福平

B: 磷霉素

C: 舒巴坦

D: 替考拉宁

答案: C

48. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

A: 甘精胰岛素注射液

B: 精蛋白锌胰岛素注射液

C: 预混胰岛素注射液

D: 普通胰岛素注射液

答案: D

49. 早产儿、妊娠后期及哺乳期妇女禁用下列哪种药物

A: 罗红霉素

B: 氯霉素

C: 青霉素

D: 红霉素

答案: B

50. 在常用剂量下，非那雄胺可使血清前列腺特异抗原(PSA)水平下降的幅度为

A: 0.1

B: 0.25

C: 0.6

D: 0.5

答案：D

51. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是()

A: 抑制 Na

B: 促进 Ca

C: 抑制 Ca

D: 促进 K

答案：A

52. β_1 受体激动后的影响是

A: 脂肪分解

B: 增加心率

C: 肌肉震颤

D: 支气管扩张

答案：B

53. 下列关于升华硫的描述中，错误的是

A: 儿童慎用

B: 不得与铁制品接触

C: 避免接触眼睛和其他黏膜

D: 可用于痤疮、脂溢性皮炎

答案：B

54. 临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

A: 维生素 B12

- B: 肝素
- C: 维生素 K
- D: 香豆素类

答案：A

55. 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()

。

- A: 维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 依诺肝素
- D: 维生素 B

答案：C

56. 可与抗凝药发生相互作用的是

- A: 坎利酮
- B: 伐地那非
- C: 呋塞米
- D: 丙酸睾酮

答案：D

57. 下列说法中错误的是

- A: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者
- B: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑
- C: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬
- D: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药

答案：A

58. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 拉西地平
- B: 普萘洛尔
- C: 依诺肝素
- D: 普伐他汀

答案：C

59. 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 米诺环素
- C: 万古霉素
- D: 利奈唑胺

答案：C

60. 平喘作用维持 4~6 小时，是缓解轻、中度急性哮喘症状的首选药是

- A: 沙丁胺醇
- B: 福莫特罗
- C: 沙美特罗
- D: 丙卡特罗

答案：A

61. 下列药物与甲氧氯普胺合用，可增加锥体外系不良反应风险的是

- A: 金刚烷胺
- B: 阿昔洛韦
- C: 干扰素
- D: 奥司他韦

答案：A

62. 可引起血钾、血钙降低，血尿素氮、肌酐及尿酸升高的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 醛固酮
- C: 乙酰唑胺
- D: 依他尼酸

答案：A

63. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 氯丙嗪
- B: 红霉素
- C: 他莫昔芬
- D: 维生素 C

答案：C

64. 属于解毒类保肝药的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 双环醇
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 异甘草酸镁

答案：C

65. 氨基酸分类正确的是

- A: 肝病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (9AA)、复方氨基酸注射液 (15AA)
- B: 肝病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (20AA)、复方氨基酸注射液 (9AA)
- C: 肾病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (9AA)、复方 α -酮酸片
- D: 肾病的氨基酸制剂: 复方氨基酸注射液 (15AA)、复方 α -酮酸片

答案：C

66. 金刚烷胺和美金刚合用

- A: 增加肾毒性
- B: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- C: 增加锥体外系不良反应的风险
- D: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

答案：D

67. 毛花苷丙经弱碱水解去乙酰化的产物是

- A: 洋地黄毒苷
- B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）
- C: 地高辛
- D: 毛花苷丙（西地兰 C）

答案：B

68. （2018 年真题）蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是（）

- A: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼
- B: 在用柔红霉素同时,使用柔红霉素等量的右雷佐生
- C: 在用柔红霉素后 30min,使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

答案：D

69. 抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

- A: 长春新碱
- B: 环磷酰胺

C: 多柔比星

D: 博来霉素

答案: B

70. 伴有炎性肠病、溃疡、胃肠道梗阻和腹部手术史的糖尿病患者,不宜使用的降糖药物是 ()

A: 比格列

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

D: 格列美脲

答案: B

71. 起效缓慢,可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是 ()

A: 罗格列酮

B: 利拉鲁肽

C: 艾塞那肽

D: 瑞格列奈

答案: A

72. 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状其所激动的受体是 ()

A: N 受体

B: M 受体

C: H 受体

D: α 受体

答案: D

73. 糖尿病合并发热、感染者可选用 ()

- A: 胰岛素
- B: 格列吡嗪
- C: 格列喹酮
- D: 格列齐特

答案：A

74. 哮喘急性发作首选的药物是

- A: 孟鲁司特片
- B: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 羧甲司坦口服液

答案：C

75. 磷酸二酯酶III抑制剂是()

- A: 依那普利
- B: 多巴酚丁胺
- C: 地高辛
- D: 米力农

答案：D

76. 成人使用美罗培南一日剂量不得超过

- A: 3g
- B: 5g
- C: 4g
- D: 6g

答案：D

77. 患者，女性，40 岁，甲状腺肿大，伴有心悸、多汗、烦躁、消瘦等症状。诊断：甲状腺功能亢进症。

- A: 格列齐特
- B: 放射性碘
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 大剂量碘剂

答案：C

78. 糖皮质激素的禁忌证不包括()

- A: 角膜炎、虹膜炎
- B: 创伤或手术恢复期
- C: 严重的高血压、糖尿病
- D: 妊娠初期和产褥期

答案：A

79. 散瞳药硫酸阿托品眼用凝胶的禁用人群是

- A: 眼底检查者
- B: 睫状肌麻痹患者
- C: 虹膜睫状体炎患者
- D: 青光眼患者

答案：D

80. 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适使用的药物是

- A: 硝普钠
- B: 美托洛尔
- C: 氨氯地平
- D: 贝那普利

答案：B

81. (2018 年真题) 不易发生“双硫仑样”反应的药物是 ()

- A: 头孢他啶
- B: 头孢曲松
- C: 头孢替安
- D: 头孢哌酮

答案：A

82. 以上属于阿片类药物轻度戒断症状的是

- A: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗
- B: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏
- C: 惊厥、震颤、反射加速、发热
- D: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

答案：A

83. 干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

- A: 环磷酰胺
- B: 5-氟尿嘧啶
- C: 吉非替尼
- D: 多柔比星

答案：B

84. 维生素 K 的作用是 ()

- A: 抑制纤维蛋白溶解
- B: 促凝血因子合成
- C: 促进纤维蛋白溶解
- D: 抑制血小板聚集

答案：B

85. 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是()

- A: 聚氯乙烯
- B: 聚乙烯醇蓖麻油
- C: 乙醇
- D: 邻苯二甲酸二辛酯

答案：B

86. 华法林是消旋体，由 S-华法林和 R-华法林组成，二者的抗凝作用是

- A: S-华法林的抗凝作用约是 R-华法林的 5 倍
- B: 二者抗凝作用关系不确定
- C: 二者抗凝作用等效
- D: R-华法林的抗凝作用约是 S-华法林的 5 倍

答案：A

87. 低分子量肝素发挥抗凝作用主要抑制的凝血因子是

- A: 因子 IIa
- B: 因子 Xa
- C: 因子 IXa
- D: 凝血酶 III (AT-III)

答案：B

88. 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是()

- A: 乳酸钠

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 谷氨酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/655121022120012033>