

2024 年广西壮族自治区大化瑶族自治县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题大全及参考答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 治疗慢性室性心律失常的药物是()

- A: 美西律
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 维拉帕米

答案：A

2. 下列关于血凝酶的描述，错误的是

- A: 易引起弥散性血管内凝血(DIC)
- B: 在完整无损的血管内无促进血小板聚集的作用
- C: 妊娠期妇女出血时，应避免使用维生素 K
- D: 用于新生儿出血时，宜在补充维生素 K

答案：A

3. 高钠血症是指

- A: 血钠 $>140\text{mmol/L}$
- B: 血钠 $>135\text{mmol/L}$
- C: 血钠 $>130\text{mmol/L}$
- D: 血钠 $>145\text{mmol/L}$

答案：D

4. 属于 I b 类抗心律失常药的是

- A: 利多卡因
- B: 普罗帕酮
- C: 奎尼丁
- D: 胺碘酮

答案：A

5. 属于第四代头孢菌素的药物是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢克洛
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢拉定

答案：C

6. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

- A: 头孢唑林
- B: 阿莫西林
- C: 头孢他啶
- D: 头孢噻肟

答案：B

7. 具有抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 碳酸氢钠
- C: 西沙必利
- D: 莫沙必利

答案：A

8. 下述药物用于治疗消化性溃疡时，不属于抑制胃酸分泌的药物是

- A: 泮托拉唑
- B: 氢氧化铝
- C: 雷尼替丁
- D: 奥美拉唑

答案：B

9. 能减弱双香豆素类抗凝血作用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 阿司匹林
- C: 广谱抗生素
- D: 甲苯磺丁脲

答案：A

10. 阻断白三烯受体，起效缓慢，作用较弱，仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是（）

- A: 孟鲁司特
- B: 茶碱
- C: 沙美特罗
- D: 氟替卡松

答案：A

11. 支原体、衣原体引起的肺炎宜选用（）

- A: 克林霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 氟康唑

D: 万古霉素

答案：B

12. 使血小板内环磷酸腺苷(cAMP)增多的抗血小板药物是

A: 替格瑞洛

B: 替罗非班

C: 双嘧达莫

D: 阿司匹林

答案：C

13. 双香豆素与维生素 K

A: 与其竞争结合血浆蛋白

B: 产生协同作用

C: 竞争性对抗

D: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

答案：C

14. 抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

A: 放线菌素 D

B: 阿霉素

C: 丝裂霉素

D: 环磷酰胺

答案：A

15. 为治疗阴道滴虫病的首选药物是

A: 甲硝唑

B: 吡喹酮

C: 三苯双脒

D: 乙胺嘧啶

答案: A

16. 利多卡因的电生理作用错误的是

A: 使传导减慢

B: 明显影响动作电位 0 相

C: 提高心室颤动阈值

D: 缩短复极时间

答案: B

17. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 支气管哮喘

B: 胃溃疡

C: 骨关节炎

D: 痛风

答案: C

18. 头孢菌素类药的主要作用靶点是

A: 核糖体的 30S 亚基

B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

C: 细胞内膜 PBP

D: 核糖体的 50S 亚基

答案: C

19. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

A: 氨苯蝶啶

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 呋塞米

答案：A

20. 毛果芸香碱对眼的作用是

A: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

B: 缩瞳、升眼压，调节痉挛

C: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

D: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

答案：C

21. 以上属于阿片类药物轻度戒断症状的是

A: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏

B: 惊厥、震颤、反射加速、发热

C: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

D: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

答案：C

22. 常用的外用痤疮治疗药不包括

A: 阿达帕林

B: 维 A 酸

C: 过氧苯甲酰

D: 特比萘芬

答案：D

23. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

A: 阿糖胞苷

B: 氟胞嘧啶

C: 两性霉素

D: 卡泊芬净

答案: D

24. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

A: 格列喹酮

B: 二甲双胍

C: 低精蛋白锌胰岛素

D: 普通胰岛素

答案: A

25. 哺乳期妇女应用沙丁胺醇时，早产儿会出现

A: 暂时性低血糖

B: 耐药性

C: 头痛

D: 支气管痉挛

答案: A

26. (2020 年真题) 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

A: 氨氯地平

B: 赖诺普利

C: 吲达帕胺

D: 普萘洛尔

答案: D

27. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

A: 依托泊苷

B: 来曲唑

C: 紫杉醇

D: 顺铂

答案: B

28. 可用于治疗精神分裂症的是

A: 氯丙嗪

B: 卡马西平

C: 地西泮

D: 硫酸镁

答案: A

29. 具有心脏毒性的抗肿瘤药是

A: 长春新碱

B: 柔红霉素

C: 紫杉醇

D: 博来霉素

答案: B

30. 属于促凝血因子活性药的是

A: 鱼精蛋白

B: 酚磺乙胺

C: 氨甲环酸

D: 甲萘氢醌

答案: B

31. (2017 年真题) 重症肌无力、癫痫禁用的 ()

A: 左氧氟沙星

B: 米诺环素

C: 哌拉西林

D: 甲硝唑

答案: A

32. 下列药物中，不能增强他莫昔芬活性和疗效的是

A: 长春新碱

B: 西咪替丁

C: 氟尿嘧啶

D: 甲氨蝶呤

答案: B

33. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A: 磺胺米隆

B: 磺胺嘧啶

C: 磺胺甲

D: 柳氮磺吡啶

答案: D

34. 口服不可嚼碎，否则易引起严重口腔溃疡的助消化药物是

A: 氢氧化铝

B: 乳酸菌素

C: 西咪替丁

D: 胰酶

答案: D

35. 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是

A: 瑞格列奈

B: 二甲双胍

C: 格列美脲

D: 普萘洛尔

答案: A

36. 治疗厌氧菌引起的严重感染最适合的是

A: 红霉素

B: 克拉霉素

C: 克林霉素

D: 万古霉素

答案: C

37. 主要用于疟疾预防的药物是

A: 氯喹

B: 吡喹酮

C: 甲硝唑

D: 乙胺嘧啶

答案: D

38. 可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

A: 氨茶碱

B: 沙丁胺醇

C: 布地奈德

D: 可待因

答案: D

39. 用维生素 B

A: 锂

B: 钠

C: 钙

D: 钾

答案: D

40. 以下适应证与其他四个药物不同的是

A: 特比萘芬

B: 制霉菌素

C: 联苯苄唑

D: 克霉唑

答案: B

41. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

A: 多巴酚丁胺

B: 米力农

C: 依那普利

D: 地高辛

答案: C

42. 合用伊立替康可减弱作用效果的是

A: 依托泊苷

B: 顺铂

C: 米库氯铵

D: 琥珀胆碱

答案: C

43. (2016 年真题) 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

A: 阿瑞吡坦

B: 托烷司琼

C: 维生素 B6

D: 甲氧氯普胺

答案: D

44. (2018 年真题) 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是 ()

A: 噻托溴铵

B: 茶碱

C: 孟鲁司特

D: 沙美特罗

答案: D

45. 可使维生素 B6 在体内的活性降低的是

A: 异烟肼

B: 雌激素

C: 糖皮质激素

D: 丙磺舒

答案: B

46. 以下关于非磺酰脲类促胰岛素分泌药使用的叙述，错误的是

A: 对磺酰脲类敏感性差或效果不佳者可换此类药物，也可与磺酰脲类联合应用

B: 瑞格列奈无肾脏功能不全者使用的禁忌，在体内无蓄积，适用于老年和糖尿病肾病者

C: 可以作为初始治疗，用于不能耐受二甲双胍或磺酰脲类药物或存在使用这些药物的禁忌证患者，尤其是有低血糖风险的慢性肾脏病患者

D: 常见不良反应是低血糖和体重增加

答案: A

47. 治疗青光眼宜选用

- A: 碘苷滴眼剂
- B: 氯霉素滴眼剂
- C: 拉坦前列素滴眼剂
- D: 托吡卡胺滴眼剂

答案：C

48. 铂类化合物治疗期间，需要每周检查的项目是

- A: 肾功能
- B: 肝功能
- C: 全血计数
- D: 血钙

答案：C

49. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是()。

- A: CYP2E1
- B: CYP2D6
- C: CYP286
- D: CYP2C19

答案：D

50. 具有负性肌力、负性频率、负性传导作用的药物是

- A: 卡托普利
- B: 维拉帕米
- C: 哌唑嗪
- D: 硝酸甘油

答案：B

51. 在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是

- A: 达格列净
- B: 罗格列酮
- C: 吡格列酮
- D: 二甲双胍

答案：D

52. 高血压合并冠心病不宜选用()

- A: 普萘洛尔
- B: 胍乙啶
- C: 肼屈嗪
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

53. 患者，男，19岁，既往有癫痫病史2年，长期服用苯妥英钠控制良好。1周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4次/日。

- A: 具有抗雄激素样作用，剂量过大可出现男性乳房女性化、女性泌乳等
- B: 停药后复发率高
- C: 餐后服用比餐前效果佳
- D: 餐前服用比餐后效果佳

答案：D

54. 服用叶酸治疗巨幼细胞贫血，需同时联合使用的药品是()

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 B12
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 维生素 B1

答案：B

55. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的药物是()

- A: 红霉素
- B: 阿莫西林
- C: 氧氟沙星
- D: 异烟肼

答案：C

56. 可用于鼻部血管收缩的肾上腺素 α 受体激动药是

- A: 羟甲唑啉
- B: 桃金娘油
- C: 复方薄荷油
- D: 西地碘

答案：A

57. 下列药物中，没有降低眼压作用的药物是()

- A: 毛果芸香碱
- B: 噻吗洛尔
- C: 阿托品
- D: 比马前列素

答案：C

58. 具有利胆作用的药物是()

- A: 肾上腺素
- B: 阿托品
- C: 熊去氧胆酸
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

59. 属于吗啡的前药，过量或长期使用易产生成瘾性的是

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 氨溴索

答案：B

60. 作用于微管的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 来曲唑
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案：C

61. （2017 年真题）属于抗雄性激素的肿瘤药是（）

- A: 氟他胺
- B: 阿那曲唑
- C: 炔雌醇
- D: 他莫昔芬

答案：A

62. 对小肠和结肠平滑肌无明显作用的促胃肠动力药是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 西沙比利
- C: 多潘立酮
- D: 伊托必利

答案：C

63. 易产生耐药性,极少单独用药,临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是

- A: 特比萘芬
- B: 卡泊芬净
- C: 氟康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：D

64. 主要用于解热镇痛,抗炎作用较弱的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：A

65. 不易发生耐药株,是目前治疗原虫和厌氧菌的重要药物是

- A: 呋喃妥因
- B: 甲硝唑
- C: 克林霉素
- D: 多黏菌素

答案：B

66. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 高血压危象
- B: 血糖异常
- C: 急性肝衰竭
- D: 红人综合征

答案：C

67. （2017 年真题）眼部病毒感染宜选用（）

- A: 碘苷滴眼剂
- B: 氯霉素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：A

68. 抑制胸腺核苷酸合成酶

- A: 羟基脲
- B: 阿糖胞苷
- C: 氟尿嘧啶
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

69. 长期大剂量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，应注意适当补充

- A: 维生素 C 和烟酸
- B: 维生素 B 和维生素 K
- C: 维生素 A 和维生素 D

D: 维生素 E 和叶酸

答案：B

70. 福莫特罗的平喘作用维持时间是

A: 4~6 小时

B: 10~20 分钟

C: 10~12 小时

D: 3~5 分钟

答案：C

71. (2016 年真题) 痛风缓解期 (关节炎症控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是

A: 秋水仙碱

B: 别嘌醇

C: 泼尼松龙

D: 布洛芬

答案：B

72. 下列关于奥沙利铂的描述，错误的是

A: 遇冷可加重奥沙利铂的神经毒性

B: 应给予预防性或治疗性的止吐用药

C: 其神经系统毒性与剂量大小无关

D: 与氯化钠和碱性溶液 (特别是氟尿嘧啶) 之间存在配伍禁忌

答案：C

73. 能竞争 DNA 聚合酶的抗病毒药是

A: 阿昔洛韦

B: 碘苷

C: 拉米夫定

D: 利巴韦林

答案: A

74. 噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

A: 血钠

B: 血氯

C: 血钾

D: 血氨

答案: D

75. 长期使用糖皮质激素不会导致

A: 糖尿病

B: 高钾血症

C: 高血压

D: 骨质疏松

答案: B

76. 适用于需要尽快解决急性症状的抗前列腺增生症药物是

A: 西地那非

B: 丙酸睾酮

C: 非那雄胺

D: 坦洛新

答案: D

77. 短效糖皮质激素是

A: 氟氢可的松

B: 地塞米松

C: 甲泼尼龙

D: 氢化可的松

答案: D

78. 用药过程中需注意监护心脏毒性的是()

A: 多柔比星

B: 甲氨蝶呤

C: 丝裂霉素

D: 伊立替康

答案: A

79. 奥美拉唑属于

A: H^+ , K^+ -ATP 酶抑制剂

B: M 受体拮抗药

C: H_2 受体拮抗药

D: 胃泌素受体拮抗药

答案: A

80. 下述关于过氧苯甲酰的描述中, 不正确的是()

A: 可导致皮肤干燥

B: 可分解出新生态氧而发挥作用

C: 为强还原剂, 极易分解

D: 可杀灭痤疮丙酸杆菌

答案: C

81. 以下属于袢利尿剂禁忌证的是

A: 高钾血症

B: 对磺胺过敏的患者

C: 高血压

D: 高血糖

答案: B

82. 甲氧苄啶联用甲氨蝶呤使

A: 白细胞减少风险增加

B: 肾毒性增加

C: 抗凝作用增强

D: 半衰期缩短

答案: A

83. 肌肉注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

A: 4 小时

B: 10~25 分钟

C: 7~12 分钟

D: 8 小时

答案: A

84. 毛花苷丙经弱碱水解去乙酰化的产物是

A: 毛花苷丙（西地兰 C）

B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

C: 洋地黄毒苷

D: 地高辛

答案: B

85. （2020 年真题）消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿司匹林

C: 吲哚美辛

D: 塞来昔布

答案: D

86. 轻度阻滞 Na⁺通道的药物是

A: 普鲁卡因胺

B: 普萘洛尔

C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案: D

87. 阿昔洛韦的作用靶点是

A: HIV-1 反转录酶

B: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

C: 神经氨酸酶

D: 脱氧核糖核酸聚合酶

答案: D

88. 关于胶体果胶铋用药教育的说法, 错误的是()

A: 胶体果胶铋使用后口中可能有氨味

B: 妊娠期妇女禁用胶体果胶铋

C: 胶体果胶铋宜与牛奶同时服用

D: 胶体果胶铋使用后大便可能会变黑

答案: C

89. 与细菌核蛋白体的 30s 亚基结合, 抑制细菌蛋白质合成的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 四环素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/655231041122012033>