

内科护理期末测试题B

一、单选题（共100题，100分）

1、最常见的应用胰岛素的不良反应是: (1.0)

- A、胰岛素抗药物
- B、低血糖反应
- C、胰岛素过敏反应
- D、脂肪营养不良
- E、注射部位感染

2、病人,女性,35岁,患慢性风湿性心瓣膜病合并二尖瓣狭窄,入院后医生要求护士严密观察心律失常的发生,风心病合并二尖瓣狭窄最常见的心律失常 (1.0)

- A、室性期前收缩
- B、房室传导阻滞
- C、心房颤动
- D、房性期前收缩
- E、心室颤动

3、病人,女性,50岁初诊为高血压,目前高血压维持在140/155mmHg,护士在评估中发现病人喜好下列食物,护士应指出其中最不利控制高血压的食 (1.0)

- A、猪肝
- B、鲫鱼
- C、瘦肉
- D、河虾
- E、竹笋

4、病人,男性,62岁,诊断为心肌梗死而收入院治疗,发生室性期前收缩应首选的药物是 (1.0)

- A、阿托品
- B、洋地黄
- C、地塞米
- D、利多卡因
- E、普鲁卡因胺

5、病人,女性,70岁,患风湿性心脏病合并二尖瓣狭窄入院,住院治疗,此次住院治疗效果不佳,病情不稳定而死亡。风湿性心瓣膜病最主要的致死原因是(1.0)

- A、心律失常
- B、栓塞
- C、亚急性感染性心内膜炎
- D、肺部感染
- E、充血性心力衰竭

6、患者,男,60岁。患慢性肺源性心脏病,出院后需服用呋塞米,护士进行健康教育时告知其定时复查,用药过程中会出现的电解质紊乱为(1.0)

- A、高钾、高钠
- B、高钾、低的
- C、低钾、低钠
- D、高钠、低钾
- E、高钾、低钙

7、某患者因再生障碍性贫血需输血治疗,医嘱给予200mL新鲜血输注,当输注100mL左右患者发生寒战,继而诉头痛、恶心,测体温39.5℃,最初的处理应是(1.0)

- A、暂停输血,静脉滴注生理盐水
- B、28℃生理盐水灌肠降温
- C、冰袋敷头部
- D、口服碳酸氢钠
- E、静脉推注地塞米松

8、男性,46岁。4年前诊断为肝硬化,近一周症状加重,出现大量腹水,对病人腹水治疗中不宜采用的是(1.0)

- A、输注白蛋白
- B、饮食中限制盐的摄入
- C、应用利尿剂
- D、反复大量放腹水
- E、进水量每日限制在1000ml左右

9、女性,45岁。反复上腹部饱胀,隐痛不适,反酸暖气、食欲不振,恶心1年余。查体:上腹部有轻度压痛。肝脾未触及。可能的诊断为(1.0)

- A、慢性胃炎
- B、急性胃炎
- C、慢性胃溃疡
- D、慢性十二指肠溃疡
- E、慢性胰腺炎

10、病人急性广泛前壁心肌梗死,现血压正常,呼吸平稳,窦性心率70次/分,未发现并发症。针对该病人的护理措施错误的是 (1.0)

- A、饮食少量多餐
- B、尽量避免搬动
- C、第一周内限制探视
- D、静脉输液速度宜慢
- E、如有便秘立即灌肠

11、病人,男性,71岁,患高血压6年,体重75kg,身高165cm,护士对其进行健康指导错误的是 (1.0)

- A、坚持适当的体育运动
- B、低盐饮食
- C、吃减肥药
- D、不得随意增减和中断药物
- E、监测血压和服药关系

12、高血压急症的特征是 (1.0)

- A、持续性头痛
- B、老年人多见
- C、主动脉瓣区第二心音亢进
- D、舒张压持续在 130mmHg 以上
- E、恶心、呕吐

13、梁某。女,32岁,公司职员。因乏力、厌食2个月,剧烈呕吐1天入院,慢性肾衰竭(尿毒症期),予以中心静脉置管性血液透析。护士对该病人进行饮食指导不正确的是 (1.0)

- A、食用鸡蛋、牛奶、鱼肉等优质蛋白
- B、每天饮水量约为前1天尿量加500ml水

- C、低盐饮食
- D、选择维生素C、B族维生素丰富的食物
- E、多吃香蕉

14、患者,男性,78岁。反复咳嗽、喘息20年,5年前诊断为COPD,2天前合并肺部感染入院。目前患者的医疗诊断是肺源性心脏病,对该患者最重要的治疗措施是(1.0)

- A、立即静点氨茶碱和地塞米松
- B、立即静脉注射速尿,消除水肿
- C、纠正心律失常
- D、立即吸氧,静点呼吸兴奋剂
- E、积极抗感染,保持呼吸道通畅

15、病人,女性,45岁,病人高血压三年,住院期间,护士为病人讲述高血压病的发病因素,下列与高血压发病无关的是(1.0)

- A、精神过度紧张
- B、钠盐
- C、体重超度
- D、免疫缺陷
- E、遗传

16、患者,男性,62

岁。诊断“COPD,Ⅱ型呼吸衰竭,肺性脑病”。护理人员应避免使用以下哪项处理措施?()(1.0)

- A、持续低流量给氧
- B、静脉滴注抗生素
- C、肌肉注射呋塞米
- D、烦躁时使用镇静剂
- E、口服解痉平喘类药物

17、细菌性肺炎抗菌治疗,抗菌药物一般用至(1.0)

- A、体温正常后3~4日,肺部体征基本消失
- B、体温正常后4~5日,肺部体征基本消失
- C、体温正常后5~7日,肺部体征基本消失
- D、体温正常后7~9日,肺部体征基本消失

E、体温正常后10~14日,肺部体征基本消失

18、肝性脑病患者禁用的灌肠液是 (1.0)

- A、弱酸性溶液
- B、高渗盐水
- C、肥皂水
- D、水合氯醛
- E、低渗盐水

19、病人,男性,65岁有糖尿病病史,清晨起床发现下半身肢体瘫痪,不能移动。送医院检查,神志清楚,左侧偏瘫,CT见底密度影。最可能的诊断是() (1.0)

- A、脑血栓形成
- B、脑淤血
- C、高血压
- D、脑出血

20、雷尼替丁治疗消化性溃疡的机制是 () (1.0)

- A、阻断 H^+-K^+-ATP 酶
- B、中和胃酸
- C、加速胃排空
- D、延缓胃排空
- E、拮抗 H_2 受体

21、患者,男性,41岁。有消化性溃疡病史4年。1

天前胃痛明显,无恶心呕吐。今晨觉头昏、乏力、黑蒙,排尿排便一次。对于该患者,除腹痛外,护士还应重点询问()。(1.0)

- A、排便习惯
- B、粪便颜色
- C、尿液颜色
- D、尿量
- E、有无眩晕

22、甲亢性心脏病心律失常最常见的是: (1.0)

- A、房性期前收缩
- B、室性期前收缩
- C、交界性期间收缩
- D、阵发性房颤

E、房室传导阻滞

23、某慢性肺心病、肺功能失代偿期老年患者,经吸氧、利尿、强心苷类药物治疗后,呼吸困难减轻,但出现昼睡夜醒及多言,首先考虑为(1.0)

A、肺性脑病

B、短暂性脑缺血发作

C、脑梗死

D、肺部感染

E、强心苷类中毒

24、与慢性胃炎的发病有关的细菌是(1.0)

A、痢疾杆菌感染

B、军团菌感染

C、幽门螺旋杆菌感染

D、肺炎球菌感染

E、大肠杆菌感染

25、患者,男性,30岁。因外出春游后出现咳嗽、咳痰伴喘息1天入院。体检:体温36.8°C,脉搏90次/分,呼吸28次/分,血压120/80mmHg,喘息貌,在肺部可闻及广泛哮鸣音。该患者最可能的诊断是(1.0)

A、肺炎

B、支气管扩张

C、支气管哮喘

D、肺心病

E、心功能不全

26、病人,男性,70岁,因‘慢性咳嗽,咳嗽20年,进行性呼吸困难3年,症状加重1周,’拟诊断为‘慢性阻塞性肺疾病,冠心病’收入院,提示病人并发右心衰的体征是(1.0)

A、半坐卧位

B、双侧颈静脉充盈

C、双肺弥漫性湿罗音

D、眼睑水肿

E、口唇发绀

27、心动过缓是指心率每分钟少于(1.0)

- A、 40次
- B、 50次
- C、 60次
- D、 70次
- E、 80次

28、患者男,28岁。平素体健。淋雨后发热、咳嗽、咳痰,患者出现全身肌肉酸痛、胸痛等全身中毒症状,诊断为肺炎链球菌肺炎,护士在观察病情时,应特别警惕发生 (1.0)

- A、 胸膜炎
- B、 心包炎
- C、 休克
- D、 脓胸
- E、 脑膜炎

29、某急性发作重度的支气管哮喘患者,其首选药物是()。 (1.0)

- A、 氨茶碱
- B、 地塞米松
- C、 沙丁胺醇
- D、 色甘酸钠
- E、 异丙托溴铵

30、心力衰竭患者出现洋地黄毒性反应,首要的处理措施是 (1.0)

- A、 停用洋地黄药物
- B、 补液,稀释体内药物
- C、 电击除颤
- D、 利多卡因,纠正心律失常
- E、 利尿,促进排泄

31、患者,男性,75

岁。慢性阻塞性肺疾病急性发作期,患者痰多黏稠,翻身时突然出现面色发绀,烦躁不安。护士首先应采取的措施是()。 (1.0)

- A、 给患者吸氧
- B、 给患者吸痰

C、协助患者取坐位

D、指导患者有效咳嗽

E、湿化气道

32、病人男性45岁患高血压三年,护士指导病人饮食中钠盐 (1.0)

A、 <2g/d

B、 <4g/d

C、 <6g/d

D、 <8g/d

E、 <10g/d

33、主要不良反应为颜面潮红,头痛的药物是 (1.0)

A、利尿剂

B、 β 受体阻滞剂

C、钙通道阻滞剂

D、血管紧张素转换酶抑制剂

E、 α_1 受体阻滞剂

34、(21-23题共用题干)

病人,男性,45岁,患高血压2年,睡眠中突感极度胸闷,气急,大汗,咳嗽,咳痰,带血,端坐呼吸,血压200/110mmHg,心率110次/分。针对该病人的情况,护士可立即采取的有效措施是 (1.0)

A、安慰病人

B、安置病人取端坐位

C、6-8L/ min

D、观察血压变化

E、详细做护理记录

35、确诊糖尿病首选的检查方法是 (1.0)

A、尿糖测定

B、空腹血糖测定

C、口服葡萄糖耐量试验

D、血胰岛素测定

E、糖化血红蛋白测定

36、护士在给病人做心电图时,V4 导联正确的放置位置是 (1.0)

A、胸骨左缘第 4 肋间

- B、左腋窝前线第 5 肋间
- C、左锁骨中线第 5 肋间
- D、左腋前线第 4 肋间
- E、左锁骨中线第 4 肋间

37、男性,45岁。患急性胰腺炎入院。经非手术治疗病情好转准备出院。下列病人的陈述中,提示病人对自身保健原则理解有误的是 (1.0)

- A、“我每天饭量要减少,分四五次吃”
- B、“我要少吃油腻的食物”
- C、“每天一杯红酒有助于我康复”
- D、“我的饮食节律必须规律,食物以蔬菜为主”
- E、“我应当检查一下,有胆道的疾病要尽早治疗”

38、患者,女,75 岁。左心衰竭 5

年。与家人争吵后心悸、气短、不能平卧、咳粉红色泡沫痰。体检:血压 90/60mmHg,呼吸 28

次/分,神志清醒,端坐位,口唇发绀,两肺满布湿啰音及哮鸣音。患者吸氧宜采用的方法是 (1.0)

- A、持续高流量吸氧
- B、间断高流量吸氧
- C、间断低流量吸氧
- D、低流量乙醇湿化吸氧
- E、高流量乙醇湿化吸氧

39、病人,女性,52岁,诊断为高血压急症,医嘱速尿20mg,iv。执行后病人出现乏力,腹胀,肠鸣音减弱的症状。该病人可能发生了 (1.0)

- A、高钾血症
- B、低钾血症
- C、高钠血症
- D、低钠血症
- E、低氯血症

40、男性,27岁,自去年冬季以来每日发生上腹部隐痛,平时伴有恶心、打嗝、反酸,检查示幽门螺旋杆菌阳性,诊断“慢性胃炎”,医生针对其病情采用三联疗法治疗。三联疗法包括 () (1.0)

- A、阿莫西林+甲硝唑+次枸橼酸铋
- B、利福平+甲硝唑+乙胺丁醇

- C、 氟霉素+红霉素+链霉素
- D、 黄连素+呋喃唑酮+链霉素
- E、 庆大霉素+青霉素+链霉素

41、 患者女性,68岁。入院诊断:慢性心力衰竭,遵医嘱服用地高辛每日0.125mg,某日患者将白墙看成黄墙,提示患者出现 (1.0)

- A、 心衰好转征象
- B、 心律恢复正常
- C、 洋地黄药物中毒
- D、 血钾过低
- E、 血钠过高

42、 长期高血压易导致脏器出现相关并发症,常累及的脏器是 (1.0)

- A、 心、脑、肾、眼
- B、 心、肺、肾
- C、 心、肝、肾
- D、 肝、肾、脑
- E、 肝、肾、眼

43、 急性心肌梗死病人发病后24小时内主要的死亡原因是 (1.0)

- A、 心脏破裂
- B、 心律失常
- C、 心力衰竭
- D、 心源性休克
- E、 室壁瘤

44、 尿毒症病人最早和最突出的临床表现是() (1.0)

- A、 皮肤瘙痒
- B、 出血倾向
- C、 厌食 恶心
- D、 高钾血症
- E、 抽搐

45、 患者,女性,28岁。因全身关节痛,面部蝶形红斑,查血抗体,确诊为SLE,健康教育的重点是避免日光直射,原因是 (1.0)

- A、 紫外线可致雌激素作用增强

B、

紫外线会破坏上皮细胞核中的DNA，刺激机体的免疫系统，产生自身抗体，是本病的重要诱因

C、紫外线直接破坏细胞

D、紫外线加重关节滑膜炎

E、紫外线直接损害骨髓

46、患者,女,38岁。慢性哮喘病史12

年。近日感冒后病情加重,夜间咳嗽频繁,痰量多。查体:神志清,口唇轻度发绀;桶状胸;双肺叩诊过清音,呼吸音低,有干湿性音。经定量雾化吸入治疗后病情缓解,但PaO₂(55mmHg)仍低。经治疗,患者状况好转。复诊时护士指导该患者注意避免各种诱发因素,其中不包括() (1.0)

A、避免摄入引起过敏的食物

B、避免吸入刺激性气体

C、避免接触外界人员

D、避免呼吸道感染

E、避免剧烈运动

47、患者,男,34

岁。左足麻木、疼痛,走路时小腿酸胀、易疲劳,足底有硬胀感,初步诊断为血栓闭塞性脉管炎。可确诊的辅助检查是()。(1.0)

A、肢体抬高试验

B、静脉注射硫酸镁10ml

C、仔细检查肢体各动脉搏动情况

D、行交感神经阻滞

E、行动脉造影

48、病人,男性,67岁,因冠心病入院,在静脉输液的过程中出现了胸闷,呼吸困难,咳嗽,咳粉红色泡沫痰,此时,护士应为病人采取的卧位是(1.0)

A、去枕仰卧位

B、左侧卧位

C、端坐位,两腿下垂

D、休克卧位

E、头低足高位

49、男性,67岁。酗酒30多年,每日约半斤白酒。查体:肝肋下3cm,脾脏肋下4cm。面颈部见蜘蛛痣。化验检查外周血三系均减少,其减少的主要原因应是 (1.0)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/655302323211011314>