

三基护理模考试题

一、单选题（共 90 题，每题 1 分，共 90 分）

1、呼吸衰竭的最常见诱因是（ ）

- A、呼吸道感染
- B、高浓度吸氧
- C、手术
- D、麻醉
- E、外伤

正确答案：A

2、患者，男性，48 岁，因结肠癌入院，遵医嘱做术前肠道准备灌肠过程中患者出现速脉、面色苍白、出冷汗、心慌气促，护士的正确处理措施（ ）（ ）

- A、降低灌肠筒
- B、立即停止灌肠
- C、嘱病人忍耐
- D、嘱病人深呼吸
- E、升高灌肠筒

正确答案：B

3、患者，男，39 岁，消化性溃疡患者大便隐血试验（+）提示（ ）（ ）

- A、溃疡穿孔
- B、溃疡瘢痕形成
- C、溃疡出血
- D、伴慢性胃炎
- E、幽门梗阻

正确答案：C

4、患者，男性，28 岁，皮毛厂工作，因吸入大量焚烧后废气出现呼吸困难，送入院吸氧后未见好转。入院后血气分析示：PaO₂ 50mmHg PaCO₂ 50mmHg 胸部 X 线示：肺部片状浸润阴影，诊断：ARDS 该患者最主要的治疗措施是（ ）（ ）

- A、控制感染
- B、纠正缺氧
- C、补充体液
- D、营养支持
- E、心理疏导

正确答案：B

5、李女士在医院生 1 女婴，体重 3000g，身长 51cm，村医 5 天后进行新生儿访视发现婴儿以下情况，需要建议转诊治疗的是（）（）

- A、婴儿体温 37.5℃
- B、婴儿体重 2800g
- C、婴儿皮肤粘膜发黄
- D、心率 130 次/分
- E、大便每天 10 次以上

正确答案：E

6、心肺复苏操作要点（）

- A、患者仰卧在坚硬平面（地面或垫板）
- B、需暴露患者胸腹部，松开腰带
- C、按压和通气比 30：2
- D、以上都是

正确答案：D

7、急性肾衰竭病人每日饮食中所提供的热量应为（）

- A、 $>100\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{d})$
- B、 $>126\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{d})$
- C、 $>1500\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{d})$
- D、 $>146\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{d})$

正确答案：B

8、动脉采血后局部按压的时间为（）分钟（）

- A、3-5
- B、5-10
- C、2-3
- D、10-15
- E、20

正确答案：B

9、心包纵膈引流时，如发现引流量（），连续 3~4 小时无减少，提示活动性出血，立即报告医师处理。（）

- A、 $>3\sim4\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$
- B、 $>5\sim6\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$
- C、 $>2\sim3\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$
- D、 $>4\sim5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$

E、 $>1\sim 2\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$

正确答案：D

10、空气栓塞致死的原因是气体阻塞（）（）

A、肺动脉入口

B、主动脉入口

C、下腔静脉入口

D、肺静脉入口

E、上腔静脉入口

正确答案：A

11、肝硬化患者肝功能失代偿期最突出的临床表现（）

A、乏力

B、腹水

C、食欲不振

D、肝性脑病

E、恶心、呕吐

正确答案：B

12、插管操作结束后，为证实胃管是否确在胃内，进行检查时，错误的方法是（）

A、抽吸出胃液

B、胃管末端放入水杯有无气体溢出

C、注入少量温开水，同时听胃部有无水泡声

D、抽吸出液体用 pH 试纸测试

E、注入少量空气，同时听胃部有无气过水声

正确答案：C

13、禁用热敷的病人是（）（）

A、急腹症

B、牙痛

C、胃出血

D、脑出血

E、术后尿潴留

正确答案：E

14、脑损伤后病人急性期康复的主要内容是（）

A、日常生活动作训练

B、排尿障碍和吞咽障碍的处理

C、肢体训练

D、心理康复

正确答案：B

15、胆脂瘤型中耳炎最危险的并发症是() ()

A、迷路炎

B、颈深部感染

C、耳后瘻管

D、颅内并发症

E、面瘫

正确答案：D

16、肝硬化患者失代偿期最突出的表现是 ()

A、脾功能亢进

B、腹水

C、电解质紊乱

D、消化道症状

E、出血倾向

正确答案：B

17、患者，男性，65 岁。因“右侧肢体活动不便 6h”□□□□□□□□

楚，右侧肢体肌力为 2 级。既往有高血压和糖尿病病史，曾发生过 TIA。

对于该患者，最有价值的确诊辅助检查是 () ()

A、颈部血管超声

B、肌电图

C、腰椎穿刺

D、脑血管造影

E、头颅 CT或 MRI

正确答案：E

18、壶腹部癌的临床特点是较早出现 ()

A、黄疸、寒战、发热

B、转移症状

C、贫血消瘦

D、消化道症状

E、上腹痛及脊背痛

正确答案：A

19、关于休克早期描述正确的是 () ()

- A、尿量减少
- B、中度口渴
- C、神志模糊，伴痛苦的表情，精神紧张
- D、舒张压降低，脉压缩小
- E、脉搏增快，收缩压正常或稍升高

正确答案：E

20、下列选项中，不属于脑卒中一级预防的内容是（ ）

- A、积极进行康复训练
- B、控制体重
- C、戒烟限酒
- D、防治心脏病
- E、应用他汀类药物控制血脂

正确答案：A

21、机械通气时潮气量的选择常用（ ）（ ）

- A、10 mL/kg
- B、20 mL/kg
- C、5 mL/kg
- D、25 mL/kg
- E、15 mL/kg

正确答案：A

22、胆道完全梗阻常排出（ ）（ ）

- A、暗红色便
- B、柏油样便
- C、鲜红色便
- D、陶土色便
- E、果酱样便

正确答案：D

23、何种颅骨骨折的典型表现为“熊猫眼”征（ ）

- A、顶骨骨折
- B、颅前窝骨折
- C、颅中窝骨折
- D、颅后窝骨折

正确答案：B

24、腹部CT应于检查前多少分钟口服泛影葡胺（ ）

- A、 90 分钟
- B、 10 分钟
- C、 30 分钟
- D、 5 分钟
- E、 60 分钟

正确答案： C

25、 哺乳期乳腺脓肿的治疗原则不包括 () ()

- A、 提高患病期间哺乳生活质量
- B、 放弃哺乳生活质量， 追求快速缓解症状
- C、 尽量保留哺乳功能
- D、 避免剧烈疼痛
- E、 创伤微小

正确答案： B

26、 患者刘某， 在河中游泳时不慎溺水， 查体： 神志不清， 口含泥沙、 河水， 呼吸微弱， 脉搏 60 次/分， 以下措施正确的是 () ()

- A、 立即呼叫 120 等待救援
- B、 立即头偏一侧， 清除口腔异物
- C、 立即胸外心脏按压
- D、 叫人抬送医院
- E、 立即联系其家人

正确答案： B

27、 肝颈静脉回流征阳性提示 () ()

- A、 左心功能不全
- B、 高血压病
- C、 右心功能不全
- D、 右心房衰竭
- E、 肝硬化

正确答案： C

28、 急诊分诊时， 一般将病人病情分为几级 ()

- A、 一级
- B、 五级
- C、 三级
- D、 四级

正确答案： D

29、腹部术后行胃肠减压的患者，拔管的依据为（ ）

- A、术后 24h
- B、术后 46~47h
- C、肛门有排气
- D、术后 48h
- E、先快后慢

正确答案：C

30、易发生心肌梗死的部位依次为下列哪项（ ）（ ）

- A、右冠状动脉、左冠状动脉前降支、右冠状动脉、左冠状动脉回旋支、左冠状动脉主干
- B、左冠状动脉前降支、右冠状动脉、左冠状动脉回旋支、左冠状动脉主干
- C、左冠状动脉回旋支、左冠状动脉主干、右冠状动脉、左冠状动脉前降支
- D、左冠状动脉主干、左冠状动脉前降支、右冠状动脉、左冠状动脉回旋支
- E、右冠状动脉、左冠状动脉回旋支、左冠状动脉主干、左冠状动脉前降支

正确答案：B

31、为增加血浆渗透压，应选用（ ）

- A、10%葡萄糖溶液
- B、低分子右糖酐
- C、5%葡萄糖液
- D、0.9%氯化钠溶液
- E、5%碳酸氢钠

正确答案：B

32、糖尿病足预防要点不包括（ ）

- A、温水洗脚不泡脚
- B、定期自行消除鸡眼
- C、不赤脚穿凉鞋，拖鞋行走
- D、告知患者足部检查的方法
- E、选择浅色，透气性好的袜子

正确答案：B

33、建档是指完成个人基本信息表和（ ）

- A、健康评价
- B、随访记录
- C、健康档案封面
- D、健康体检
- E、发放医疗保健卡

正确答案：C

34、关于高血压的危害，错误的是（）（）

- A、导致肾衰竭
- B、引起冠状动脉粥样硬化
- C、形成脑血栓
- D、引起肝硬化
- E、引起视网膜出现出血、渗出、水肿等

正确答案：D

35、血氨升高是肝性脑病的发病机制之一，氨吸收的主要部位在（）

- A、直肠
- B、小肠
- C、结肠
- D、胃
- E、十二指肠

正确答案：C

36、患者，男性，慢性支气管炎 20 年，感冒 2 天，现不能平卧，咳嗽，咳粉红色泡沫痰，双肺底有湿罗音，应考虑（）（）

- A、支气管扩张
- B、右心衰竭
- C、肺气肿
- D、左心衰竭
- E、慢性支气管炎

正确答案：D

37、碘伏消毒效力属（）（）

- A、中效
- B、中低效
- C、高效
- D、高中效
- E、低效

正确答案：A

38、当病人血气分析提示： $\text{PaO}_2 37\text{mmHg}$ $\text{PaCO}_2 > 69\text{mmHg}$ 病人应采用下列哪项用氧方式：（）（）

- A、低流量、高浓度持续给氧
- B、低浓度、高流量持续给氧
- C、低流量、低浓度持续给氧
- D、低流量、低浓度间断给氧
- E、高流量、高浓度间断给氧

正确答案：C

39、患者男性，59 岁，卒中出院后在家自行锻炼。平均每天运动 6 小时以上，近期，患者出现关节疼痛，难以行走。出现这种情况最可能的原因是（）（）

- A、废用综合征
- B、误用综合征
- C、过用综合征
- D、滥用综合征
- E、以上均可能

正确答案：B

40、男，25 岁，1 日前突起畏寒发热，体温达 39.8°C ，并出现咳嗽，痰中带血，左胸刺痛放射到左肩部。体格检查：左肺呼吸音低，无啰音。为明确诊断，最有意义的检查是（）（）

- A、X线胸片
- B、血常规
- C、血培养
- D、痰涂片
- E、心电图

正确答案：D

41、肝硬化病人消化系统特征性的症状是（）

- A、反复呕吐
- B、节律性腹痛
- C、食欲下降
- D、反酸
- E、厌油腻食物

正确答案：E

、胃穿孔时腹腔穿刺抽出液的性质是（ ）

- A、黄色、浑浊无臭味
- B、稀脓性有臭味
- C、血性脓液有臭味
- D、血性渗液
- E、不凝固血液

正确答案：A

43、62 岁男性患者，因患糖尿病 9 年而长期接受胰岛素治疗，尿糖基本控制在（+~++）。昨晚因多食后，今上午尿糖定性试验为（+++），自行增加了胰岛素计量，1 小时后突然感到心悸、饥饿、出冷汗，随即昏迷。对该患者，应立即给予下列哪项处理措施（ ）

- A、静脉滴注小剂量胰岛素
- B、静脉滴注 50g/L 碳酸氢钠 100mg
- C、静脉滴注复方氯化钠溶液
- D、静脉注射氯化钾
- E、静脉注射 50g/L 葡萄糖溶液

正确答案：E

44、猝死最常发生于（ ）

- A、主动脉瓣狭窄
- B、心内膜炎
- C、二尖瓣脱垂
- D、冠心病
- E、肥厚型心肌病

正确答案：D

45、患者因输液左上肢出现索条状红线，红肿热痛，伴畏寒、发热。下述处理错误的是（ ）

- A、用抗生素
- B、超短波理疗
- C、增加患肢活动
- D、95%乙醇湿敷
- E、抬高患肢

正确答案：C

46、腹部空腔脏器破裂最主要的临床表现是（ ）

- A、胃肠道症状

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/655331340144011332>