

2024 年海南省陵水黎族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题含答案（典型题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于蛋白酶抑制剂的是（）

- A: 齐多夫定
- B: 依非韦伦
- C: 利巴韦林
- D: 利托那韦

答案：D

2. 适宜与乳酶生伍用的药物是

- A: 干酵母
- B: 抗酸药
- C: 抗生素
- D: 磺胺类

答案：A

3. 雷尼替丁

- A: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- B: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- C: 可导致驾驶员多尿或多汗
- D: 可使驾驶员出现定向力障碍

答案：D

4. 患者，男，因药物中毒被紧急送医，中毒表现为昏迷、针尖样瞳孔、呼吸抑制，造成这种中毒症状的常见药物是

- A: 吗啡
- B: 苯巴比妥
- C: 香豆素类杀鼠药
- D: 阿米替林

答案：A

5. 溃疡性结肠炎活动期的生化检查标志是

- A: 白细胞计数降低
- B: 血沉
- C: 血红蛋白升高
- D: 凝血酶原时间缩短

答案：B

6. 隔日 1 次用药的外文规范缩写是

- A: qod
- B: qh
- C: qn
- D: qd

答案：A

7. Hb 量 31~60g/L 可诊断为

- A: 中度贫血
- B: 轻度贫血
- C: 基本正常
- D: 重度贫血

答案：D

8. 易诱发致残性运动并发症的帕金森病治疗药为（）

- A: 金刚烷胺
- B: 普拉克索
- C: 苯海索
- D: 复方左旋多巴

答案：D

9. 服药后饮水可能会引起水潴留的药物是

- A: 利胆药
- B: 抗尿结石药
- C: 抗利尿药
- D: 苦味健胃药

答案：C

10. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 动脉注射
- B: 腔内注射
- C: 膀胱灌注
- D: 腹腔注射

答案：C

11. (常用的特殊解毒剂的适应证)，丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

- A: 谷胱甘肽
- B: 纳洛酮
- C: 二巯丁二钠
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：A

12. 下列临床试验分期中，属于上市后药品临床再评价阶段的是

- A: IIa 期临床试验
- B: III期临床试验
- C: IV期临床试验
- D: I 期临床试验

答案：C

13. 以下药物中，可引起粒细胞减少症的是()。

- A: 环磷酰胺
- B: 巯嘌呤
- C: 甲氨蝶呤
- D: 吲哚美辛

答案：D

14. 患者，男，72岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μg bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100pgpm 吸入，氨氯地平片 5mgqd 口服及硝酸甘油片 0.5mgpm 舌下含服。

- A: 呼气→摇匀→揿压阀门并深吸气→屏气约 10 秒→漱口
- B: 呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约 10 秒→漱口
- C: 摇匀→呼气→深吸气同时揿压阀门→屏气约 10 秒→漱口
- D: 漱口→摇匀→呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约 10 秒

答案：C

15. 患者，女，50 岁，50kg，157cm，患复发转移性乳腺癌，术后使用曲妥珠单抗进行靶向治疗。药师应告知的用药注意事项和患者教育，错误的是

- A: 每周给药 1 次，第 1 周给药剂量 200mg，静脉滴注 90min
- B: 从第 2 周起，每次给药 100mg，静脉滴注 30min
- C: 用药前应进行 RAS 基因筛查
- D: 用药期间应每 3 个月监测心脏功能

答案：C

16. 属于浓度依赖性抗生素的是

- A: 美沙拉秦肠溶片
- B: 多黏菌素
- C: 青霉素
- D: 林可霉素

答案：B

17. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 索利那新
- B: 非那雄胺
- C: 米多君
- D: 坦索罗辛

答案：B

18. 临床上治疗焦虑症应用最广泛的药物为

- A: 帕罗西汀
- B: 阿米替林

C: 舍曲林

D: 氟伏沙明

答案: A

19. Hb 量>90g/L 与低于正常参考的下限可诊断为

A: 重度贫血

B: 轻度贫血

C: 基本正常

D: 中度贫血

答案: B

20. 1%硫酸镁溶液洗胃用于解救

A: 苯丙胺中毒

B: 铅中毒

C: 汞中毒

D: 磷化锌中毒

答案: B

21. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 左眼

A: NS

B: DOL

C: O

D: LD

答案: B

22. 作为退热药的首选，对乙酰氨基酚的优势是

A: 解热作用强，镇痛作用较弱

B: 大剂量对肝脏有损害

C: 正常剂量下较为安全有效

D: 可作用缓和而持久

答案: C

23. 归属"患者基本情况"的是

A: 医保和费用支付情况

B: 联合用药

C: 临床诊断

D: 主要实验室检查数据

答案: A

24. (2016 年真题) 甲状腺功能亢进患者服用丙硫氧嘧啶, 可引起的典型药源性疾病是 ()。

A: 消化性溃疡

B: 慢性肾衰竭

C: 溶血性贫血

D: 粒细胞减少症

答案: D

25. 抗肿瘤药物中, 影响核酸合成的药物是

A: 顺铂

B: 甲氨蝶呤

C: 依托泊苷

D: 放线菌素

答案: B

26. 患者, 女, 27 岁, 妊娠 4 个月, 因肺结核给予异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合治疗。为避免胎儿神经毒性, 患者应补充

- A: 维生素 C
- B: 维生素 D
- C: 维生素 K1
- D: 维生素 B6

答案：D

27. 脂溶性中等，作用持续 3~6h 的是

- A: 苯巴比妥
- B: 巴比妥
- C: 戊巴比妥
- D: 硫喷妥

答案：C

28. 氟西汀与血浆蛋白的结合力强，使同服的华法林或洋地黄毒苷游离型浓度超出安全范围归属

- A: 药物制剂因素
- B: 药理作用
- C: 药动学相互作用
- D: 药物的使用

答案：C

29. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为（）

- A: 糖耐量异常
- B: 三酰甘油降低
- C: LDL-C 升高
- D: HDL-C 降低

答案：A

30. 可减弱华法林抗凝作用的药物为

- A: 阿司匹林
- B: 苯巴比妥
- C: 布洛芬
- D: 头孢哌酮

答案：B

31. (2017 年真题) 患者, 77 岁, 因感冒发热咳嗽, 自服酚麻美敏片、维 C 银翘片, 三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是 ()

- A: 维生素
- B: 氯苯那敏
- C: 银翘
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

32. 对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用, 蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

- A: 甲苯咪唑
- B: 阿苯达唑
- C: 噻嘧啶
- D: 枸橼酸哌嗪

答案：C

33. 妊娠期女性患泌尿系统感染, 需给予氨苄西林治疗, 给药剂量需要适当增加, 主要原因是

- A: 吸收降低
- B: 分布更广

C: 代谢更快

D: 排泄更快

答案: D

34. 能减弱华法林的抗凝作用的药物是

A: 韭菜

B: 芒果

C: 维生素 K

D: 地瓜

答案: C

35. 饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童可适当选服

A: 中草药制剂

B: 复合维生素

C: 复合营养素

D: 钙剂

答案: B

36. (2017 年真题) 患者女, 6 岁, 因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查: 白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 葡萄糖酸锌口服液

B: 维生素 C 片

C: 头孢克洛干混悬剂

D: 感冒清热冲剂

答案: C

37. 主要对成本进行量化分析、也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择是指

- A: 成本-效益分析
- B: 成本-效用分析
- C: 最大效果分析
- D: 最小成本分析

答案：D

38. (2017 年真题) 用于评估癌痛患者疼痛程度的是 ()

- A: 数字评分法
- B: Cochrane 证据分级
- C: CTP 评分标准
- D: APACHE 评分系统

答案：A

39. 能用结论较肯定的药物就不用新药，即

- A: 选用对胎儿危害较小的药物
- B: 用药必须有明确的指征和适应证
- C: 禁止用试验性药
- D: 可用可不用的药物应尽量不用或少用

答案：C

40. 某患者，男，78 岁既往有动脉粥样硬化史，因尿频，尿急就诊，体征和实验室检查结果为：血压 166/98mmHg，前列腺增生>60g，前列腺特异性抗原 (PAS) 正常，在控制患者血压的同时，应联合选用 ()

- A: 吲达帕胺
- B: 非那雄胺
- C: 丙酸睾酮

D: 泼尼松龙

答案: B

41. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8° C，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 分泌性腹泻

B: 消化不良性腹泻

C: 动力性腹泻

D: 感染性腹泻

答案: D

42. 人体健康参数：体重指数(BMI)正常区间是

A: 18.5~23.0

B: 18.0~22.0

C: 18.0~23.0

D: 18.5~23.9

答案: D

43. 吩噻嗪类抗精神病药中毒的临床表现是（）

A: 谵妄、躁狂、幻觉

B: 肌肉震颤、抽搐

C: 心血管毒性

D: 明显的锥体外系症状

答案: D

44. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 门冬胰岛素
- B: 维生素 C
- C: 青霉素
- D: 非那雄胺

答案: D

45. 血栓性疾病女性患者的凝血酶原时间可能短于

- A: 16 秒
- B: 11 秒
- C: 10 秒
- D: 18 秒

答案: B

46. 收集所有质量可靠的随机对照试验经分析属于

- A: 三级证据
- B: 四级证据
- C: 二级证据
- D: 一级证据

答案: D

47. 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大病史 3 年，临床上对该患者不宜选用 ()

- A: 苯海索

- B: 司来吉兰
- C: 左旋多巴
- D: 多巴丝肼

答案：A

48. 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

- A: 尿激酶
- B: 达比加群酯
- C: 依诺肝素钠
- D: 氯吡格雷

答案：D

49. 抑制细菌叶酸合成的药物是

- A: 头孢米诺
- B: 利福喷汀
- C: 磺胺嘧啶
- D: 头孢哌酮

答案：C

50. 关于血清天门冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 天门冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中
- B: 天门冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能
- C: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）与谷丙转氨酶（GPT）是同一概念
- D: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT

答案：A

51. (2016 年真题) 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是 ()。

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 西地碘片
- C: 乳酶生片
- D: 硫普罗宁片

答案: A

52. IV 期临床试验是在广泛使用的条件下考察药品疗效和不良反应，样本数常见病不少于

- A: 100 例
- B: 300 例
- C: 1000 例
- D: 2000 例

答案: D

53. 以下中毒病例中，临床应用特殊试剂能够明确诊断的是

- A: 丙咪嗪
- B: 苯巴比妥
- C: 硝西泮
- D: 奋乃静

答案: C

54. 阿司匹林

- A: 血小板减少
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 血红蛋白量增多
- D: 中性粒细胞减少

答案：A

55. 适用于阿司匹林哮喘伴有过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 孟鲁司特钠咀嚼片
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 茶碱片

答案：B

56. 糖尿病合并肾病者首选

- A: 比格列酮
- B: 格列喹酮
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：B

57. 小檗碱、盐酸地芬酯、八面体蒙脱石用于细菌性腹泻，应评判为

- A: 联合用药不适宜
- B: 有禁忌证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 无适应证用药

答案：A

58. (致畸药物的种类与危害)可能导致胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 孕激素
- B: 雄激素
- C: 沙利度胺
- D: 氮芥类

答案：C

59. 可导致胎儿颅面部畸形、腭裂的药物是

- A: 沙利度胺
- B: 叶酸拮抗剂
- C: 苯巴比妥
- D: 雌激素、孕激素、雄激素

答案：B

60. 以下中毒解救措施中，正确的药物拮抗是

- A: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒
- B: 二巯丙醇拮抗亚硝酸钠
- C: 弱酸中和强碱
- D: 二巯丙醇结合铅

答案：C

61. 血脂调节药的合理应用有效降低 LDL-C 和 TG 水平，升高 HDL-C 水平的是（）

- A: 他汀类与贝特类联用
- B: 伊曲康唑
- C: 依折麦布
- D: 普罗布考

答案：A

62. 患者，女性，32 岁，咳嗽、有脓性痰，痰液色黄或黄白相间，右侧胸痛，吸气时明显。体检：体型胖，神志清，急性病容，无口唇发绀，呼吸急促，体温 39.3℃，心率 100 次/分，肺部可闻及湿性啰音，WBC $14 \times 10^9/L$ ，对青霉素类药物过敏。临床诊断为社区获得性肺炎。

- A: 链霉素
- B: 左氧氟沙星
- C: 红霉素
- D: 布地奈德

答案：B

63. 治疗胆囊炎的药物需选用

- A: H₂ 受体阻断剂
- B: 质子泵抑制剂
- C: M 受体激动剂
- D: 消炎利胆片

答案：D

64. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为预防治疗，最佳剂量范围是

- A: 150～300mg / d
- B: 25～75mg / d
- C: 25～50mg / d
- D: 75～150mg / d

答案：D

65. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是 ()。

- A: 75mgqd
- B: 7.5mg tid
- C: 7.5mgqw
- D: 7.5mgqod

答案：C

66. 儿童退热的用药选择和单次用量,正确的是()

- A: 阿司匹林 30~60mg/kg
- B: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg
- C: 布洛芬 0.4~0.6g (12 岁以上儿童)
- D: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg

答案：B

67. 和缓医疗总的原则不包括 ()

- A: 无痛苦
- B: 有益
- C: 不伤害
- D: 尊重

答案：A

68. (2018 年真题) 患者,男,65 岁,诊断为持续性心房纤颤,医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症,目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况,药师提出的合理化药物治疗建议,不包括 ()

- A: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量
- B: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量
- C: 患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗
- D: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平或 CCB 降压药

答案：D

69. 下列剂型中，严禁直接服用或口含的是

- A: 泡腾片
- B: 肠溶片
- C: 舌下片
- D: 缓释片

答案：A

70. 1U 维生素 A 相当于

- A: 0.03 μg 维生素 A
- B: 3 μg 维生素 A
- C: 30 μg 维生素 A
- D: 0.3 μg 维生素 A

答案：D

71. 对主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等

- A: 用药起止时间
- B: 不良反应 / 事件的结果
- C: ADR/ADE 过程描述
- D: 用药原因

答案：C

72. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 支气管哮喘
- B: 慢性支气管炎急性发作
- C: 肺动脉栓塞
- D: 急性左心衰竭

答案：D

73. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

- A: 雷特格韦
- B: 洛匹那韦
- C: 阿巴卡韦
- D: 奈韦拉平

答案：B

74. 流行性感感冒发病后 48 小时内使用效果最好的抗病毒药是

- A: 金刚烷胺
- B: 布洛芬
- C: 奥司他韦
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

75. 儿科用药中，对新生儿或婴儿最常用的给药途径是

- A: 静脉注射
- B: 口服给药
- C: 静脉滴注
- D: 肌肉注射

答案：C

76. (2019 年真题) 湿疹患者的实验室检查结果常会出现

- A: 中性粒细胞减少
- B: 淋巴细胞增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 淋巴细胞减少

答案：C

77. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 下肢动脉栓塞
- C: 病理性骨折
- D: 下肢深静脉血栓形成

答案：D

78. 糖尿病酮症酸中毒患者应选用

- A: 二甲双胍
- B: 大剂量碘剂
- C: 胰岛素
- D: 格列本脲

答案：C

79. 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是（）。

- A: 可能
- B: 很可能
- C: 可能无关
- D: 肯定

答案：D

80. 对由甲氨蝶呤所引发的贫血者，宜应用的药物是

- A: 维生素 B12
- B: 富马酸亚铁
- C: 烟酸
- D: 叶酸+维生素 B12

答案：D

81. (2017 年真题) 下列药物使用方式, 正确的是 ()

- A: 酵母片在餐后整片用水送服
- B: 氧氟沙星滴眼液打开使用后, 继续使用 3 个月
- C: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用
- D: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服

答案：C

82. (2019 年真题) 患者，男，65 岁，因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院，诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氨溴索
- C: 右美沙芬
- D: 羧甲司坦

答案：C

83. II 期临床试验很难发现"低于 1%发生频率"的不良反应，缘于

- A: 考察不全面
- B: 病例数目少

C: 管理漏洞

D: 观察时间短

答案: B

84. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 左乙拉西坦

B: 丙戊酸钠

C: 阿卡波糖

D: 卡马西平

答案: D

85. pH 碱性的感染尿液常见

A: 酪氨酸和亮氨酸结晶

B: 磷酸盐结晶

C: 尿酸盐结晶

D: 草酸盐结晶

答案: B

86. 餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高的 2 型糖尿病患者首选

A: 格列喹酮

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 比格列酮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/656033200100011030>