

甘肃省舟曲县 2024 年《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试通关秘籍题库及参考答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 头孢克洛片及胶囊应存放于（）。

- A: 常温库
- B: 专用仓库
- C: 凉暗库
- D: 低温库

答案：C

2. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 链霉素
- B: 米诺环素
- C: 克拉霉素
- D: 阿奇霉素

答案：A

3. 易受光线影响而变质的药品是

- A: 阿卡波糖片
- B: 头孢曲松钠
- C: 复方甘草合剂

D: 硝酸甘油

答案：D

4. 肝脏具有十分重要和复杂的生理功能。首先是人体内各种物质代谢和加工的中枢，其次是有生物转化和解毒功能，所有进入人体的药物或毒物，都会在肝脏发生氧化、还原、水解、结合等化学反应，最后以原形药或代谢物的形式排出体外。

A: 肝硬化

B: 缺铁性贫血

C: 急性胰腺炎

D: 糖尿病

答案：A

5. 下列药物中使用前无需皮试的是

A: 抑肽酶注射剂

B: 抗狂犬病病毒血清注射剂

C: 苄星青霉素注射剂

D: 紫杉醇注射剂

答案：D

6. 非那雄胺用于治疗充盈性尿失禁、前列腺增生症，其主要不良反应是

A: 性功能减退、乳房增大

B: Q-T 间期延长

C: 眼内压升高

D: 体位性低血压

答案：A

7. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌证是（）

- A: 双侧肾动脉狭窄
- B: 冠心病
- C: 心力衰竭
- D: 痛风

答案：C

8. 患者，女，37 岁，因小腹胀痛 2 月余、加重 5 天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5 天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。8 超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

- A: 应局部给药
- B: 不宜静脉给药
- C: 应联合给药
- D: 应单一用药

答案：C

9. 患者，男，36 岁。临床诊断痛风性关节炎急性发作期。症见左侧踝关节红肿，剧烈疼痛。为控制炎症，治疗首选药是

- A: 布洛芬
- B: 非布司他
- C: 尼美舒利
- D: 秋水仙碱

答案：D

10. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

A: 博来霉素

B: 白消安

C: 氟尿嘧啶

D: 柔红霉素

答案：C

11. 以下联合用药中，依据“作用相加或增加疗效”机制的是

A: 阿托品联用吗啡

B: 阿托品联用普萘洛尔

C: 磺胺甲噁唑（SMZ）联用甲氧苄啶（TMP）

D: 氢溴酸山莨菪碱联用哌替啶

答案：C

12. 急性铅中毒出现

A: 肌肉震颤、抽搐

B: 恶心、呕吐、口内有金属味

C: 腐蚀性口腔炎

D: 恶心、呕吐、视力模糊

答案：B

13. 用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等“双硫仑反应”的药品是

A: 庆大霉素

B: 青霉素钾

C: 克林霉素

D: 甲硝唑

答案: D

14. 下列药物使用方式，正确的是

A: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用

B: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服

C: 氧氟沙星滴眼液打开后可使用 3 个月

D: 酵母片在餐后整片用水送服

答案: A

15. 肺结核最常见的传播方式为

A: 呼吸道传播

B: 垂直传播

C: 消化道

D: 血液传播

答案: A

16. 用量化的方法表达治疗目的，不以货币为单位。该药物经济学评价方法是

A: 最小成本分析

B: 成本-效益分析

C: 成本-效用分析

D: 成本-效果分析

答案: D

17. 用于有机磷中毒症状的对抗药物是

A: 亚甲蓝

B: 毛果芸香碱

C: 碘解磷定

D: 阿托品

答案: D

18. 延缓或降低抗药性的联合用药是

A: 硫酸阿托品联用吗啡

B: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压

C: 磷霉素联用其他抗菌药物

D: 头孢哌酮 / 舒巴坦复方制剂

答案: C

19. (2015 年真题) 处方中“餐前给药”的外文缩写是 ()。

A: pc

B: Ac

C: qn

D: po

答案: B

20. 早晨因咳嗽和打喷嚏引起的头痛，提示可能是

A: 脑肿瘤

B: 动脉瘤

C: 脑血管意外

D: 脑膜炎

答案: A

21. 根据药物对胎儿的危害, 美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别, 依那普利的妊娠毒性分级是 ()

A: C 级

B: X 级

C: D 级

D: A 级

答案: C

22. 发病急剧，常累及双眼（或间隔 1~2 天）伴有大量的黏液性分泌物（眼屎），于夜间分泌较多，在晨起时常会被分泌物糊住双眼的是

A: 流行性结膜炎

B: 过敏性结膜炎

C: 急性卡他性结膜炎

D: 流行性出血性结膜炎

答案: C

23. 肺结核的临床表现是

A: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

B: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

C: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月

D: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

答案: B

24. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

A: 精蛋白锌胰岛素

B: 普通胰岛素

C: 赖脯胰岛素

D: 门冬胰岛素

答案: D

25. 亚硝酸钠可用于解救

- A: 吗啡中毒
- B: 亚甲蓝中毒
- C: 氰化物中毒
- D: 重金属中毒

答案：C

26. 对于轻度（IPSS<8 分）至中度（IPSS 为 8~19 分）前列腺增生症患者，建议初始治疗药物是

- A: 米多君
- B: 非那雄胺
- C: 奥昔布宁
- D: 坦索罗辛

答案：D

27. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法使用疗程为（）

- A: 10 日或 14 日
- B: 8~12 周
- C: 4~6 周
- D: 6~8 周

答案：A

28. 服用他汀类调节血脂药可能导致

- A: 血清碱性磷酸酶升高
- B: 血白细胞计数降低
- C: 血清总胆固醇升高
- D: 血清白蛋白升高

答案：A

29. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是：

- A: 妊娠 27~32 周
- B: 妊娠 13~27 周
- C: 妊娠 1~2 周
- D: 妊娠 3~12 周

答案：D

30. 下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是()

- A: 恶性贫血者需要终生维持治疗
- B: 老年人和酗酒者为高危人群
- C: 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗
- D: 可静脉滴注维生素 B₁₂100~500 μg

答案：D

31. 三环类抗抑郁药的致死量通常高于

- A: 1g
- B: 2.5g
- C: 2g
- D: 1.5g

答案：C

32. 不良反应是口干、尿潴留

- A: 哌唑嗪
- B: 索利那新
- C: 特拉唑嗪

D: 度他雄胺

答案: B

33. 维生素 C 用于

A: 习惯性流产的辅助治疗

B: 防治夜盲症

C: 防治坏血病

D: 防治佝偻病

答案: C

34. (2017 年真题) 可能影响儿童骨骼发育的药物是 ()

A: 阿莫西林

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 头孢克洛

D: 诺氟沙星

答案: D

35. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

A: 二巯丙醇

B: 维生素 K

C: 亚甲蓝

D: 纳洛酮

答案: D

36. 老年人用氨基糖苷类药物时应谨慎，主要是因为老年人 ()。

A: 对药物处于高敏状态，影响中枢神经系统的功能

- B: 肾功能降低，药物半衰期延长，耳、肾毒性增加
- C: 血浆蛋白含量降低，使游离性药物增加
- D: 消化腺分泌减少，药物吸收增加

答案：B

37. 药师应告知医师"血药浓度监测是提高治疗效果的重要措施"的事例是

- A: 阿昔洛韦致急性肾衰竭
- B: 利巴韦林致畸与肿瘤
- C: 替加色罗存在心绞痛
- D: 地高辛用于肾功能不全者须监测血药浓度

答案：D

38. 患者,女,62岁,2型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难,不宜选用的药物是()

- A: 格列齐特
- B: 阿卡波糖
- C: 吡格列酮
- D: 二甲双胍

答案：C

39. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 阿米替林
- B: 苯巴比妥
- C: 卡马西平
- D: 硝西泮

答案：D

40. 心力衰竭的常用药方案是

- A: 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+强心苷类
- B: 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+钙通道阻滞剂
- C: 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+ACEI
- D: 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+B 受体阻断剂

答案：C

41. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

- A: 食醋
- B: 浓茶
- C: 酒
- D: 烟

答案：B

42. 增加肾毒性和耳毒性的配伍用药是

- A: 氨基糖苷类抗生素联用依他尼酸
- B: 普萘洛尔联用硝酸酯类
- C: 山莨菪碱联用盐酸哌替啶
- D: 肝素钠联用阿司匹林

答案：A

43. 治疗肺炎的抗菌药物的疗程一般为

- A: 3 天
- B: 5 天
- C: 15 天
- D: 7~10 天

答案：D

44. 可用于紫癜辅助治疗的药物是

- A: 维生素
- B: 复合维生素 B
- C: 维生素 A
- D: 维生素 C

答案：D

45. 以下对"调配处方四查十对"的叙述中，最正确的是

- A: 查配伍禁忌，对药品性状、规格、数量
- B: 查临床诊断，对用药合理性
- C: 查药品，对药名、剂型、规格、数量
- D: 查处方，对临床诊断

答案：C

46. 可导致胎儿颅面部畸形、腭裂的药物是

- A: 叶酸拮抗剂
- B: 雌激素、孕激素、雄激素
- C: 苯巴比妥
- D: 沙利度胺

答案：A

47. 关于奥利司他说法错误的是

- A: 进餐时服用
- B: 应在服药前 2h 补充维生素
- C: 对肝脏无影响
- D: 可干扰维生素的吸收

答案：C

48. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 氟喹诺酮类
- B: 青霉素
- C: 碳青霉烯类
- D: 头孢菌素

答案：A

49. 苯巴比妥中毒较深，血药浓度达到一定水平后，需采用血液净化进行解救，一般要求

- A: 浓度超过 20mg / L 时给予血液净化
- B: 浓度超过 60mg / L 时给予血液净化
- C: 浓度超过 40mg / L 时给予血液净化
- D: 浓度超过 80mg / L 时给予血液净化

答案：D

50. 使用解热镇痛药用于解热，症状未缓解应及时就诊或向医师咨询，一般不超过

- A: 4 日
- B: 3 日
- C: 1 日
- D: 2 日

答案：B

51. 我国高警示药品推荐目录(2015 版)中，新遴选列入的药品种类是

- A: 茶碱类药物(静脉途径)

B: 肠内营养制剂

C: 中药注射剂

D: 透皮贴剂

答案：A

52. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C: 厄贝沙坦

D: 比索洛尔

答案：C

53. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

A: 中等度热

B: 低热

C: 高热

D: 正常

答案：B

54. IV 期新药临床试验样本数要求

A: ≥ 300 例

B: 常见病 ≥ 12000 例

C: 20~30 例

D: 主要病种 ≥ 300 例

答案：B

55. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 典型不良反应是恶心、呕吐、腹泻
- B: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用
- C: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药
- D: 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂

答案：D

56. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

- A: 硫普罗宁片
- B: 乳酶生片
- C: 双歧三联活菌胶囊
- D: 西地碘片

答案：C

57. 患者女 27 岁确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果:HBV-DNA 2×10^5 opies/ml,ALT122U/L. 拟予以病毒治疗首选的药物是()

- A: 恩替卡韦
- B: 泛昔洛韦
- C: 利巴韦林
- D: 阿糖腺苷

答案：A

58. (2018 年真题) 患者,女,49 岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

- A: 服药期间及停药一周内,避免饮用含酒精饮品
- B: 服药期间,可能会发生便秘

C: 服药时避免与钙片同服,以免影响药物的作用

D: 用牛奶服药,减少对胃肠道的刺激

答案: D

59. 胶囊壳染料可引起固定性药疹

A: 生活和饮食习惯

B: 生理因素

C: 药物制剂因素

D: 药物的使用

答案: C

60. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用,是归属于查看材料

A: 参与健康教育工作的

B: 药学信息服务工作的

C: 处方点评工作的

D: 处方审核工作的

答案: B

61. (2019 年真题) 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

A: 软膏剂

B: 直肠栓剂

C: 滴眼剂

D: 含漱剂

答案: B

62. 可在尿中结晶, 送服药物时要喝约 250ml 水, 服药后也要多喝水, 保持高尿流量的药物是

- A: 卡马西平
- B: 左氧氟沙星
- C: 头孢哌酮
- D: 特拉唑嗪

答案：B

63. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

- A: 脱水
- B: 降压
- C: 扩容
- D: 止血

答案：A

64. 宜用常量短期治疗，以免产生依赖性，可用于 IBS 患者止泻的药物是

- A: 地芬诺酯
- B: 环孢素 A
- C: 匹维溴铵
- D: 蒙脱石散

答案：A

65. 患者，男，67 岁，患有糖尿病、冠心病、高血压，服用的药物包括二甲双胍、阿卡波糖、美托洛尔、阿司匹林、福辛普利。近期使用优维显（碘普罗胺注射液，一种碘化对比剂）做腹部增强 CT 扫描，须告知患者检查前数日应停用的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 福辛普利
- C: 美托洛尔
- D: 二甲双胍

答案：D

66. 患者，女性，32 岁，咳嗽、有脓性痰，痰液色黄或黄白相间，右侧胸痛，吸气时明显。体检：体型胖，神志清，急性病容，无口唇发绀，呼吸急促，体温 39.3° C，心率 100 次/分，肺部可闻及湿性啰音，WBC 14×10^9 /L，对青霉素类药物过敏。临床诊断为社区获得性肺炎。

- A: 链霉素
- B: 左氧氟沙星
- C: 布地奈德
- D: 红霉素

答案：B

67. 患者，男，50 岁，血压 170/90mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

- A: 利尿剂+CCB
- B: β 受体阻滞剂+ARB
- C: α 受体阻滞剂+ACEI
- D: 利尿剂+ARB

答案：A

68. 对慢性中重度铅中毒患者给予

- A: 卫生教育
- B: 糖皮质激素
- C: 补充蛋白质

D: 驱铅治疗

答案: D

69. 肠外营养液中 1g 葡萄糖能提供的热量是

A: 3kcal

B: 9kcal

C: 4kcal

D: 7kcal

答案: C

70. 下列药物中，患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 羧甲司坦

B: 喷托维林

C: 可待因

D: 苯丙哌林

答案: C

71. 属于胃黏膜保护剂的是()。

A: 奥美拉唑

B: 替普瑞酮

C: 哌仑西平

D: 雷尼替丁

答案: B

72. 有潜在的肺毒性的是

A: 苯巴比妥

B: 呋喃妥因

C: 双嘧达莫

D: 氯苯那敏

答案: B

73. 贫血患者常出现

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血小板增多

答案: A

74. 药师发现严重滥用药品的处方，应该

- A: 拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预
- B: 调配处方并发药
- C: 拒绝调配处方
- D: 拒绝调配处方，并依照有关规定报告

答案: D

75. 抗真菌药

- A: 血小板减少
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 中性粒细胞减少
- D: 血红蛋白量增多

答案: C

76. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

- A: 氯苯那敏
- B: 地西泮
- C: 文拉法辛
- D: 唑吡坦

答案：A

77. 在治疗痔疮的药物中，作为硬化剂或萎缩剂的是

- A: 草木犀流浸液片
- B: 苯酚甘油-水溶液
- C: 地奥司明
- D: 九华膏

答案：B

78. 可使高血压患者血压升高的药物是()

- A: 速感宁胶囊
- B: 抗感宁胶囊
- C: 复方酚咖伪麻胶囊
- D: 银翘解毒片

答案：C

79. 万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍；此例体现了药物警戒的作用包括

- A: 药品上市前风险评估

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 发现药品说明书问题
- C: 发现与规避假、劣药流入市场
- D: 药品上市后风险评估

答案：D

80. 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是

- A: 吗氯贝胺
- B: 文拉法辛
- C: 氟西汀
- D: 阿米替林

答案：A

81. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

- A: 二巯丙醇
- B: 青霉胺
- C: 二巯丁二钠
- D: 依地酸钙钠

答案：A

82. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}中华医学会的网址是

- A: www. cm
- B: org. cn
- C: www. cp
- D: org. cn

答案：A

83. (2019 年真题) 患儿，男，2 岁，误服水银后，应选用的洗胃液是

- A: 鸡蛋清
- B: 牛奶与水等量混合

C: 淀粉溶液

D: 1:5000 高锰酸钾溶液

答案: A

84. 用于癌性胸水

A: 静脉注射

B: 肌肉注射

C: 腔内注射

D: 动脉注药

答案: C

85. 在流行期间多见于小儿及老年体弱者

A: 病毒型

B: 胃肠型

C: 肺炎型

D: 神经型

答案: C

86. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 氯化钾

B: 红霉素

C: 奥美拉唑

D: 卡马西平

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/656101243000011032>