

## 健康评估试题库

考核比例：第一部分（基础知识）8%、第二部分（症状评估）20%、第三部分（身体评估）50%、第四部分（实验室检查）17%、第五部分（心电图检查）4%

第一部分 基础知识（包括绪论、健康评估的方法、健康资料与护理诊断）

### 一、A1/A2 型题

1、护理体检首先应进行（ ）

A、视诊检查 B、触诊检查 C、叩诊检查 D、听诊检查 E、嗅诊检查

2、下列做法不符合交谈原则的是（ ）

A、友好的称呼 B、时时打断与交谈无关的谈话 C、保持双目平视

D、适当的沉默 E、对前后矛盾的内容提出质疑

3、触诊可以补充（ ）

A、视诊所不能确定的体征 B、叩诊所不能确定的体征

C、听诊所不能确定的体征 D、嗅诊所不能确定的体征

E、问诊不能确定的体征

4、下列不属于既往史的内容是（ ）

A、传染病史 B、过敏史 C、烟酒嗜好 D、手术史 E、外伤史

5、护理程序正确的说法是（ ）

A、一种护理工作的分工类型 B、一种护理工作的简化形式

C、一种解决问题的方法 D、一种技术革新的程序

E、一种护理活动的循环过程

6、下列内容中，不属于问诊范围的是（ ）

A、一般资料 B、主诉 C、现病史 D、既往史 E、身体评估

7、护士获取客观健康资料的主要途径是（ ）

A、阅读病历及健康记录 B、病人家属的陈述 C、观察及体检获取

D、病人的抚养人提供 E、病人本人提供

8、对主诉的正确理解是（ ）

A、症状加持续时间 B、体征加持续时间 C、病名加持续时间

D、症状或体征加持续时间 E、最感痛苦的症状或体征

9、女性，45岁，卵巢囊肿，新入院。护士收集资料时，询问“您是否绝经了？”

这一提问属于（ ）

- A、间接提问                      B、主动提问      C、开放式提问  
D、闭合性提问      E、过渡性提问
- 10、诊断疾病最基本最重要的手段是（      ）  
A、详细的问诊      B、全面体检      C、实验室检查      D、心电图检查  
E、以上都是
12. 用于护理诊断陈述的 PES 式中的 E 表示（      ）  
A. 问题      B. 原因      C. 症状      D. 体征      E. 检查结果
13. 建立良好的护患关系的桥梁是（      ）  
A. 熟练的检查方法      B. 视诊      C. 身体评估      D. 诚恳的态度      E. 问诊
- 14、正确的问诊语言是（      ）  
A. 您腹泻前是否有左下腹痛?              B. 您大便有潜血吗?  
C. 您腹泻时是否有里急后重感?      D. 您除腹泻外是否还有其他不舒服?  
E. 您是不是在情绪紧张时容易腹泻?
15. 下列哪种方法收集的资料是主观资料（      ）  
A. 身体评估结果              B. 亲属提供的信息      C. 化验检查结果  
D. X 线检查结果              E. 心电图报告
- 16、收集资料最重要的方法是（      ）  
A、查阅病历      B、护理体检      C、观察      D、交谈      E、门诊资料
- 17、主观资料是指（      ）  
A、患者的诉说                              B、医生的判断                              C、护士的判断  
D、陪人的诉说                              E、家人的诉说
- 18、最准确、最可靠的健康资料来源（      ）  
A、患者              B、医生              C、护士              D、陪人              E、家属
- 19、交谈时最先向患者作（      ）  
A、身体评估              B、了解病史              C、开放性提问  
D、介绍医院              E、自我介绍
- 20、下列哪项不是护理诊断的类型（      ）  
A、现存的护理诊断              B、有危险的护理诊断              C、健康的护理诊断  
D、潜在并发症：心输出量减少              E、有皮肤完整性受损的危险
- 21、属于主观资料的是（      ）

- A、心悸      B、黄疸      C、发绀      D、心脏杂音      E、肺部罗音
- 22、进行健康史采集时，错误的是（    ）
- A、收集完毕及时记录      B、客观资料应避免护士的主观判断  
C、主观资料护士不能带自己的判断      D、客观资料的记录尽量使用医学术语  
E、主观资料的记录只能用患者自己的语言
- 23、一位护士与一位患者交谈的过程中，当患者谈到住院以来高额的费用时异常激动、不满。为了缓解患者的情绪，护士此时可采取的交谈技巧是（    ）
- A、倾听      B、核实      C、提问      D、阐释      E、沉默
- 24、患者女性，70岁。腹部手术后第3天，护士在观察病情时获得资料：患者的肠鸣音每分钟4次。护士运用了身体评估哪种方法（    ）
- A、视诊      B、触诊      C、叩诊      D、听诊      E、嗅诊
- 25、不利于抓住患者交谈内容的是（    ）
- A、从主诉开始引导话题      B、事先了解患者资料      C、随意提出新话题  
D、解释患者的提问      E、准备交谈提纲
- 26、一位护士在与患者交谈过程中，希望了解更多患者对其疾病的真实感受和治理看法。最适合的交谈技巧是（    ）
- A、认真倾听      B、仔细核实      C、及时鼓励      D、封闭式提问      E、开放式提问
- 27、一护士在与一位胃溃疡患者交谈中，当患者说道“我今天早上大便颜色特别黑”时，护士问道：“你刚才说你大便怎么了？”此护士特别运用了交谈技巧中的（    ）
- A、耐心倾听      B、仔细核对      C、详细阐释  
D、及时鼓励      E、封闭式提问
- 28、护士评估某患者时，发现其排出的尿液呈烂苹果味，该患者很可能是（    ）
- A、膀胱炎      B、尿道炎      C、前列腺炎  
D、急性肾炎      E、糖尿病酸中毒
- 29、患者女性，38岁。患“胃溃疡”3年，现呕血600ml，心悸气促，脉搏细速。体检：精神萎靡，皮肤干燥。T36.5℃，P108次/min，R24次/min，BP80/60mmHg。属于主观资料的是（    ）
- A、皮肤干燥      B、心悸气促      C、精神萎靡      D、血压下降      E、T36.5℃
30. 护理体检的最终目的是（    ）

- A. 全面采集病人的资料    B. 纠正医生不妥的诊断    C. 解决病人的健康问题  
D. 取得病人的信任    E. 结合病史做出医疗诊断
31. 护理病史采集中错误的做法是 (     )
- A. 护士先做自我介绍    B. 询问病史时多问少听    C. 交谈中避免套问  
D. 结束谈话时简单重复内容    E. 对患者的疑虑应作必要的指导
32. 采集护理病史时获得重要线索主要依靠 (     )
- A. 全面的护理体检    B. 详细询问病史    C. 作血、尿、便常规检查  
D. 仔细阅读门诊病历    E. 先进的医疗仪器检查
33. 患者，女性，因发热、胸痛、咳嗽 2 日入院。护理体检：体温 40℃，右下肺闻及湿性罗音。血白细胞计数  $12.0 \times 10^9/L$ 。入院诊断：发热待查：肺炎？该患者的护理诊断是 (     )
- A. 发热待查    B. 肺炎    C. 体温过高    D. 肺部    E. 白细胞计数增高
34. 患者，女性，22 岁。因咳嗽、痰中带血 3 日，以“支扩”收入住院。今晨突然大咯血 500ml。该患者最主要的护理诊断是 (     )
- A. 焦虑    B. 活动无耐力    C. 有窒息的危险  
D. 知识缺乏    E. 有感染的危险
35. 患者，男性，68 岁。慢性肺气肿病史 30 多年，2 周前感冒后出现发热，咳嗽，咳大量粘液脓痰，近 3 天来咳嗽无力，痰液特粘，不易咳出，气急、发绀。该患者最主要的护理诊断是 (     )
- A. 气体交换受损    B. 清理呼吸道无效    C. 有窒息的危险  
D. 呼吸型态改变    E. 恐惧
36. 患者，女性，23 岁。受凉后出现高热、咳嗽、咳痰，诊断为肺炎。该病例的护理诊断是 (     )
- A. 体温过高    B. 活动无耐力    C. 组织灌注量改变  
D. 有窒息的危险    E. 营养失调：低于机体的需要量
37. 患者，男性，76 岁。慢性支气管炎 24 年，护士收集的资料中属于主观资料的是 (     )
- A. 体温 38.7℃    B. 肺部听诊可闻及干湿性罗音    C. 呼吸运动减弱  
D. 咳嗽、咳痰    E. 呼吸音粗糙
38. 为了保证交谈结果有效，交谈过程中，护理人员不应该采取的方式是 (     )

- A. 澄清相关内容    B. 复述患者的内容    C. 对患者相关问题进行解析  
D. 对患者的内容马上提出表示怀疑    E. 可以恰当的方式打断患者的叙述
39. 患者，女性，因咳嗽可叹注射青霉素治疗后，出现头晕、眼花、抽搐、面色苍白、呼吸急促、神志模糊，此时护士应立即（    ）
- A. 详细询问护理病史    B. 全面进行护理体检    C. 报告医师，配合抢救  
D. 重点询问、对症护理    E. 做好各种标本采集准备
40. 有关护理病史采集的方法与技巧，不应采取的是（    ）
- A. 采集前先进行过渡性交谈    B. 一般先从家族史问起    C. 由简易问题开始  
D. 避免使用医学术语    E. 避免逼问和套问
41. 不属于生活习惯与嗜好的内容是（    ）
- A. 起居情况    B. 个人卫生    C. 饮食规律    D. 烟酒嗜好    E. 经济条件
42. 既往史的内容包括（    ）
- A. 诊疗经过    B. 主要症状    C. 曾患疾病    D. 社会经历    E. 生活习惯
43. 护理病史采集的重点不包括（    ）
- A. 对医护的需求    B. 对疾病的认识    C. 对疾病的诊断  
D. 日常生活习惯    E. 住院带来的问题
44. 护士收集资料成功的关键是（    ）
- A. 患者能说会道    B. 患者病情简单    C. 患者文化程度的高低  
D. 取得患者的信任    E. 善于运用沟通技巧
45. 护理病史的主体部分是（    ）
- A. 主诉    B. 现病史    C. 既往史    D. 个人史    E. 家族史
46. 采集护理病史的时间宜在（    ）
- A. 入院即刻进行    B. 入院 24h 后    C. 入院 48h 后  
D. 入院安排床位时    E. 入院安排就绪后
47. 对发热病人的询问，正确的是（    ）
- A. “发热前有寒颤吗？”    B. “您除了发热还有哪里不舒服吗？”  
C. “您体温上升都在下午吗？”    D. “您发热时有无头痛？”  
E. “您发热时有谵妄吗？”

## 二、A3/A4 型题

(1~2 题共用题干)

患者男性，76 岁。慢性支气管炎 24 年，自诉发热、咳嗽，咳黄色粘痰 5 天，自觉咳嗽无力，痰液粘稠不易咳出。吸烟 40 年，20 支/天，难以戒除。体检：精神萎靡，皮肤干燥，体温 38.7℃，肺部听诊可闻及干、湿性罗音。

1、属于主观资料的是 ( )

A、皮肤干燥      B、痰液粘稠      C、体温 38.7℃

D、无力咳嗽      E、肺部干、湿性罗音

2、患者目前最主要的护理问题是 ( )

A、清理呼吸道无效      B、体温异常      C、活动无耐力

D、知识缺乏      E、组织灌注量不足

(3~4 题共用题干)

患者，女，25 岁。淋雨后打喷嚏、咳嗽、鼻塞、流涕，开始为清水样，3 天后变稠，伴有咽痛。护理体检：扁桃体 II 度肿大，呼吸音粗。

3. 进行病史采集时，最适合的交谈技巧是 ( )

A. 认真倾听      B. 仔细核实      C. 及时鼓励

D. 随意提出新话题      E. 开放式提问

4. 该病人的客观资料的是 ( )

A. 咽痛      B. 咳嗽      C. 打喷嚏

D. 扁桃体肿大      E. 鼻塞

## 第一部分 基础知识

参考答案：

### 一、A1/A2 型题

1. A 2. B 3. A 4. C 5. D 6. E 7. C 8. D 9. D 10. B 11. C 12. B 13. E

14. D 15. B 16. B 17. A 18. A 19. E 20. D 21. A 22. E 23. E 24. D 25. C

26. E 27. B 28. E 29. B 30. C 31. B 32. B 33. C 34. C 35. B 36. A

37. D 38. D 39. C 40. B 41. E 42. C 43. C 44. D 45. B 46. E 47. B

### 二、A3/A4 型题

1. D 2. A 3. A 4. D

## 第二部分 症状评估

### 一、A1/A2 型题

1. 体温持续在 39~40℃ 以上，数天或数周，24 小时以内波动范围不超过 1℃，称之为（ ）  
A. 稽留热      B. 间歇热      C. 回归热      D. 弛张热      E. 波状热
2. 某发热病人出现寒战时，护士应考虑该病人的体温处于（ ）  
A. 体温上升期    B. 高热持续期    C. 体温下降期    D. 间歇无热期  
E. 用药物后期
3. 用很强的刺激不能唤醒患者，但有防御反应，各种生理反射存在，为（ ）  
A. 谵妄      B. 昏迷      C. 嗜睡      D. 昏睡      E. 意识模糊
4. 严重吸气性呼吸困难最主要的特点是（ ）  
A. 端坐呼吸      B. 鼻翼扇动    C. 哮鸣音      D. 呼吸加深加快      E. 三凹征
5. 大咯血是指 24h 咯血量在（ ）  
A. 100ml 以上      B. 200ml 以上    C. 300ml 以上    D. 500ml 以上    E. 1000ml 以上
6. 皮肤粘膜可出现发绀时毛细血管内还原血红蛋白绝对含量超过（ ）  
A. 100g/L      B. 75g/L      C. 50g/L      D. 45g/L      E. 30g/L
7. 呕吐大量暗红色血液最常见于（ ）  
A. 急性胃炎      B. 急性胃粘膜病变      C. 胃底、食道静脉曲张破裂出血  
D. 消化性溃疡并出血      E. 胃癌
8. 中老年患者，慢性上腹痛，无明显规律性，伴消瘦、呕血，应警惕（ ）  
A. 慢性胃炎      B. 消化性溃疡      C. 胃癌      D. 肝硬化      E. 胆囊炎
9. 引起肝细胞性黄疸最常见的原因（ ）  
A. 胆管结石      B. 胆道蛔虫病      C. 毛细胆管型病毒性肝炎  
D. 原发性胆汁性肝硬化      E. 病毒性肝炎
10. 肾源性水肿最主要特点是（ ）  
A. 水肿最先发生于颜面部      B. 水肿最先发生在下肢下垂部位  
C. 水肿发展迅速      D. 常伴有高血压      E. 低蛋白血症
11. 先发热后昏迷可能不是（ ）  
A. 脑出血      B. 中暑      C. 中毒性痢疾      D. 流行性脑脊髓膜炎    E. 结核性脑炎
12. 下列哪项是引起头痛的颅外病变（ ）

- A、脑膜炎 B、脑栓塞 C、脑震荡 D、蛛网膜下腔出血 E、颅骨肿瘤
- 13、40 岁以上长期吸烟者，咯血应考虑（ ）
- A、肺癌 B、支气管扩张 C、风心病二尖瓣狭窄 D、慢性支气管炎 E、肺结核
- 14、下列哪项体温是高热（ ）
- A. 38.1~39℃ B. 38.5~40℃ C. 39.1~40℃ D. 39.1~41℃ E. 41℃以上
- 15、深长而大的呼吸见于（ ）
- A、呼吸性酸中毒 B、代谢性酸中毒 C、呼吸性碱中毒 D、代谢性碱中毒  
E、以上都不是
- 16、大叶性肺炎的典型热型为（ ）
- A.稽留热 B.弛张热 C.间歇热 D.回归热 E.波状热
- 17、肾源性水肿的特点是（ ）
- A.伴颈静脉怒张 B.伴低蛋白血症 C.首先出现在身体下垂部位  
D.先消瘦，后水肿 E.伴肝大
- 18、夜间阵发性呼吸困难常见于（ ）
- A.胸腔积液 B.支气管哮喘 C.肺气肿  
D.急性右心功能不全 E.急性左心功能不全
- 19、中心性发绀的特点是（ ）
- A.皮肤冰冷 B.加温发绀可消失 C.常出现在肢端、颜面  
D.急骤出现 E.发绀部皮肤温暖
- 20、呕吐咖啡色液体最常见于（ ）
- A.急性胰腺炎 B.食管静脉曲张破裂出血 C.消化性溃疡  
D.急性胃粘膜病变 E.胆囊炎
- 21、鲜红血便，不与粪便混合仅粘附于粪便表面，提示（ ）
- A.上消化道出血 B.肛门或肛管疾病出血 C.小肠出血  
D.食管出血 E.十二指肠出血
- 22、全身黄染，粪便呈白陶土色，常见于（ ）
- A.溶血性黄疸 B.肝细胞性黄疸 C.先天性黄疸  
D.阻塞性黄疸 E.生理性黄疸
- 23、下列哪一项不符合典型心绞痛的疼痛特点（ ）
- A.情绪激动时易发生 B.疼痛性质呈刀割样 C.疼痛位于胸骨后

- D. 疼痛可放射至左肩                      E. 休息疼痛可缓减
- 24、以下哪种疾病发热最常见 (        )
- A、肺炎        B、心肌梗死        C、风湿热        D、脑出血        E、肠梗阻
- 25、咳粉红色泡沫痰，应首先考虑 (        )
- A、肺结核    B、肺脓肿        C、肺癌        D、急性肺水肿        E、肺梗塞
- 26、小量咯血是指 24 小时咯血量小于 (        )
- A、100ml        B、300ml        C、500ml        D、400ml        E、>500ml
- 27、感染性发热最常见的病原体是(        )
- A. 细菌        B. 病毒        C. 真菌        D. 立克次体        E. 支原体
- 28、下列对体温的描述不正确的是(        )
- A、1 日内波动范围不超过 1℃    B、口温一般在 37℃以上    C、肛温比口温高
- D、腋温 37.8℃为低热    E、腋温 40℃为高热
- 29、下列哪项不是引起头痛的颅内病变 (        )
- A. 脑膜炎    B. 脑血栓形成    C. 颅底骨折    D. 颅内占位性病变        E. 脑震荡
- 31、左心功能不全时出现呼吸困难主要是由于 (        )
- A. 体循环淤血    B. 腹水    C. 肺淤血水肿    D. 精神紧张        E. 膈肌活动障碍
- 32、下列病因中，引起干咳无痰的是 (        )
- A. 肺炎    B. 急性气管炎        C. 重症肺结核        D. 胸膜炎    E. 支气管扩张
- 33、下列各项支持呕血的是 (        )
- A. 有心脏病史        B. 有胸闷喉痒史        C. 经口腔排出
- D. 颜色鲜红        E. 混有食物残渣
34. 吸气性呼吸困难常见于 (        )
- A. 支气管哮喘        B. 喉头水肿        C. 重症肺炎
- D. 喘息性慢支炎        E. 慢性阻塞性肺气肿
35. 呕吐伴腹泻多见于 (        )
- A. 肠梗阻    B. 急性肝炎    C. 急性胃肠炎    D. 急性肾盂肾炎        E. 腹膜炎
- 36、长期腹泻，明显消瘦，腹部发现包块，可见于 (        )
- A. 结肠癌    B. 胃肠炎    C. 阿米巴痢疾    D. 细菌性食物中毒        E. 溃疡性结肠炎
- 37、当血中高铁血红蛋白量达到多少可出现紫绀 (        )
- A. 50g/L    B. 40g/L        C. 30g/L        D. 20g/L        E. 10g/L

- 38、下列哪种疾病出现发绀不是肺性发绀（ ）
- A. 阻塞性肺气肿 B. 气胸 C. 肺水肿 D. 弥漫性肺间质纤维化 E. 严重休克
- 39、最轻微的意识障碍是（ ）
- A、嗜睡 B、意识模糊 C、谵妄 D、昏睡 E、昏迷
- 40、小量咯血是指 24 小时咯血量小于（ ）
- A、100ml B、200ml C、300ml D、400ml E、500ml
- 41、呕血提示胃内积血量至少有（ ）
- A. 100~150ml B. 200~250ml C. 250~300ml D. 350~400ml E. 400~450ml
- 42、男，28 岁。车祸外伤后处于沉睡状态，不易被唤醒，仅在护士给其静脉输液扎针时苏醒片刻，但答非所问，很快又入睡。意识状态应评估为（ ）
- A、意识模糊 B、谵妄 C、昏睡 D、嗜睡 E、浅昏迷
- 43、属于非感染性发热的是（ ）
- A. 伤寒 B. 疟疾 C. 风湿热 D. 肺炎 E. 败血症
- 44、患者体温在 39℃ 以上，24 小时内波动范围超过 2℃，但都在正常水平以上，该患者的热型为（ ）
- A、波状热 B、间歇热 C、不规则热 D、弛张热 E、回归热
- 45、全身性水肿见于（ ）
- A. 肾小球肾炎 B. 蜂窝织炎 C. 药物过敏  
D. 血栓性静脉炎 E. 上腔静脉阻塞综合征
- 46、下列哪项可出现呼气性呼吸困难（ ）
- A. 喉痉挛 B. 胸腔积液 C. 支气管哮喘 D. 气管异物 E. 白喉
- 47、周围性发绀见于（ ）
- A. 阻塞性肺气肿 B. 气胸 C. 肺水肿 D. 肺炎 E. 严重休克
- 48、呕吐伴眩晕、眼球震颤者，应考虑（ ）
- A. 急性胃肠炎 B. 前庭器官疾病 C. 脑炎 D. 尿毒症 E. 脑出血
- 49、急性腹泻的病程一般在（ ）
- A. 1 周以内 B. 3 周以内 C. 1 月以内 D. 2 月以内 E. 3 月以内
- 50、处于熟睡状态不易唤醒，虽在强烈刺激下可被唤醒，但很快又入睡，醒时答话含糊或答非所问是指（ ）
- A .嗜睡 B. 意识模糊 C. 昏睡 D. 昏迷 E. 谵妄

- 51、对心源性水肿描述不准确的是（ ）
- A. 常伴肝大      B. 常伴颈静脉怒张      C. 常伴门静脉高压  
D. 严重时出现胸腹水      E. 常伴低蛋白血症
- 52、依发热的分度，中等度发热是（ ）
- A、39.1~41℃    B、38.1~39℃    C、37.2~38℃    D、>41℃    E、39~40℃
- 53、吞咽食物使胸骨后疼痛加剧可能是（ ）
- A. 反流性食管炎    B. 心包炎    C. 心肌炎    D. 心绞痛    E. 右心衰
- 54、引起咯血最常见的心脏疾病是（ ）
- A、风湿性心脏病二尖瓣狭窄      B、心包炎      C、心肌梗死  
D、肺心病      E、心肌炎
- 55、发热最常见的原因是（ ）
- A. 无菌性坏死性物质吸收      B. 变态反应      C. 自主神经功能紊乱  
D. 病原体感染      E. 体温调节中枢功能失调
- 56、某男性患者畏寒发热一周，每天体温最高达 40℃左右，最低温度 37.8℃左右，试问该热型属于（ ）
- A. 稽留热      B. 间歇热      C. 弛张热      D. 回归热      E. 波状热
- 57、剧咳时突然发生剧烈胸痛伴呼吸困难常见于（ ）
- A. 肺炎球菌性肺炎      B. 心绞痛      C. 急性心肌梗塞  
D. 急性左心衰      E. 自发性气胸
- 58、下列哪项可引起局部水肿（ ）
- A. 肝硬化    B. 丝虫病    C. 右心衰竭    D. 营养不良    E. 肾病综合征
- 59、金属音调咳嗽见于（ ）
- A. 声带炎      B. 喉癌      C. 纵隔肿瘤      D. 支气管扩张      E. 百日咳
- 60、病理性的持续睡眠状态，可被唤醒，并能准确回答题目属于（ ）
- A. 嗜睡    B. 意识模糊    C. 昏睡    D. 昏迷    E. 谵妄
- 61、已婚妇女晨起呕吐伴停经应注意（ ）
- A. 盆腔炎      B. 早孕      C. 慢性肝炎      D. 肾结石      E. 肠梗阻
- 62、慢性腹泻的病程至少应在多少以上（ ）
- A. 1个月      B. 3个月      C. 4个月      D. 2个月      E. 5个月
- 63、下列胸痛描述中哪一项不正确（ ）

- A. 带状疱疹呈刀割样痛或灼痛  
B. 心绞痛呈压榨样痛  
C. 自发性气胸于用力后突发剧痛  
D. 胸膜炎的胸痛可随咳嗽而加剧  
E. 心绞痛含服硝酸甘油无效
- 64、女，45岁，因发热3天入院。首先对其采取的评估方法为（ ）  
A. 交谈 B. 测试体温 C. 身体评估 D. 实验室检查 E. 查阅病历
- 65、疼痛位于脐与右髂前上棘连线的中外1/3的交点可能是（ ）  
A. 盆腔炎 B. 阑尾炎 C. 小肠炎 D. 胃炎 E. 乙状结肠炎
- 67、瞳孔大小不等常见于（ ）  
A. 有机磷中毒 B. 青光眼 C. 濒死状态 D. 脑疝形成 E. 阿托品中毒
- 68、左心功能不全最早最常见的症状是（ ）  
A. 三凹征 B. 劳力性呼吸困难 C. 端坐呼吸困难 D. 心源性哮喘 E. 下肢水肿
- 69、浅昏迷和深昏迷的主要区别为（ ）  
A. 有无自主运动 B. 角膜反射及防御反射是否存在  
C. 对声、光刺激的反应 D. 有无大、小便失禁 E. 能否被唤醒
- 70、下列表现中不属于深昏迷的是（ ）  
A. 呼吸不规则，血压下降 B. 大小便失禁 C. 对外界刺激无反应  
D. 压迫眶上神经可出现痛苦表情 E. 全身肌肉松弛
- 71、女性，22岁，呼吸不规则，血压9.3/5.3KPa，大小便失禁，两侧瞳孔扩大，角膜反射消失，对针刺无反应，其意识状态是（ ）  
A. 嗜睡 B. 意识模糊 C. 昏睡 D. 深昏迷 E. 浅昏迷
- 73、病人出现角膜反射消失时，其意识障碍的程度为（ ）  
A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 浅昏迷 D. 深昏迷 E. 意识模糊
- 74、造成谵妄的原因是（ ）  
A. 脑部急性出血 B. 迷走神经兴奋性增高  
C. 大脑细胞发生器质性改变 D. 中枢神经系统严重抑制  
E. 中枢神经系统发生急性功能失调
- 75、患者出现谵妄时表现（ ）  
A. 语言增多 B. 易激动 C. 朦胧状态 D. 感觉迟钝 E. 语无伦次
- 76、患者意识模糊伴知觉障碍，精神运动性兴奋，定向力消失，意识障碍属于（ ）  
A. 谵妄状态 B. 昏睡状态 C. 意识模糊

D、嗜睡状      E、浅昏迷状态

77、嗜睡与昏睡的主要鉴别点（    ）

A、是否可被唤醒      B、对外界的反应性是否存在      C、反射是否存在

D、醒后回答问题是否正确    E、意识是否模糊

78、患者女性，30岁。体温持续升高达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，持续数日，24小时波动不超过 $1^{\circ}\text{C}$ ，属于（    ）

A、弛张热    B、稽留热      C、间歇热    D、不规则热      E、超高热

79、患者男性，30岁。体温持续升高达 $39^{\circ}\text{C}$ 以上，但波动幅度大，24小时波动超过体温持续升高达 $1^{\circ}\text{C}$ ，最低体温仍然超过正常水平，属于（    ）

A、弛张热    B、稽留热      C、间歇热    D、不规则热      E、波状热

80、患者男性，28岁。伤寒，持续高热5天，每晨8时 $T39.0^{\circ}\text{C}$ 左右，下午4时 $T39.6^{\circ}\text{C}$ 左右，此热型符合（    ）

A、弛张热    B、稽留热      C、间歇热    D、不规则热      E、波状热

81、患者男性，68岁，患尿毒症，护士查房时发现患者表情淡漠，反应迟钝，此种表现是（    ）

A. 嗜睡    B. 谵妄    C. 浅昏迷    D. 深昏迷    E. 意识模糊

82、患者男性，37岁，出差感染了疟疾，发作时明显寒战，全身发抖，面色苍白，口唇发绀，寒战持续约10分钟，体温骤升至 $40^{\circ}\text{C}$ ，面色潮红，皮肤干热，烦躁不安，持续约3小时，体温又骤降至正常。经过几天的间歇期后，又再次发作，此患者发热的热型是（    ）

A、弛张热      B、稽留热      C、间歇热

D、不规则热      E、波状热

83. 患者男性，30岁。体温持续升高达 $39^{\circ}\text{C}$ 以上，护理体检时，患者通常表现为（    ）

A. 血压下降    B. 四肢湿冷    C. 大量出汗    D. 颜面潮红    E. 尿量增多

84. 患者，男性，58岁。肺炎入院4日。体温 $39.5^{\circ}\text{C}$ ，思维和语言不连贯，并躁动不安。此现象为（    ）

A. 精神错乱    B. 谵妄    C. 浅昏迷    D. 深昏迷    E. 意识模糊

85. 患者，男，38岁，消化性溃疡多年。今作大便隐血试验检查，结果为阳性，提示该患者24小时消化道出血量至少（    ）

- A. 5mm1 以上 B. 10ml 以上 C. 30ml 以上 D. 50ml 以上 E. 70ml 以上
86. 急性腹泻最常见的病因是 ( )
- A. 肠道肿瘤 B. 肝硬化 C. 结肠过敏 D. 慢性肝炎 E. 急性传染病
87. 患者, 男性, 50 岁。肝硬化病史 5 年, 今日因“呕血 800ml”入院。护理体检: 面色苍白, 精神萎靡, 体温 37.7℃, 脉搏 118 次/分, 呼吸 22 次/分, 血压 80/50mmHg。该患者目前最主要的护理问题是 ( )
- A. 体温过高 B. 恐惧 C. 活动无耐力 D. 体液不足 E. 有受伤的危险
88. 吸气性呼吸困难的发生机制是 ( )
- A. 大气道狭窄梗阻 B. 肺部病变广泛致呼吸面积减少 C. 血管床减少  
D. 上呼吸道异物刺激 E. 肺组织弹性减弱及小支气管痉挛性狭窄
89. 患者, 女性, 62 岁, 因脑梗塞入院。对声、光等刺激毫无反应, 仅护士在输液穿刺时患者能醒。该患者的意识属于 ( )
- A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 浅昏迷 D. 深昏迷 E. 意识模糊
90. 某患者入院后, 护士在病情观察时发现患者两侧瞳孔散大并有对光反射消失, 应考虑 ( )
- A. 颅内出血 B. 视神经萎缩 C. 有机磷中毒  
D. 深昏迷状态 E. 濒死状态
91. 患者男性, 28 岁。诊断为“疟疾”。发热时体温可骤然升高到 39℃ 以上, 然后很快降至正常, 2 天后再次发作, 属于 ( )
- A. 弛张热 B. 稽留热 C. 间歇热 D. 不规则热 E. 波状热
92. 护士在给某病人输液治疗过程中突然出现咳粉红色泡沫痰, 应考虑 ( )
- A. 肺栓塞 B. 急性肺水肿 C. 支气管扩张 D. 肺血管破裂 E. 自发性气胸
93. 关于体温的论述下列哪项正确 ( )
- A. 体温低于 36.5℃ 称体温过低 B. 甲状腺功能亢进病人常有体温过低  
C. 体温高于 37.5℃ 称发热 D. 无菌性炎症一般无发热  
E. 慢性消耗性疾病病人常有体温升高
94. 发作性呼气性呼吸困难见于 ( )
- A. 肺不张 B. 胸膜黏连 C. 支气管扩张 D. 支气管异物 E. 支气管哮喘
95. 尿液呈酱油色见于 ( )
- A. 阻塞性黄疸 B. 急性溶血 C. 肝细胞性黄疸 D. 肾脏肿瘤

E. 晚期丝虫病

96. 下列症状中不属于意识模糊的是 ( )

- A. 语无伦次躁动 B. 答话简短迟钝 C. 定向力障碍 D. 表情淡漠  
E. 对周围环境漠不关心

97. 浅昏迷和深昏迷的主要区别为 ( )

- A. 有无自主运动 B. 角膜反射及防御反射是否存在  
C. 对声、光刺激的反应 D. 有无大、小便失禁 E. 能否被唤醒

98. 下列表现中不属于深昏迷的是 ( )

- A. 呼吸不规则，血压下降 B. 大小便失禁 C. 对外界刺激无反应  
D. 压迫眶上神经可出现痛苦表情 E. 全身肌肉松弛

99. 发热时脉搏增快是由于 ( )

- A. 机体代谢率增快 B. 机体代谢率降低 C. 心肌收缩力减弱  
D. 心肌收缩力增强 E. 心输出量降低

100. 上消化道出血病人的粪便可呈 ( )

- A. 脓血样 B. 果酱样 C. 米泔水样 D. 柏油样 E. 白陶土样

101. 紫癜与充血性皮疹的特征性区别是 ( )

- A. 直径大小 B. 是否高出皮肤 C. 颜色深浅 D. 指压是否褪色  
E. 表面光亮度

102. 病人出现角膜反射消失时，其意识障碍的程度为 ( )

- A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 浅昏迷 D. 深昏迷 E. 意识模糊

103. 造成谵妄的原因是 ( )

- A. 脑部急性出血 B. 迷走神经兴奋性增高 C. 大脑细胞发生器质性改变  
D. 中枢神经系统严重抑制 E. 中枢神经系统发生急性功能失调

104. 患者出现谵妄时表现 ( )

- A. 语言增多 B. 易激动 C. 朦胧状态 D. 感觉迟钝 E. 语无伦次

105. 呕吐物内除消化液和食物外，混有大量胆汁时，可呈 ( )

- A. 黄绿色 B. 鲜红色 C. 腐臭味 D. 咖啡色 E. 暗红色

106. 正常成人 24h 尿量为 ( )

- A. 400~600ml B. 500~1000ml C. 800~1200ml  
D. 1000~2000ml E. 3000~5000ml

107. 少尿是指 24h 尿量少于 ( )
- A. 100ml B. 400ml C. 600ml D. 1000ml E. 1500ml
108. 下列哪项不是膀胱炎的症状 ( )
- A. 尿频 B. 尿急 C. 尿痛 D. 尿少 E. 陈尿有氨臭味
109. 病人痰液有恶臭味, 判定为何种细菌感染 ( )
- A. 病毒 B. 绿脓杆菌 C. 厌氧菌 D. 霉菌 E. 化脓菌
110. 听到病人带金属音的咳嗽时应警惕 ( )
- A. 喉炎 B. 肺脓肿 C. 肺癌 D. 哮喘 E. 肺炎
111. 某男性病人, 因急性脑出血入院两天, 连续睡眠 19 小时, 期间呼之能醒, 可进行简单对话, 过后很快又入睡, 此时病人处于 ( )
- A. 昏迷状态 B. 昏睡状态 C. 意识模糊状态  
D. 嗜睡状态 E. 清醒状态

二、A3/A4 型题:

(1~3 题共用题干)

杨先生, 36 岁, 咳嗽、咳痰伴午后低热、乏力、盗汗、食欲减退、体重减轻已 3 个月, 今晨患者一次咯出鲜红色血液约 400ml 急诊入院。

1. 此病人最可能的诊断是 ( )
- A. 慢性支气管炎 B. 支气管扩张症 C. 支气管肺癌  
D. 肺结核 E. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
2. 此病人最易发生且危险的并发症是 ( )
- A. 继发感染 B. 肺不张 C. 失血性休克 D. 营养不良 E. 窒息
3. 此病人咯血为 ( )
- A. 小咯血 B. 中等咯血 C. 大咯血 D. 特大咯血 E. 不能确定

(4~6 题共用题干)

李先生, 患肝硬化已 4 年, 3 天前饮酒后突然大量呕血, 且神志恍惚, 四肢湿冷, 血压下降。入院后经积极治疗, 现病情稳定, 出血已停止。

4. 判断病人的出血量约为 ( )
- A. 500ml B. 600ml C. 700ml D. 800ml E. 1000ml 以上
5. 病人不可能出现 ( )

A. 发热 B. 黑粪 C. 脉搏细数 D. 血红蛋白量减少 E. 血尿素氮低于正常

6. 出血停止的指征是 ( )

A. 口渴 B. 尿少 C. 肠鸣音亢进 D. 血压正常稳定 E. 红细胞数明显增加

(7~9 题共用题干)

患儿, 7 岁, 因进食新鲜蚕豆后, 出现寒战、高热、头痛、呕吐、全身酸痛, 排酱油色尿液, 皮肤黄染, 血清总胆红素升高, 非结合胆红素升高, 结合胆红素正常。

7. 此患儿的黄疸属于 ( )

A. 生理性黄疸 B. 先天性黄疸 C. 溶血性黄疸 D. 肝细胞性黄疸 E. 阻塞性黄疸

8. 对患儿进行护理评估时最该注意的问题是 ( )

A. 注意黄疸的程度 B. 注意黄疸的病因 C. 注意相关病史

D. 注意伴随症状 E. 注意身心反应

9. 对黄疸的观察最好的部位是 ( )

A. 腹部皮肤 B. 眼结膜 C. 手掌 D. 巩膜 E. 颜面部

(10~12 题共用题干)

女性患者, 60 岁, 有高血压病史 10 余年, 于劳动中突感剧烈头痛, 迅即出现意识障碍, 对声光刺激无 , 对疼痛刺激有防御 , 瞳孔大小正常, 对光反射存在, 呼吸深沉而有鼾音。

10. 其意识障碍的程度为 ( )

A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 轻度昏迷 D. 中度昏迷 E. 重度昏迷

11. 其可能的病因是 ( )

A. 脑膜炎 B. 脑出血 C. 脑梗死 D. 脑肿瘤 E. 脑外伤

12. 该患者 GCS 评分为 ( )

A. 14~15 分 B. 8~13 分 C. 5~7 分 D. 3~5 分 E. <3 分

## 第二部分 症状评估

参考答案:

### 一、A1/A2 型题

1. A 2. A 3. B 4. E 5. D 6. C 7. D 8. C 9. E 10. A 11. A 12. E 13. A 14. D  
15. B 16. A 17. B 18. E 19. E 20. C 21. B 22. D 23. B 24. A 25. D  
26. A 27. A 28. B 29. C 30. D 31. C 32. D 33. E 34. B 35. C 36. A  
37. C 38. E 39. A 40. A 41. C 42. C 43. C 44. D 45. A 46. C 47. E  
48. B 49. C 50. C 51. E 52. B 53. A 54. A 55. D 56. C 57. E 58. B  
59. C 60. A 61. B 62. D 63. E 64. B 65. B 66. A 67. D 68. B 69. B  
70. D 71. D 72. C 73. D 74. E 75. E 76. A 77. D 78. B 79. A 80. B  
81. E 82. C 83. D 84. E 85. A 86. E 87. D 88. A 89. B 90. E 91. C  
92. B 93. C 94. E 95. B 96. B 97. B 98. D 99. A 100. D 101. D 102. D  
103. E 104. E 105. A 106. D 107. B 108. D 109. C 110. C 111. D

### 二、A3/A4 型题

1. D 2. E 3. C 4. E 5. E 6. D 7. C 8. B 9. D 10. C 11. B 12. C

### 第三部分 身体评估

#### 一、A1/A2 型题

- 1、正常人体体温（腋温）为（ ）  
A、36.3~37.2℃ B、36~37℃ C、36.5~37.5℃ D、36.2~37.2℃ E、36~37.5℃
- 2、在检查淋巴结肿大时，首先应注意弄清楚（ ）  
A、有无红肿、粘连 B、数量、大小 C、原发病灶 D、有无压痛 E、有无坏死
- 3、肺气肿患者的胸廓前后径与左右径的比例约为（ ）  
A、1:2 B、1:1 C、1:2.5 D、1:1.5 E、2:1
- 4、正常成年人呼吸频率一般为（ ）  
A、14~18 次/分钟 B、16~24 次/分钟 C、12~20 次/分钟  
D、16~20 次/分钟 E、16~22 次/分钟
- 5、下列哪种疾病可出现急性腹痛（ ）  
A、胃、十二指肠溃疡 B、肝炎 C、慢性胃炎 D、肠梗阻 E、反流性食管炎
- 6、靴形心脏常见于（ ）  
A、二尖瓣关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、肺动脉瓣狭窄  
D、主动脉瓣狭窄 E、主动脉瓣关闭不全
- 7、Louis 角是指下列哪个部位（ ）  
A、腹上角 B、胸骨角 C、胸骨柄 D、胸骨体 E、胸骨下角
- 8、深反射不包括（ ）  
A、肱二头肌反射 B、肱三头肌反射 C、桡骨膜反射 D、跖反射 E、膝反射
- 9、女，35 岁，咯血 4 天入院，面色晦暗，双颊暗红，口唇发绀，其病因首先考虑：（ ）  
A、白血病 B、肺结核 C、风湿性二尖瓣狭窄 D、支气管扩张 E、再生障碍性贫血

- 10、对皮肤弹性的评估常取下列哪个部位（ ）
- A、两颊 B、腹部 C、手背或上臂内侧 D、上臂外侧 E、前臂内侧
- 11、反跳痛主要出现于（ ）
- A、腹腔内炎症累及壁腹膜 B、结核性腹膜炎 C、肠结核  
D、腹腔内肿瘤 E、肝硬化腹水
- 12、WHO 确定成人高血压诊断标准为（ ）
- A、收缩压 $>140\text{mmHg}$  和（或）舒张压 $>90\text{mmHg}$   
B、收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ ，舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$   
C、收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$  和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$   
D、收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$  和舒张压 $\geq 95\text{mmHg}$   
E、收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$  和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
- 13、男，55 岁，排尿缓慢两年，加重 1 个月，无浮肿，查体：下腹膨隆，叩诊浊音，浊音区不随体位改变，下列哪项诊断可能性大（ ）
- A、肝硬化腹水 B、结核性腹膜炎 C、肝硬化癌变  
D、尿潴留 E、化脓性阑尾炎
14. 检查肝、脾、肾时应采用何种触诊方法（ ）
- A、浅部触诊法 B、滑行触诊法 C、双手触诊法  
D、深压触诊法 E、冲击触诊
15. 正常人右锁骨中线第二肋间的叩诊音为（ ）
- A、清音 B、浊音 C、实音 D、鼓音 E、过清音
16. 正常心尖搏动位置在（ ）
- A. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 0.5~1cm 处  
B. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线外 0.5~1cm 处  
C. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 1.5~2.0cm 处  
D. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线外 1.5~2.0cm 处  
E. 胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 2.0~2.5cm
17. 测量下肢血压时，患者应采取（ ）
- A. 坐位 B. 立位 C. 仰卧位 D. 侧卧位 E. 俯卧位
18. 胸骨右缘第二肋间听诊区为（ ）
- A. 二尖瓣听诊区 B. 三尖瓣听诊区 C. 肺动脉瓣听诊区 D. 主动

脉瓣听诊区 E. 主动脉瓣第二听诊区

19、心、肺功能不全者常采取的体位是 ( )

A、强迫蹲位 B、强迫侧卧位 C、强迫坐位 D、强迫站位 E、强迫侧卧位

20、判断营养状态最简单而迅速的方法是观察 ( )

A、皮肤弹性 B、毛发稀疏程度 C、皮下脂肪充实程度

D、肌肉发育情况 E、指甲光泽度

21、桶状胸常见于 ( )

A、肺结核 B、风心病 C、佝偻病 D、发育畸形 E、肺气肿

22、正常成年人静息状态下，呼吸与脉搏之比为 ( )

A、1: 10 B、1: 8 C、1: 5 D、1: 4 E、1: 1

23、女，70岁，有慢性支气管炎和冠心病史，夜间突然憋醒，呼吸困难，咯粉红色泡沫痰可能为 ( )

A、慢性支气管炎急性发作 B、急性左心衰竭 C、支气管哮喘

D、急性胃炎 E、有机磷中毒

24、梨形心脏常见于 ( )

A、二尖瓣关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、肺动脉瓣狭窄

D、主动脉瓣狭窄 E、主动脉瓣关闭不全

25、腹壁揉面感多见于 ( )

A、胃肠穿孔 B、肝脾破裂 C、急性胆囊炎 D、结核性腹膜炎 E、急性胰腺炎

26、浅反射不包括 ( )

A、角膜反射 B、腹壁反射 C、桡骨膜反射 D、跖反射 E、提睾反射

27、扁桃体超过咽腭弓而未达咽后壁中线者为 ( )

A、I度肿大 B、II度肿大 C、III度肿大

D、IV度肿大 E、正常

28、男，60岁，自己发现左锁骨上有一鸡蛋大小的无痛性肿块，质地坚硬。首先考虑 ( )

A、乳癌 B、肺癌 C、胃癌 D、鼻咽癌 E、骨肉瘤

29、分析心脏杂音时不包括的内容是 ( )

A、最响部位 B、时期和性质 C、强度和传导方向

D、杂音与体位、运动、呼吸的关系 E、杂音的发生机理



- 42、正常心尖搏动位于( )
- A、胸骨左缘第 4 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处  
B、胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处  
C、胸骨左缘第 6 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处  
D、胸骨右缘第 4 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处  
E、胸骨右缘第 5 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
- 43、主动脉瓣听诊区闻及收缩期喷射样杂音，向颈部传导，应考虑( )
- A、风湿性主动脉瓣关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、二尖瓣关闭不全  
D、主动脉瓣狭窄 E、室间隔缺损
- 44、局限性右下腹肌紧张见于( )
- A、急性胰腺炎 B、急性胆囊炎 C、胃肠穿孔 D、盆腔脏器炎症  
E、急性阑尾炎
- 45、下列哪个体征为深反射( )
- A、巴宾斯基征 B、奥本海姆征 C、戈登征 D、膝腱反射 E、布鲁金斯基征
- 46、濒死状态的瞳孔表现为( )
- A、缩小 B、扩大 C、大小不等 D、双侧缩小伴对光反射消失  
E、双侧散大伴对光反射迟钝
- 47、男，62 岁，查体：心尖搏动于左侧第 6 肋间锁骨中线外 1.5cm 处，呈抬举感，提示( )
- A、右心房扩大 B、左心室肥大 C、右心室肥大  
D、左心房扩大 E、心包积液
- 48、肝脏触诊注意事项( )
- A、大小 B、质地 C、表面及边缘形态 D、压痛 E、以上都是
- 49、男，52 岁。因食欲不振、腹胀、双下肢水肿 2 周入院。查体：双下肢水肿，腹部膨隆，移动性浊音阳性，肝右肋下 1cm，质韧，表面有结节。下列哪种情况可能性大( )
- A、肝硬化腹水 B、急性腹膜炎 C、肾性水肿 D、心源性水肿 E、营养不良
50. 主动脉瓣第二听诊区位于( )
- A、心尖区 B、胸骨右缘第二肋间 C、胸骨左缘第二肋间  
D、胸骨左缘第三、四肋间 E、剑突下偏左偏右

51. 患者不能自己调整或变换肢体的位置是 ( )
- A、自动体位                      B、被动体位                      C、强迫体位  
D、强迫仰卧位                      E、强迫侧卧位
52. 女, 45 岁, 因发热 3 天入院。首先对其采取的评估方法为 ( )
- A. 交谈                                      B. 测试体温                                      C 身体评估  
D. 实验室检查                                      E. 查阅病历
53. 视诊要求在那种光线下进行 ( )
- A. 强光    B. 避光    C. 紫光    D. 白炽灯    E. 自然光
54. 气管移向右侧见于 ( )
- A、右侧气胸 B、右侧胸腔积液 C、左侧肺不张 D、右侧肺不张 E、左侧肺炎
55. 胸骨压痛常见于 ( )
- A、胸腔积液    B、白血病    C、气胸    D、再生障碍性贫血    E、气管内异物
56. 正常成年人呼吸频率一般为 ( )
- A、18 次/分钟    B、24 次/分钟    C、12 次/分钟    D、>24 次/分钟    E、  
<12 次/分钟
57. 正常心尖搏动位于 ( )
- A、胸骨左缘第 4 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处  
B、胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处  
C、胸骨左缘第 6 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处  
D、胸骨右缘第 4 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处  
E、胸骨右缘第 5 肋间锁骨中线内侧 0.5—1.0 cm 处
58. 正常成人 heart rate 为 ( )
- A、50~100 次 / min    B、60~100 次 / min    C、50~110 次 / min  
D、60~120 次 / min    E、80~120 次 / min
59. 关于腹反跳痛不正确的是 ( )
- A、腹部检查时出现压痛后手指原地不动    B、腹部出现压痛后片刻迅速抬手  
C、当突然抬手时腹膜被牵拉引起疼痛    D、阳性说明腹膜壁层已受累及  
E、见于急性腹膜炎
60. 下列哪个属于病理反射 ( )
- A、肱二头肌反射    B、巴宾斯基征    C、桡骨膜反射    D、跖反射    E、膝反射

- 61、浅昏迷和深昏迷最主要鉴别点是( )
- A、有无自主呼吸 B、对声光刺激的反应 C、有无二便失禁 D、能否被唤醒  
E、角膜反射，瞳孔对光反射及防御反射是否存在
- 62、贫血病人，较可靠的评估部位是( )
- A. 手掌皮肤和睑结膜 B. 颈部皮肤和舌面 C. 耳廓皮肤和上腭粘膜  
D. 面颊皮肤及上腭粘膜 E. 手背皮肤及鼻腔粘膜
- 63、女，38岁，心脏叩诊左侧第3肋间心浊音界扩大，心界呈梨形，应考虑为( )
- A、主动脉关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、心包积液  
D、高血压性心脏病 E、二尖瓣关闭不全
- 64、典型机械性肠梗阻病人，肠鸣音常被描述为( )
- A、减弱 B、消失 C、活跃 D、亢进 E、正常
65. 触诊对全身的哪个部位的检查更重要( )
- A、颈部 B、腹部 C、胸部 D、皮肤 E、四肢脊柱
66. 确定第一心音最有价值的是( )
- A、持续时间长 B、心尖部声音最强 C、音调比第二心音低  
D、与心尖搏动同时出现 E、音响较强
67. 临床上最轻易观察发绀的部位( )
- A. 眼眶 B. 面颊 C. 肢端 D. 口唇 E. 耳廓
68. 用来衡量心界增大与否与增大程度常用的垂直标志线为( )
- A. 前正中线 B. 锁骨中线 C. 胸骨线 D. 胸骨旁线 E. 腋前线
69. 检查心脏震颤常用( )
- A. 全手掌 B. 食指、中指指腹 C. 食指、中指指尖 D. 手掌桡侧 E. 手掌尺侧
70. 移动性浊音阳性，提示腹水量超过( )
- A. 200ml B. 500ml C. 1000ml D. 1500ml E. 2000ml
- 71、确定扁桃体 I 肿大还是 II 肿大的界限是( )
- A、舌腭弓 B、咽腭弓 C、咽后壁正中线 D、悬雍垂 E、以上都不是
- 72、一位 45 岁女性，一侧乳房皮肤局部呈橘皮样，乳头内陷，可能为( )
- A、乳腺炎 B、乳腺小叶增生 C、乳腺囊肿 D、乳腺癌 E、以上都不是
- 73、肠鸣音亢进时每分钟至少能听到( )

A. 2次 B. 6次 C. 4次 D. 8次 E. 10次

74、心尖搏动向左下移位,其原因为( )

A、左室增大 B、右室增大 C、左、右室增大 D、右位心 E、全心脏扩大

75、心浊音界呈靴形者见于( )

A、二尖瓣关闭不全 B、二尖瓣狭窄 C、心包积液

D、主动脉瓣关闭不全 E、主动脉瓣狭窄

76、腹膜炎最主要的体征是( )

A. 腹式呼吸减弱 B. 腹膜刺激征 C. 移动性浊音阳性

D. 肠鸣音消失 E. 腹部可见肠型

77、深反射不包括( )

A、肱二头肌反射 B、肱三头肌反射 C、桡骨骨膜反射 D、跖反射 E、膝反射

78、昏迷病人表现的体位为( )

A、强迫仰卧位 B、被动体位 C、自动体位 D、强迫侧卧位 E、辗转体位

79、男,6岁,在玩耍时突发严重呼吸困难、发绀10分钟而来院急诊。查体:呈吸气性呼吸困难,并有“三凹征”。应首先考虑( )

A、气管内异物 B、支气管哮喘 C、气胸 D、慢性支气管炎 E、急性胸膜炎

80、女,31岁,心慌、气短3年,加重1周,查体:P85次/分,心界向两侧扩大,心率126次/分,心律绝对不齐,心音强弱不等,心尖部可闻及响亮的舒张期隆隆样杂音和5/6级收缩期吹风样杂音,并向左腋下传导。首先考虑最可能为( )

A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、二尖瓣狭窄合并关闭不全

D、主动脉瓣狭窄 E、室间隔缺损

81、女,32岁。昨日后半夜至今晨上腹部饱胀不适、疼痛伴恶心。查体:上腹部见胃型和蠕动波。最可能的病情是( )

A、幽门梗阻 B、麻痹性肠梗阻 C、急性腹膜炎 D、大量腹腔积液 E、气腹

82. 浅部触诊法适合用于下列哪项检查( )

A、胆囊压痛点 B、阑尾压痛点 C、脾脏触诊

D、肾脏触诊 E、关节及阴囊

83. 吸气时脉搏明显减弱或消失称为( )

A、交替脉 B、水冲脉 C、奇脉 D、短绌脉 E、重搏脉

84. 胸骨右缘第二肋间处为哪个瓣膜听诊区 ( )
- A. 主动脉瓣听诊区 B. 二尖瓣区 C. 肺动脉瓣区  
D. 主动脉第二听诊区 E. 三尖瓣区
85. 面容枯槁、面色苍白或铅灰、表情淡漠、眼眶凹陷称为 ( )
- A. 慢性病容 B. 危重病容 C. 满月病容 D. 二尖瓣病容 E. 急性病容
86. Murphy 征阳性见于 ( )
- A. 急性肝炎 B. 急性阑尾炎 C. 急性胆囊炎  
D. 急性腹膜炎 E. 急性胰腺炎
87. 能判断心脏大小、位置、形态的评估方法是 ( )
- A. 视诊 B. 触诊 C. 叩诊 D. 听诊 E. 嗅诊
88. 在心尖部触及舒张期震颤, 应考虑 ( )
- A. 主动脉瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 肺动脉瓣狭窄  
D. 主动脉瓣关闭不全 E. 二尖瓣狭窄
89. 判断患者意识状态常用 ( )
- A. 视诊 B. 触诊 C. 叩诊 D. 听诊 E. 问诊
90. 紫癜与充血性皮疹鉴别要点是 ( )
- A. 直径大小 B. 压之是否退色 C. 颜色程度  
D. 皮肤隆起程度 E. 部位
91. 评估淋巴结时常用什么方法 ( )
- A. 视诊 B. 浅部滑行触诊 C. 深压触诊 D. 双手触诊 E. 叩诊
92. 正常人坐位时颈静脉不显露, 平卧时可稍充盈, 其充盈水平限于 ( )
- A. 锁骨上缘至下颌角距离的上 2/3 内 B. 锁骨上缘至下颌角距离的中 2/3 内  
C. 锁骨上缘至下颌角距离的上 1/3 内 D. 锁骨上缘至下颌角距离的下 2/3 内  
E. 锁骨上缘至下颌角距离的下 1/3 内
93. 用视诊法评估甲状腺时, 应嘱患者做什么动作, 观察甲状腺 ( )
- A. 仰头 B. 屈颈 C. 吞咽 D. 抱头 E. 摇头
94. 对胸膜摩擦感的描述错误的是 ( )
- A. 触诊时有擦皮革感 B. 呼气和吸气均可触及 C. 屏住呼吸消失  
D. 于胸廓的下前侧部最易触及 E. 仅在呼气时可触及
95. 语颤增强可见于 ( )

- A. 气胸 B. 肺气肿 C. 阻塞性肺不张 D. 大叶性肺炎 E. 胸膜粘连增厚
96. 舟状腹常见于 ( )
- A. 肝硬化 B. 低血糖 C. 恶液质 D. 腹膜炎 E. 胃扩张
97. 腹部出现移动性浊音, 提示有 ( )
- A. 门静脉高压 B. 腹膜炎 C. 幽门梗阻 D. 腹水 E. 腹腔肿瘤
98. 腹膜炎最主要的体征是 ( )
- A. 腹式呼吸减弱 B. 腹膜刺激征 C. 移动性浊音阳性  
D. 肠鸣音消失 E. 腹部可见肠型
99. 典型阑尾炎疼痛的特点是 ( )
- A. 上腹部疼痛 B. 下腹部疼痛 C. 右上腹疼痛  
D. 左上腹疼痛 E. 转移性右下腹疼痛
100. 一般体检测量脉搏的方法中, 正确的是 ( )
- A. 可用拇指诊脉 B. 病人剧烈活动后立即测量  
C. 有脉搏短绌, 应分别测量心率、脉率  
D. 测量部位只有桡动脉 E. 测量前不必作解释工作
101. 成人血压的正常值是 ( )
- A. 收缩压 $<140\text{mmHg}$ , 舒张压 $<90\text{mmHg}$   
B. 收缩压 $=140\text{mmHg}$ , 舒张压 $=90\text{mmHg}$   
C. 收缩压 $<160\text{mmHg}$ , 舒张压 $<95\text{mmHg}$   
D. 收缩压 $=160\text{mmHg}$ , 舒张压 $=95\text{mmHg}$   
E. 收缩压 $<90\text{mmHg}$ , 舒张压 $<60\text{mmHg}$
102. 肠鸣音亢进见于 ( )
- A. 急性肠炎 B. 急性胰腺炎 C. 肠麻痹 D. 消化性溃疡 E. 肝硬化
103. 气胸病人患侧肺部叩诊音为 ( )
- A. 清音 B. 浊音 C. 鼓音 D. 实音 E. 过清音
104. 某病人呼吸由浅慢逐渐加快加深, 后又逐渐变浅变慢, 然后暂停数秒, 可出现上述状态呼吸, 考虑为 ( )
- A. 断续呼吸 B. 浅慢呼吸 C. 深大呼吸 D. 潮式呼吸  
E. 间歇呼吸
105. 某病人昏迷不醒, 呼吸有刺鼻大蒜味, 瞳孔缩小, 多汗。此病人可能是 ( )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656113111102010051>