

## 一、选择题



1 .最能反映贫血的实验室检查指标为 [单选题] \*

- A.红细胞计数
- B.红细胞沉降率
- C.网织红细胞计数
- D.血红蛋白定量 ✓
- E.血清白蛋白总量

2 .根据血红蛋白下降程度，中度贫血是指 [单选题] \*

- A.Hb<150g/l
- B.男性 Hb<120g/l,女性 Hb<110g/l
- C.Hb<90g/l ✓
- D.Hb<60g/l
- E.Hb<30g/l

3 .皮肤白皙的贫血患者就诊，护士检查时最能反映贫血的部位是 [单选题] \*

- A.面颊皮肤及上腭黏膜
- B.手背皮肤及口腔黏膜
- C.耳廓皮肤
- D.颈部皮肤及舌面
- E.睑结膜、指甲、口唇 ✓

4 .下列关于贫血的描述，错误的是 [单选题] \*

- A.急性贫血的症状常较显著
- B.贫血症状的严重程度与贫血发生的速度和程度有关
- C.老年人或伴心肺疾病者对贫血已经耐受，症状相对较轻 ✓
- D.慢性贫血，由于机体对缺氧已适应，故即使贫血很重，症状也可以较轻
- E.最突出的体征是皮肤黏膜苍白

5 .下列哪种食物中含铁最少 [单选题] \*

A.蛋黄

8 .牛奶 ✓

C.猪肉

D.猪肝

E.血豆腐

6. 关于缺铁性贫血患者的有关检查，下列不妥的是 [单选题] \*

A.血象见小细胞、低色素性贫血

B.血象见白细胞、血小板均减少 ✓

C.骨髓细胞外含铁血黄素消失

D.骨髓幼红细胞内缺乏可染铁

E.血清铁蛋白降低

7 .关于口服铁剂的健康教育，下列措施中不妥的是 [单选题] \*

A.为加强疗效，宜餐前服用，患者多数能耐受 ✓

8 .服药后 2 小时内禁饮浓茶、咖啡

C.可与维生素 C、稀盐酸、橙汁同服

D.避免与牛奶、抗酸药物、磷酸盐等同时服用

E.向患者解释服药后大便会发黑

8.应用注射铁剂治疗时,下列说法错误的是 [单选题] \*

A.需作深部肌肉注射

B.可能引起局部疼痛、硬结

C.严重者可出现过敏性休克

D.用药剂量一定要严格计算,避免中毒

E.抽取药液后应立即直接注射 ✓

9.下列哪项不是再生障碍性贫血的常见临床表现 [单选题] \*

A.贫血

B.多有出血、感染

C.肝、脾、淋巴结多无肿大

D.骨髓增生极度活跃 ✓

E.外周血全血细胞减少

10. 滥用药物是引起再障的重要原因, 以下药物中对再障的发生没有明显影响的是 [单选题] \*

A.氯霉素

B.阿司匹林

C.保泰松

D.磺胺

E.青霉素 ✓

11. 特发性血小板减少性紫癜患者应避免使用下列哪种药物 [单选题] \*

A.泼尼松

B.阿莫西林

C.红霉素

D.双嘧达莫 ✓

E.地西洋

12 . 下列关于脾切除术治疗特发性血小板减少紫癜的说法，错误的是 [单选题] \*

A.可作为首选治疗手段 ✓

B.糖皮质激素治疗 6 个月以上无效者可考虑脾切除

C.糖皮质激素维持量大于 30mg/d 者可考虑脾切除

D 有效率达 70%

E.作用机制是减少血小板破坏和抗体产生

13 . 血小板低于下列哪个值时，临床应警惕颅内出血 [单选题] \*

A.100X10<sup>9</sup>/l

B.80X10<sup>9</sup>/l

C.60X10<sup>9</sup>/l

D.40X10<sup>9</sup>/l

E.20X10<sup>9</sup>/l ✓

14 . 对过敏性紫癜患者的治疗，下列不妥的是 [单选题] \*

A.去除病因，避免再次接触可疑的过敏源

15 可使用抗组胺药物

C.糖皮质激素对腹型、关节型有较好疗效

D.肾型或激素疗效不佳者，可用免疫制剂治疗

E.糖皮质激素对肾脏损害疗效明显 ✓

15 . 下列有关血友病的描述，错误的是 [单选题] \*

A.血友病 A 和血友病 B 均为性染色体（Y 染色体）隐性遗传，

B.遗传性因子 XI 缺乏症为常染色体隐性遗传

C.防治血友病患者出血量最重要的措施是补充凝血因子

D.去氨加压素（DDAVP）可用于治疗轻症血友病 A 患者

E.血友病患者和女性携带者不宜婚配，否则应避免生育

16 . 下列可导致 DIC 的病因中，最多见的是 [单选题] \*

A.感染性疾病 ✓

17 恶性肿瘤

C.病理产科

D.手术及创伤

E.医源性因素（如溶栓、抗凝治疗）

17.DIC 患者最典型的临床表现是 [单选题] \*

A.自发性、持续性出血 ✓

B.皮肤黏膜、内脏栓塞

U 微循环障碍

D.低血压、休克

E.微血管病性溶血

18. 下列 DIC 的实验室检查特点，描述错误的是 [单选题] \*

A.血小板计数下降

B.纤维蛋白原下降

C.纤维蛋白（原）降解产物（FDP）下降 ✓

D.血浆鱼精蛋白副凝固试验（3P 试验）阳性

EQ 二聚体阳性

19.如使用肝素抗凝过量，可采用下列哪种药物进行拮抗 [单选题] \*

A.血小板

- B.凝血因子
- C.阿司匹林
- D.抗凝血酶 III
- E.鱼精蛋白 ✓

20. 急性白血病和慢性白血病的主要区别是 [单选题] \*

- A.肝脾是否增大
- B.感染严重程度
- C.白血病细胞成熟程度 ✓
- D.贫血严重程度
- E.出血严重程度

21.急性白血病患者缓解期出现中枢神经系统白血病的主要原因是 [单选题]

- A.免疫功能低下
- B.多数化疗药不能通过血脑屏障 ✓
- C.疗程不够
- D.化疗药剂量不足
- E.对化疗药产生耐药性

22. 防治中枢神经系统白血病，常用鞘内注射的化疗药是 [单选题] \*

- A.柔红霉素
- B.阿糖胞苷,
- C.环磷酰胺
- D.长春新碱
- E.氟尿嘧啶

23 .对于既有发热和出血倾向，又伴有肝、脾肿大的患者，为明确诊断，最有价值的实验室检查是 [单选题] \*

A.肝功能

B.肾功能

C.血常规

D.骨髓检查 ✓

E.CT

24 .白血病患者化疗期间口服别嘌醇的目的是 [单选题] \*

A.抑制尿素合成

25 加强化疗药的疗效

C.抑制尿酸合成 ✓

D.加强尿酸的排泄

E 加强尿素的排泄

25. 对于下列哪种疾病，维 A 酸有特异性治疗作用 [单选题] \*

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性早幼粒白血病 ✓

C.慢性粒细胞白血病

D.慢性淋巴细胞白血病

E.淋巴瘤

26 .当循环血液中白细胞增高至下列哪个程度，可发生白细胞淤滞 [单选题]

A.>10X10<sup>9</sup>/l

B.>50X10<sup>9</sup>/l

C.>100X10<sup>9</sup>/l

D.>150X10<sup>9</sup>/l

E.>200X10<sup>9</sup>/l

27 .白血病患者防治尿酸肾病的常用方法不包括 [单选题] \*

A.多饮水

B.静脉补液

C.给予碳酸氢钠

D.给予别嘌醇

E.给予糖皮质激素 ✓

28 .血液病患者粒细胞降低至下列哪个程度，应实行保护性隔离 [单选题] \*

A.<0.5X10<sup>9</sup>/l

B.<0.8X10<sup>9</sup>/l

C.<1.0X10<sup>9</sup>/l

D.<1.5X10<sup>9</sup>/l

E.<2.0X10<sup>9</sup>/l

29 .下列哪项不是慢粒患者进入加速器的表现 [单选题] \*

A.不明原因高热

B.原有效药物变为无效

C.乏力、消瘦、盗汗 ✓

D.出血突然加重

E.脾脏迅速肿大



30 .Ph 染色体阳性对于下列哪种疾病的诊断有重要意义 [单选题] \*

A.急性白血病

31 慢性粒细胞白血病 ✓

C.再生障碍性贫血

D.缺铁性贫血

E.特发性血小板减少紫癜

31. 下列关于慢性淋巴细胞白血病的描述, 不妥的是 [单选题] \*

A.淋巴结肿大常为就诊的首发症状

B.50%~70%患者有肝、脾肿大

C.欧美各国较常见

D.白血病细胞绝大多数起源于 B 细胞

E.好发于年轻人 ✓

32. 下列关于非霍奇金淋巴瘤的临床表现, 描述错误的是 [单选题]

A.随年龄增长而发病率增加

B.结夕 M 剥眼多见

C.淋巴结肿大较多见 ✓

D.常以高热或各器官系统症状为主要表现

E.易发生早期远处扩散

33. 下列关于霍奇金病的临床表现, 描述错误的是 [单选题] \*

A.多见于青年

B.淋巴结肿大较多见

C.皮肤瘙的口酒精疼痛是特异表现

D.可以越过邻近淋巴结向远处淋巴结跳跃式转移 V

E.晚期可发生血行播散

34. 下列关于造血干细胞移植患者的护理,描述错误的是 [单选题] \*

A.移植前复查血象、骨髓象、血生化、肝肾功能、心电图等,清除感染灶

B.入室前3天开始口服肠道不吸收的抗生素,进行肠道消毒

C.移植前预处理的目的是杀死肿瘤或白血病细胞;抑制免疫反应,减少排斥;腾空骨髓造血龕,以利植入

D.GVHD分为急、慢性两型,一般2个月以内发生的急性GVHD,2个月以后发生的为慢性GVHD

E.急性GVHD易发生在移植后20天左右,白细胞逐渐回升时,要注意观察耳后、手掌、脚心等部位的皮肤

改变

35. 关于骨髓穿刺术的护理,不妥的是 [单选题] \*

A.穿刺部位为髂后上棘时,患者宜取仰卧位 V

B.嘱患者术后当天不要沐浴,保持局部干燥,避免感染

C.血友病、局部皮肤感染者禁忌

D.操作过程中密切观察的面色、呼吸、脉搏、血压,告诉患者勿动,以防穿刺针折断

E.拔针后局部加压,血小板减少者至少按压3~5分钟

36. 患者女性,35岁,头昏、乏力、面色苍白1年余,体检除贫血貌外,无特殊发现。血象:

Hb75g/L,RBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ,WBC $4.0 \times 10^9/L$ ,P $112 \times 10^9/L$ ,网织红细胞0.06,肝肾功能正常,血清铁降低,追问

病史,患者有月经过多,初步诊断为缺铁性贫血,下列哪项不支持该诊断 [单选题] \*

A.血清铁蛋白降低

B.血象呈小细胞、低色素性贫血

C.骨髓缺乏可染铁 V

D.血清总铁结合力下降

E.骨髓红系增生为主，以中晚幼红细胞增生为主，粒系、巨核细胞系增生正常

37. 患者男性，35岁，因牙龈及全身皮肤出血就医。化验：血红蛋白 10g/L, 红细胞  $4.5 \times 10^{12}/L$ , 白细胞

$3.0 \times 10^9/L$ , 血小板  $20 \times 10^9/L$ 。骨髓检查：增生不良，应考虑 [单选题] \*

A.急性再障 ✓

B.慢性再障

C.急性白血病

D.特发性血小板减少性紫癜

E.脾功能亢进

38. 患者男性，发热 38.5℃。全身有小出血点，头晕乏力。检查：血红蛋白 80g/L, 红细胞  $3 \times 10^{12}/L$ , 白细胞

$3 \times 10^9/L$ , 血小板  $70 \times 10^9/L$ , 确诊为再生障碍性贫血。其发热的主要原因是 [单选题] \*

A.营养不良

B.缺乏成熟中性粒细胞 ✓

C.缺氧

D.出血

E.新陈代谢旺盛

39. 患者女性，40岁，不明原因牙龈渗血3月，月经量增多，诊断为特发性血小板减少性紫癜，下列实

验室检查哪项不支持该诊断 [单选题] \*

A.血小板计数减少

B.血小板相关免疫球蛋白增高

C.出血时间正常 ✓

D.血小板寿命缩短

E.血块回缩不良

40 .患者女性,32 岁诊断为慢性特发性血小板减少性紫癜 1 年余经常出血不止血小板常在  $50 \times 10^9/l$  以下,经口服泼尼松治疗 6 个月后症状无缓解,最近出血更为严重,血小板计数低于  $20 \times 10^9/l$ ,则目前最好应选择下列哪项治疗措施 [单选题] \*

- A.改用地塞米松治疗
- B.应用环磷酰胺治疗
- C.大量血浆置换
- D.脾切除
- E.输血 " 贩" ✓

41. 患者女性, 31 岁, 2 周前曾患上呼吸道感染, 昨日起下肢及臀部皮肤突然出现大片瘀点、瘀斑, 对称分布, 经检查确诊为过敏性紫癜, 下列关于检查结果的描述正确的是 [单选题] \*

- A.血小板减少
- B.血小板寿命缩短
- C.束臂试验阳性 ✓
- D.出血时间延长
- E.凝血时间延长

42.某急性白血病患者化疗期间, 血小板计数下降为  $15 \times 10^9/l$ ,护士对其进行护理时, 最应警惕的表现是 [单选题] \*

- A.发热
- B.咳嗽
- C.肛周疼痛
- D.剧烈头痛 ✓

E.皮肤出血点增多

43. 某溃疡患者经常胃出血。检查:Hb90g/l,RBC3.8X10<sup>12</sup>/l,确诊为缺铁性贫血,导致此病的原因是 [单选题] \*

A.慢性失血 ✓

B.蛋白丢失

C.缺维生素 B12

D.缺胃蛋白酶

E.缺叶酸

44. 导致血液病病人发热最常见的原因是 ( ) [单选题] \*

A.出血

B.继发感染 ✓

C.肿瘤细胞过度增生

D.贫血

E.骨关节痛

45. 下列哪项因素与血液病病人的出血无关 ( ) [单选题] \*

A.白细胞总数减少 ✓

B.凝血因子缺乏

C.血管壁通透性增加

D.血小板数目减少

E.血小板功能异常

46.

下列哪项检查最有助于血液病的临床诊断与鉴别诊断 ( ) [单选题] \*

A.血红蛋白浓度与红细胞计数

B.白细胞计数及其分类

C.骨髓检查 ✓

D.网织红细胞计数

E.血小板计数

47.贫血病人“皮肤黏膜苍白”最可靠的检查部位是（） [单选题] \*

A.口唇黏膜

B.睑结膜 ✓

C.面部皮肤

D.指甲

E.肢端皮肤

48. 临床上最常用于判断贫血严重程度的指标是（） [单选题] \*

A.红细胞计数

B.血红蛋白的浓度 ✓

C.白细胞计数

D.心率

E.皮肤黏膜的苍白程度

49.贫血治疗的首要原则是（） [单选题] \*

A.休息与吸氧

B.反复多次输血

C.及时补充造血物质

D.积极寻找和去除病因 ✓

E.应用刺激骨髓再生药物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656221053031010045>