

口腔医学主治医师：口腔颌面外科学六

1、单选 不需要拔除的乳牙是（）

- A. 乳牙滞留、影响恒牙正常萌出
- B. 乳牙龋坏、根尖外露造成口腔溃疡
- C. 乳牙不松动、恒牙先天缺失
- D. 乳牙为残根、牙根有瘻管
- E. 乳切牙唇侧位（江南博哥）、恒切牙已舌侧萌出

正确答案：C

2、单选 为了更准确地了解唇舌部病变的范围和性质，检查时一般用（）

- A. 口镜和敷料镊
- B. 分别用双手的拇指和食指
- C. 用口镜和一手的拇指
- D. 用敷料镊和一手的食指
- E. 用一手的拇指和食指 正确答案：E

3、单选 降颌肌群包括（）

- A. 二腹肌前腹
- B. 二腹肌后腹
- C. 下颌舌骨肌、颏舌肌、二腹肌前腹
- D. 下颌舌骨肌、颏舌肌、二腹肌后腹
- E. 二腹肌前腹、二腹肌后腹、颏舌肌 正确答案：C

4、单选 舌后1/3的淋巴管引流至（）

- A. 颏下和肩胛舌骨肌的淋巴结
- B. 颌下和颈深淋巴结
- C. 颈深淋巴结
- D. 腮腺淋巴结
- E. 锁骨上窝淋巴结 正确答案：D

5、单选 髁颈部骨折常伴有（）

- A. 上颌骨折
- B. 下颌角骨折
- C. 下颌升支骨折
- D. 颧弓骨折
- E. 对侧颞孔区或颈部骨折

正确答案：E

6、单选 幼儿的急性颌下淋巴结肿大多由哪种原因引起的（）

- A. 冠周炎
- B. 牙髓炎
- C. 牙周炎
- D. 上呼吸道感染

E. 牙龈炎

正确答案：D

7、单选 患者，女，50岁。左侧腮腺区反复肿胀3年，平时有胀感，口内时有咸味。较符合慢性阻塞性腮腺炎的X线造影表现为（）

A. 主导管不整型扩张

B. 末梢导管扩张

C. 腺内分支导管变细

D. 腺内有占位性病变

E. 主导管中断，造影剂外溢 **正确答案：B**

8、单选 腮腺导管口位于（）

A. 颊部黏膜的下1/3处

B. 下颌第二磨牙牙冠部平对的颊黏膜上

C. 平对上颌第二磨牙牙冠部的颊黏膜上

D. 颊脂垫尖

E. 翼下颌皱襞与颊垫尖之间 **正确答案：C**

9、单选 女，58岁，主诉右耳前区包块20年，缓慢生长，无其他不适。检查见右耳前区5cm×6cm结节状肿物，表面不光滑，有轻度的动度，与皮肤无粘连。最可能的诊断是右腮腺（）

A. 混合瘤

B. Warthin瘤

C. 舍格伦综合征（肿瘤型）

D. 黏液表皮样癌

E. 腺样囊性癌 **正确答案：A**

10、单选 在发育良好的情况下，双侧唇裂患者整复术最适合的年龄是（）

A. 3~6个月

B. 6~12个月

C. 1~2岁

D. 3~4岁

E. 6~7岁 **正确答案：B**

11、单选 一女患者不慎被机器将长发辫卷入，造成大块头皮撕脱。下列关于其创面描述不正确的是（）

A. 出血较多，疼痛剧烈易发生休克

B. 创缘整齐，有明显的出血点

C. 皮下组织及肌肉有挫伤

D. 颅骨暴露

E. 部分耳廓、眉毛连同上睑同时撕脱 **正确答案：B**

12、单选 普通拔牙后10天，伤口愈合良好，局部无明显炎症现象，但是患者常感到伤口处胀痛不适，尤其是碰触伤口颊侧时更为明显，常见的原因是（）

- A. 伤口内有残根遗留
- B. 伤口内有肉芽组织
- C. 干槽症
- D. 骨突
- E. 麻醉时针尖刺伤骨膜

正确答案：D

13、单选 仅限于悬雍垂裂开的唇裂是（）

- A. 软腭裂
- B. 不完全腭裂
- C. 单侧完全性腭裂
- D. I 度唇裂
- E. II 度唇裂

正确答案：A

14、单选 下齿槽神经阻滞麻醉如有感染易引起（）

- A. 嚼肌间隙感染
- B. 翼颌间隙感染
- C. 颊间隙感染
- D. 颌下间隙感染
- E. 颞间隙感染

正确答案：B

15、单选 颌下腺炎常见的原因（）

- A. 牙槽脓肿
- B. 淋巴结炎
- C. 结石堵塞导管
- D. 冠周炎
- E. 龋齿

正确答案：C

16、单选 若将局部麻醉药物注入血管中可发生（）

- A. 药物过敏
- B. 药物中毒
- C. 晕厥
- D. 血管扩张伤口出血
- E. 中枢神经麻痹

正确答案：B

17、单选 交叉十字绷带用于（）

- A. 临时固定颌骨
- B. 颌面部经常采用的绷带
- C. 使用于上颌骨、面、脸部手术后
- D. 各种骨折及术后颌骨制动用
- E. 适合上颌骨骨折的牵引

正确答案：B

18、单选 下列哪项不是腺样囊性癌的特征 ()

- A. 好发于腮腺和下颌下腺
- B. 肿瘤沿神经血管束生长
- C. 浸润性极强
- D. 区域淋巴结转移率低
- E. 可带瘤生存

正确答案：A

19、单选 患者，男，51岁，1年来左面颊、下唇部因触摸等诱因多次发生阵发性剧痛，近半年来发作频繁，疼痛剧烈难忍。初起卡马西平治疗有效，近来服药无效。根据目前病情哪种治疗为首选 ()

- A. 加大卡马西平剂量
- B. 行三叉神经病变支撕脱术
- C. 2%普鲁卡因三叉神经病变支封闭
- D. 三叉神经病变支95%乙醇局部注射
- E. 三叉神经病变支射频电凝术

正确答案：E

20、单选 睑、眉部损伤的处理措施哪条是不正确的 ()

- A. 有组织缺损时可拉拢缝合
- B. 清创后应准确对位缝合
- C. 应保持上下睑的长度
- D. 有组织缺损应植全厚皮片
- E. 清创时应尽量保存组织

正确答案：A

21、单选 牙种植术是指 ()

- A. 将人工预制成的非生物性假牙植入人体牙槽窝或牙槽骨内
- B. 将患者自身的埋伏牙拔下易位移植
- C. 将他人的牙移植于患者牙槽窝内
- D. 将已完全脱位的牙再植于原来的牙槽窝内
- E. 将患者自身的阻生牙拔下后行易位植入

正确答案：A

22、单选 预防性气管切开术一般切开的是 ()

- A. 环甲膜
- B. 气管一、二环
- C. 气管三、四环
- D. 环状软骨
- E. 环状软骨下方到第一气管环

正确答案：C

23、单选 关于麻醉效果，利多卡因比普鲁卡因维持的时间 ()

- A. 要短
- B. 一样长
- C. 长1倍

D. 长 2 倍

E. 长 3 倍 **正确答案: C**

24、单选 拔牙手术区准备不包括 ()

A. 术前反复漱口、必要时洁牙

B. 1 / 5000 高锰酸钾液冲洗术区

C. 1%甲硝唑液擦洗牙齿

D. 手术区用 1%或 2%碘酒消毒

E. 复杂牙齿需要切开缝合者, 要用 75%乙醇消毒口周及面部下 1 / 3 的皮肤, 并铺消毒巾 **正确答案: C**

25、单选 口腔颌面部较易早期发现的肿瘤是 ()

A. 腮腺浅叶肿瘤

B. 下颌骨肿瘤

C. 上颌窦肿瘤

D. 舌根部肿瘤

E. 口底肿瘤 **正确答案: A**

26、单选 面神经下颌缘支损伤的临床表现为 ()

A. 眼睑闭合不全

B. 额部皱纹消失

C. 鼻唇沟变浅

D. 舌偏向患侧

E. 下唇歪斜 **正确答案: E**

27、单选 根尖囊肿的 X 线表现为 ()

A. 根尖周骨质未见改变

B. 根尖周骨质不规则破坏

C. 根尖周骨质有破坏, 但边界清楚

D. 根尖周骨质有破坏, 周围有致密骨线

E. 根尖周骨质破坏, 牙槽突有破坏

正确答案: D

28、单选 放疗后一般多长时间内避免拔牙 ()

A. 6 个月

B. 1 年

C. 2 年

D. 3 年

E. 4 年

正确答案: D

29、单选 儿童复发性腮腺炎可见于任何儿童期, 最常见于 ()

A. 2 岁左右

B. 5 岁左右

- C. 8 岁左右
- D. 10 岁左右
- E. 14 岁

正确答案：B

30、单选 可以触及结石的是（）

- A. 蔓状血管瘤
- B. 海绵状血管瘤
- C. 杨梅状血管瘤
- D. 淋巴血管瘤
- E. 毛细血管瘤

正确答案：B

31、单选 单侧颞下颌关节强直的病人，若在儿童期发病，临床上可出现（）

- A. 健侧面部丰满
- B. 患侧面部狭长
- C. 颞点偏向患侧
- D. 前牙反𪙇
- E. 颞点偏向健侧

正确答案：C

32、单选 面神经颊支损伤的临床表现为（）

- A. 眼睑闭合不全
- B. 额部皱纹消失
- C. 鼻唇沟变浅
- D. 舌偏向患侧
- E. 下唇歪斜

正确答案：C

33、单选 拔牙术前准备不包括（）

- A. 详细询问病史
- B. 患者全身情况是否有拔牙禁忌证
- C. 必要时化验检查
- D. 必要时药物过敏试验检查
- E. 必要时进行牙髓活力检查

正确答案：E

34、单选 颌骨骨折治疗原则说法不正确的是（）

- A. 恢复正常的咬合关系
- B. 防止感染和镇痛
- C. 外伤后立即进行颌间固定
- D. 合理营养
- E. 保持呼吸道通畅

正确答案：C

35、单选 对偶三角瓣适用于（）

- A. 整复邻近组织的缺损
- B. 松解挛缩的疤痕

- C. 覆盖感染的创面
- D. 做毛发的移植
- E. 器官再造

正确答案： B

36、单选 口腔颌面部外伤出血最有效的止血方法是（）

- A. 填塞止血
- B. 结扎止血
- C. 指压止血
- D. 包扎止血
- E. 药物止血

正确答案： B

37、单选 上颌骨骨折致软腭后坠引起呼吸困难最主要的抢救措施是（）

- A. 气管切开
- B. 清除口腔内分泌物
- C. 从鼻腔或口腔插管
- D. 上提并固定上颌骨
- E. 环甲膜切开

正确答案： D

38、单选 以下哪种不属于癌前病变（）

- A. 白斑
- B. 口腔扁平苔藓
- C. 口腔黏膜下纤维性变
- D. 盘状红斑狼疮
- E. 着色性干皮病

正确答案： B

39、单选 拔除上颌第一磨牙时，应当防止牙根折断后被推入（）

- A. 鼻腔
- B. 软腭
- C. 颊部软组织内
- D. 上颌窦内
- E. 腭大孔内

正确答案： D

40、单选 下颌骨骨折不易发生的临床体征有（）

- A. 眼镜征
- B. 骨折异常活动度
- C. 出血和血肿
- D. 牙龈撕裂
- E. 咬合关系紊乱

正确答案： A

41、单选 颌面部创口初期缝合最宽时间为（）

- A. 6 小时

- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 48 小时
- E. 48 小时甚至更久的创口，只要没有明显的化脓，清创后仍可作初期缝合 **正确**

答案：E

42、单选 腭裂手术两侧松弛切口内填塞的碘仿纱条抽除时间为术后（）

- A. 2 天
- B. 3~4 天
- C. 4~6 天
- D. 7~12 天
- E. 15 天以后 **正确答案：D**

43、单选 三叉神经第三支是属于（）

- A. 运动神经
- B. 交感神经
- C. 分泌神经
- D. 混合性神经
- E. 感觉神经 **正确答案：D**

44、单选 诊断化脓感染的可靠依据是（）

- A. 白细胞增多
- B. 凹陷性水肿
- C. 超声波检查
- D. 穿刺检查
- E. X 线片检查 **正确答案：D**

45、单选 急性边缘性骨髓炎诊断主要依据（）

- A. 病史
- B. 切开引流时探查发现骨面粗糙
- C. 感染
- D. 局部症状
- E. 全身症状 **正确答案：B**

46、单选 颌面外伤清创时只能清除下述哪种组织（）

- A. 坏死组织
- B. 污染组织
- C. 多余组织
- D. 不整齐的组织
- E. 可能坏死的组织 **正确答案：A**

47、单选 哪种肿瘤属于临界瘤（）

- A. 鳃裂囊肿
- B. 成釉细胞瘤

- C. 皮脂腺囊肿
- D. 甲状舌管囊肿
- E. 骨化纤维瘤

正确答案：B

48、单选 对放射线敏感的肿瘤是（）

- A. 恶性黑色素瘤
- B. 颌骨骨肉瘤
- C. 脂肪肉瘤
- D. 下颌下腺腺癌
- E. 嗜酸粒细胞增生性淋巴肉芽肿

正确答案：E

49、单选 一患有双侧完全性唇腭裂的患儿，否认家族中有类似病史，临床表现提示可能患有某种全身发育畸形综合征。耳的检查应注意（）

- A. 外耳道分泌物
- B. 乳突压痛
- C. 耳郭缺损及听力情况
- D. 邻近部位的炎症
- E. 邻近部位的畸形 **正确答案：C**

50、单选 下唇的主要感觉神经来自（）

- A. 舌下神经
- B. 面神经
- C. 下颌神经
- D. 上颌神经
- E. 非上述神经 **正确答案：C**

51、单选 男，11岁，因牙齿排列不齐要求正畸治疗，检查发现前牙拥挤。适于观察混合牙列乳恒牙交替情况的是（）

- A. 曲面体层
- B. 上颌侧位体层
- C. 上颌后前位体层第一磨牙层
- D. 上颌前位体层翼突层
- E. 下颌体腔 **正确答案：A**

52、单选 女，50岁，开口受限1年，既往有关节弹响史。临床检查见开口度一指半，开口型左偏。下列表现中，哪一项不是颞下颌关节紊乱综合征的表现（）

- A. 关节间隙改变
- B. 髁突运动度改变
- C. 两侧关节形态不对称
- D. 髁状突骨质硬化

E. 关节结构为 T 形致密团块代替 **正确答案：E**

53、单选 诊断化脓性感染的可靠依据是（）

- A. 白细胞增多
- B. 凹陷性水肿
- C. 超声波检查
- D. 穿刺检查

E. X 线片检查 **正确答案：D**

54、单选 患者女性，43 岁，双侧腮腺反复肿大一年半，与进食有关，并伴轻微疼痛，有时自觉有咸味分泌物，口干不明显。检查见双侧腮腺肿胀不明显，导管口稍红，挤压腺体可从导管口流出混浊的“雪花样”唾液。该病最可能的诊断是（）

- A. 舍格伦综合征
- B. 慢性复发性腮腺炎
- C. 腮腺淋巴结炎
- D. 腮腺结核

E. 流行性腮腺炎 **正确答案：B**

55、单选 拔牙创内完全形成新骨的时间是（）

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 6 个月
- E. 12 个月

正确答案：C

56、单选 对一般心脏病患者要求拔牙时（）

- A. 不应做拔牙手术
- B. 绝对禁止拔牙
- C. 可以拔牙，但麻醉药内不加肾上腺素
- D. 为了拔牙效果好，拔牙时应加肾上腺素
- E. 必须在心电监护下拔牙 **正确答案：C**

57、单选 牙槽嵴修整适应证时间在拔牙后（）

- A. 2~3 周
- B. 4~5 周
- C. 6~7 周
- D. 7~8 周
- E. 8~12 周

正确答案：E

58、单选 神经鞘瘤的穿刺液特点为（）

- A. 蛋清样液

- B. 淡黄色清亮液，内含胆固醇结晶
- C. 血性液，但不凝固
- D. 米汤样稀薄液
- E. 血性液、凝固

正确答案：C

59、单选 新生儿颌骨骨髓炎常发生在（）

- A. 下颌骨体部
- B. 下颌支
- C. 下颌骨髁状突
- D. 上颌骨
- E. 上颌骨与翼突连接处

正确答案：D

60、单选 昏迷的外伤病员运送时最佳体位是（）

- A. 侧卧位
- B. 仰卧位
- C. 随时变动
- D. 俯卧位
- E. 头高仰卧位

正确答案：D

61、单选 患者，男，54岁，右舌缘溃疡5个月不愈，全身一般情况良好。门诊活检诊断为“舌鳞状细胞癌（Ⅱ～Ⅲ级）”。经专家门诊详细检查后诊断为“右舌缘鳞状细胞癌（T3N2aM0）”。该患者应选择的最佳治疗方案为（）

- A. 已无手术指征，鳞癌对放疗不敏感，尽快化疗
- B. 无手术指征，放疗加化疗
- C. 已无手术指征，鳞癌对化疗不敏感，尽快放疗
- D. 鳞癌对放、化疗均不敏感，尽快手术治疗
- E. 术前化疗加手术治疗加术后放、化疗

正确答案：E

62、单选 口角区的疖肿最易引起哪组淋巴结的肿痛（）

- A. 颌下淋巴结
- B. 颌上淋巴结
- C. 颌下淋巴结
- D. 腮腺下极淋巴结
- E. 颈浅淋巴结

正确答案：C

63、单选 牙槽外科阻滞麻醉时发生面瘫，处理方法为（）

- A. 局部注射神经营养药
- B. 局部理疗
- C. 口服镇静药
- D. 不做特殊处理
- E. 处理同Bell面瘫

正确答案：D

64、单选 舍格伦综合征伴发结缔组织病中最常见的是（）

- A. 多发性肌炎
- B. 红斑狼疮
- C. 类风湿性关节炎
- D. 结节性动脉炎
- E. 硬皮病

正确答案：C

65、单选 处理晕厥需要静脉推注的药物是（）

- A. 止血敏
- B. 抗生素
- C. 安定
- D. 高渗葡萄糖
- E. 扑尔敏

正确答案：D

66、单选 患者男性，63岁，右耳垂前肿性胀大8个月。近期肿物增长较快，痛向耳颞部放散。检查发现肿物约3.5cm、质地硬、有触痛、边界不清。活动度差，右眼睑闭合较对侧迟钝。以下哪项辅助检查对患者来说是不恰当的（）

- A. CT检查
- B. 胸部X线片
- C. 腮腺造影
- D. 细针吸细胞学检查
- E. 切除活组织检查

正确答案：E

67、单选 流行性腮腺炎的好发年龄（）

- A. 婴儿期
- B. 5~15岁
- C. 中年人
- D. 老年人
- E. 无明显年龄选择

正确答案：B

68、单选 一女患者不慎被机器将长发辫卷入，造成大块头皮撕脱。行清创缝合术中，若血管条件允许，应进行（）

- A. 松解创缘，减少张力尽量拉拢缝合
- B. 撕脱的皮肤清创后，切削成全厚或中厚皮片再植
- C. 立刻做血管吻合组织再植术
- D. 采用局部皮瓣关闭创面
- E. 切取健康组织皮片游离移植消灭创面

正确答案：C

69、单选 女，23岁，双侧颞下颌关节弹响2年，许勒位及经咽侧位显示髁状突前斜面有明确的骨质改变。颞颌关节上腔造影可见上、下腔均有造影剂显影，应诊断为（）

- A. 关节盘内移位
- B. 关节上、下腔交通
- C. 关节盘外移位
- D. 关节盘穿孔
- E. 关节囊松弛 **正确答案: B**

70、单选 作为关节功能面，许多关节病最早破坏的髁状突关节斜面是（）

- A. 前斜面
- B. 后斜面
- C. 外侧斜面
- D. 内侧斜面
- E. 以上都不是

正确答案: A

71、单选 患者，女，35岁，因左下颌区无痛性肿胀1年就诊，局部无麻木。临床见左下颌角膨隆，皮肤正常，无波动感，口内左下磨牙区龈颊沟丰满，舌侧膨隆明显，触之有乒乓球感，黏膜无破溃。以下X线片表现，哪项最不符合造釉细胞瘤的X线特征（）

- A. 多房且房室大小相差悬殊
- B. 牙根有锯齿状吸收
- C. 肿瘤边缘皮质骨局部硬化
- D. 肿瘤内可见钙化影
- E. 肿瘤所在的骨皮质膨隆 **正确答案: E**

72、单选 男，30岁，因车祸面部外伤2天，检查见两侧面部不对称，左侧下睑肿胀、瘀血，口内检查左侧后牙早接触。首先应拍下列哪个片位（）

- A. 上颌体腔
- B. 上颌前部片
- C. 上颌正位体片
- D. 华特位
- E. 颧骨后前位 **正确答案: D**

73、单选 不是真性囊肿的是（）

- A. 角化囊肿
- B. 球上颌囊肿
- C. 始基囊肿
- D. 牙源性钙化囊肿
- E. 表皮样囊肿 **正确答案: D**

74、单选 腮腺淋巴结的淋巴液引流到（）

- A. 枕淋巴结
- B. 颌上淋巴结
- C. 颌下淋巴结

D. 颈深上淋巴结

E. 颈深下淋巴结 **正确答案：D**

75、单选 创缘内卷的主因是（）

A. 进针过深

B. 收结过紧

C. 组织富裕

D. 两侧进针深度不一致

E. 皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距 **正确答案：E**

76、单选 颌面部最常见的感染途径是（）

A. 血源性

B. 损伤性

C. 腺源性

D. 牙源性

E. 手术时不合理的操作

正确答案：D

77、单选 最理想的阻滞麻醉药是（）

A. 普鲁卡因

B. 利多卡因

C. 地卡因

D. 可卡因

E. 氯乙烷

正确答案：B

78、单选 下齿槽神经阻滞麻醉时发生面瘫的原因是（）

A. 注射点过高

B. 注射点过前

C. 注射点过低

D. 注射点过后

E. 注射入血管内 **正确答案：D**

79、单选 下列关于腺淋巴瘤不正确的是（）

A. 多见于女性

B. 又名沃辛瘤

C. 肿块可有消长史

D. 患者常有吸烟史

E. 多位于腮腺后下极 **正确答案：A**

80、单选 关于颞下颌关节强直的治疗方法哪一项是正确的（）

A. 理疗、微波

B. 抗炎为主

C. 镇痛药物辅助下的开口训练

- D. 早期手术治疗为主
E. 早期药物治疗，晚期手术治疗 **正确答案：D**

81、单选 通常颌面部随意瓣的长度比例为（）

- A. 1: 1
B. 1.5: 1
C. 2~3: 1
D. 4~5: 1
E. 6: 1 **正确答案：C**

82、单选 急性化脓性腮腺炎最常见病原菌是（）

- A. 乳酸杆菌
B. 链球菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 肺炎球菌
E. 厌氧菌 **正确答案：C**

83、单选 主要用于口外创口小量渗出的引流为（）

- A. 片状引流
B. 纱条引流
C. 管状引流
D. 负压引流
E. 加压引流 **正确答案：A**

84、单选 儿童颌骨骨折治疗原则错误的是（）

- A. 尽早复位
B. 固定时间较成人短
C. 尽可能采用保守治疗
D. 必须恢复伤前的咬合关系
E. 如要手术治疗，术中应避免损伤牙胚

正确答案：D

85、单选 作用于M期的化疗药物是（）

- A. 环磷酰胺
B. 氨甲蝶呤
C. 氮芥
D. 长春新碱
E. 争光霉素

正确答案：D

86、单选 包扎止血主要适用于（）

- A. 毛细血管和小动、静脉的出血
B. 知名动脉的出血
C. 腔窦的出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656233233041010113>