

四川省儿童新冠肺炎重症救治能力理论考试(2023 年)

A1 型题

1.目前国际上采用 STABLE 模式在转运前对患儿进行处理，以下说法哪项是错误的：（） [单选题] *

- A.S 代表 sugar，血糖
- B.T 代表 temperature，体温
- C.A 代表 antibiotic 抗生素 ✓
- D.L 代表 lab work，基本实验室检查
- E.E 代表 emotional support，情感支持

2. 关于新型冠状病毒传播途径，下列说法错误的是（） [单选题] *

- A 呼吸道飞沫和密切接触传播是主要的传播途径
- B 在相对封闭的环境中经气溶胶传播
- C 接触被病毒污染的物品后也可造成感染
- D 妊娠后期感染者有母婴垂直传播可能
- E 叮咬也可造成感染 ✓

3. 新型冠状病毒肺炎的发病机制中，下列说法错误的是（） [单选题] *

- A 病毒直接损害
- B 细胞因子风暴
- C 四重打击学说 ✓
- D 凝血功能异常
- E 免疫功能紊乱

4. 关于儿童多系统炎症综合征的临床表现，下列说法错误的是（）[单选题] *

A 发热（ $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ）

B 皮疹 ✓

C 结膜充血

D 淋巴结大

E 全身性炎症和休克症状

5. 关于新型冠状病毒感染临床分型，下列说法错误的是（）[单选题] *

A 无症状感染

B 急性上呼吸道感染

C 重症肺炎

D 新型冠状病毒相关脑病 ✓

E 多系统炎症综合征

6. 关于新型冠状病毒肺炎重症诊断标准，下列说法错误的是（）[单选题] *

A 出现气促

B 静息状态下指氧饱和度（ SpO_2 ） $\leq 95\%$ ✓

C 有呼吸困难表现、间歇性呼吸暂停

D 意识障碍

E 拒食或喂养困难，有脱水征

7. 气促的呼吸频率（RR）诊断标准，下列说法错误的是（）[单选题] *

A < 2 月龄， $\text{RR} \geq 60$ 次/min

B $2 \sim 12$ 月龄， $\text{RR} \geq 50$ 次/min

C $1 \sim 3$ 岁， $\text{RR} \geq 40$ 次/min

D 4~5 岁，RR $\geq$ 35 次/min ✓

E >5 岁，RR $\geq$ 30 次/min

8. 新生儿气胸伴呼吸衰竭应用呼吸机支持原则：（） [单选题] *

A. 较低的吸气峰压

B. 较短的吸气时间和较快的呼吸频率

C. 可选用高频通气

D. 适当高的吸氧浓度

E. 以上都是 ✓

9. 关于儿童新冠病毒感染发生重症的高危人群，下列说法错误的是（） [单选题] *

A 先天性心脏病

B 重度营养不良

C 肥胖

D 近期有抗生素暴露史 ✓

E 早产儿

10. 关于新型冠状病毒预警指标中，下列说法错误的是（） [单选题] *

A 高热 3d ✓

B 呼吸急促，除外发热和哭吵的影响

C 静息状态下，指氧饱和度 $\leq$ 95%

D 精神反应差，嗜睡

E 严重的消化道症状 呕吐、腹泻和腹痛等

11. 关于新型冠状病毒感染非药物干预措施中，下列说话错误的是（） [单选题] *

A 儿童需佩戴 N95 过滤式口罩 ✓

- B 正确执行手卫生，推荐儿童使用肥皂和水洗手
- C 保持社交距离，必要时进行隔离
- D 居室保持通风，紫外线消毒
- E 对高频接触的物体表面用有效氯消毒剂擦拭消毒

12. 关于新型冠状病毒感染预防措施中，下列说法错误的是（）[单选题] *

- A 一般预防的主要措施是非药物干预措施，包括佩戴口罩、执行手卫生、保持社交距离、隔离及室内通风等。
- B 均衡膳食、充足睡眠、保持口腔健康、适量运动、作息规律、避免过度疲劳，提高自身免疫力是避免被感染的重要手段。
- C 鼓励疑似或确诊感染的母亲在隔离期进行母乳喂养。 ✓
- D 接种疫苗仍然是预防病毒感染、降低感染后重症率和死亡率的有效方法。
- E 我国 3 岁及以上儿童中可接种新型冠状病毒灭活疫苗。

13. 为控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情的传播蔓延，医务人员做到：（）[单选题] *

- A 早发现早报告早诊断早治疗
- B 早发现早报告早诊断早转院早治疗
- C 早发现早诊断早隔离早治疗 ✓
- D 早发现早报告早诊断早隔离早治疗

14. 新型冠状病毒感染的肺炎属（）传染病。[单选题] *

- A 甲类
- B 乙类 ✓
- C 丙类
- D 其他类

15. 新型冠状病毒感染的肺炎的报告时间为: () [单选题] *

A、1 小时

B、2 小时 ✓

C、12 小时

D、24 小时

16. WHO 将此次在湖北武汉发现的新型冠状病毒命名为 () [单选题] *

A. 2019-nCoV ✓

B. SARS

C. 腺病毒

D. MERS

17. 当病情稳定，动脉血气正常时，为撤离呼吸机做准备调节参数的步骤为 () [单选题] *

A. 降低 FiO₂—降低 PIP—降低呼吸频率 ✓

B. 降低 FiO₂—降低流速—降低呼吸频率

C. 降低 PIP—降低呼吸频率—降低 FiO₂

D. 降低流速—降低 FiO₂—降低呼吸频率

E. 降低呼吸频率—降低 FiO₂—降低 PIP

18. 关于新型冠状病毒的特点，下列说法错误的是 () [单选题] *

A. 病毒对热敏感

B. 56℃ 15 分钟可有效灭活病毒 ✓

C. 75% 乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒

D. 氯己定不能有效灭活病毒

19. 重型、危重型新冠肺炎患者，每天俯卧位通气的时间为: () [单选题] *

A. 4 小时以上

B. 8 小时以上

C. 12 小时以上 ✓

D. 16 小时以上

20. 新型冠状病毒感染的肺炎危重病例的治疗原则: () [单选题] *

A 防治并发症, 治疗基础病, 预防继发感染, 器官功能支持 ✓

B 以特异性治疗为主, 一般对症治疗为辅

C 以治疗护理为主, 消毒隔离为辅

D 以消毒隔离为主, 治疗护理为辅

21. 标准预防强调: ()。 [单选题] *

A. 主要保护病人

B. 主要保护医护人员

C. 保护抵抗力差的病人

D. 保护病人和医护人员 ✓

22. 新生儿加温湿化高流量鼻塞导管氧疗 (Heated humidified high-flow nasal cannula) 是新兴的

无创呼吸辅助方式, 请问大于 () L/min 流速被称作高流量: [单选题] *

A. 1

B. 2 ✓

C. 3

D. 4

E. 5

23. 下列哪项不是儿童重症肺炎的判断标准 () [单选题] *

- A.呼吸急促、发绀、三凹征阳性
- B.有除呼吸系统外其他器官系统受到累及
- C.一般情况差，合并意识障碍
- D.胸部 CT 提示大片肺实变 ✓

24. 新型冠状病毒感染的肺炎的治疗场所: () [单选题] *

- A 诊室安装纱门纱窗等防蝇防蚊设施
- B 诊室内安装非手触式洗手装置等洗消毒设施，配备便器和医疗废弃物收集箱
- C 便器用 20XXmgL 含氯消毒剂作用 30 分钟，冲洗后备用
- D 应在具备有效隔离条件和防护条件的医院隔离治疗，危重症病例应尽早收入 ICU 治疗。 ✓

25. 新型冠状病毒感染的肺炎可能的传播途径为: () [单选题] *

- A 飞沫传播和接触传播 ✓
- B 飞沫传播和粪口
- C 接触传播和血液
- D 血液传播和性传播

26. 对于哮喘的诊断和治疗，描述不正确的是哪一项? () [单选题] *

- A. 儿童哮喘的诊断主要依赖于临床表现和可逆性气流受限的证据，并排除可能引起相关症状的其他疾病
- B. 对于难治性哮喘或者重症哮喘患儿，要注意共存疾病的识别和治疗，如原发性纤毛功能障碍、囊性纤维化等疾病
- C. 肺通气功能检测是诊断哮喘的重要手段，也是评估哮喘控制水平和病情严重程度的重要依据
- D. 对于反复咳嗽和（或）喘息的儿童，肺功能检查提示存在阻塞性通气功能障碍，可以诊断哮喘 ✓

E.对于哮喘控制不理想的患儿，应该对用药依从性、吸入装置操作和吸入技术的正确与否进行评估

17.动脉血气分析 $\text{PaCO}_2 < 35\text{mmHg}$ 表示 () [单选题] *

A、肺泡通气过度 ✓

B、肺泡通气不足

C、缺氧

D、通气正常

E、 CO_2 潴留

28.某患者查动脉血气分析，结果为 $\text{PaO}_2 55\text{mmHg}$ $\text{PaCO}_2 90\text{mmHg}$ ，诊断为 () [单选题] *

A、I型呼衰

B、II型呼衰 ✓

C、III型呼衰

D、IV型呼衰

E、心衰

29.王某，男，7岁，因车祸导致颅脑损伤，胸部骨折，肋骨骨折，气胸，患者昏迷，呼吸困难，急查

动脉血气分析，结果示： PH 值 7.40 $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 35\text{mmHg}$ ，提示该患者 () [单选题] *

A、轻度缺氧

B、中度缺氧

C、重度缺氧 ✓

D、 CO_2 潴留

E、酸中毒

30.判断心脏骤停，下列哪项辅助检查最可靠 () [单选题] *

A、X线片

B、测血压

C、心脏彩超 ✓

D、脑电图

E、心电图

31.心脏骤停最可靠而出现较早的临床征象是丧失伴有主动脉搏动消失。（）[单选题] *

A、体温

B、呼吸

C、血压

D、脉搏

E、意识 ✓

32.一个呼吸暂停的新生儿对吸引、擦干及背部摩擦无反应，下一个合适的措施是什么？（）[单选题] *

A、常压给氧

B、轻弹足底

C、评估新生儿是否足月妊娠

D、开始正压人工呼吸 ✓

E、开始胸外心脏按压

33.心肺复苏时，胸外心脏按压的部位是（）[单选题] *

A、心前区

B、胸骨上段

C、胸骨下段

D、胸骨正中

E、胸骨中下 1/3 交界处 ✓

34.增加儿童哮喘发病风险的危险因素不包括（）[单选题] *

- A.存在个人过敏史及哮喘家族史
- B.存在特应性皮炎和过敏性鼻炎
- C.既往有喘息发作史，IgE 水平升高
- D.急性上呼吸道感染 ✓
- E.肥胖

35.应用呼吸机时，SIMV 表示（）[单选题] *

- A、辅助通气
- B、控制通气
- C、呼气末正压通气
- D、持续气道正压通气
- E、同步间歇指令通气 ✓

36.应用呼吸机时，PEEP 表示（）[单选题] *

- A、吸气末正压通气 ✓
- B、持续气道正压通气
- C、压力支持通气
- D、指令通气
- E、呼气末正压通气

37.呼吸机湿化罐温度要求保持在℃ （）[单选题] *

- A、30-32
- B、32-35
- C、35-38 ✓

D、38-40

E、20-22

38.呼吸机湿化器中应加入（）[单选题] *

A、生理盐水

B、酒精

C、无菌蒸馏水 ✓

D、自来水

E、消毒液

39.婴幼儿秋冬季节腹泻的主要病原是：（）[单选题] *

A．星状病毒

B．腺病毒

C．杯状病毒

D．轮状病毒 ✓

E．诺如病毒

40.下列选项中，哪一项不是支气管异物的诊断依据？（）[单选题] *

A. 幼儿，进食时发生呛咳

B. 在剧烈呛咳后出现喘息

C. 常规使用支气管舒张剂及吸入糖皮质激素治疗，喘息无缓解

D. 肺部听诊闻及双肺弥漫分布哮鸣音 ✓

E. 胸片提示右肺中下叶不张

41. 儿童支气管镜诊疗术的禁忌症不包括（）[单选题] *

A. 严重心肺功能减退

B.严重心律失常如心室颤动及扑动、I度房室传导阻滞 ✓

C.活动性大咯血、严重的凝血功能障碍

D.严重的肺动脉高压

E、严重营养不良不能耐受诊疗操作

42.以下描述中属于猩红热皮疹特点的是（）[单选题] *

A 发病后 1~2 天内出现皮疹，可在 24 小时内遍布全身，多在 48 小时内达最高峰，以后按出疹的先后顺序消退

B 常先由耳后、颈部开始，迅速蔓延至躯干和四肢

C 在全身弥漫性潮红的基础上，散布粟粒大小、点状、鲜红色丘疹，细小密集，压之褪色

D 病情严重时可出现出血性皮疹

E 以上均正确 ✓

43. 水痘的重要皮疹特征是（）[单选题] *

A 首发于头皮、面部或躯干

B 最初的皮疹为瘙痒强烈的红色斑丘疹，随后演变成透明饱满的水疱

C 水疱出现后 24~48 小时，疱液变浑浊，水疱出现中央凹陷

D 斑疹、丘疹、水疱和结痂同时存在 ✓

E 皮疹呈中央或向心分布

44.肺炎患儿进行胸部 CT 检查的指征中不准确的是哪一项?（）[单选题] *

A.临床表现与胸片不一致

B.怀疑有气道和肺部畸形

C.有严重并发症

D.疗效不佳，需要除外其他疾病

E.重症肺炎 ✓

45.关于发热儿童退热治疗的推荐，以下不正确的是（）[单选题]*

A 糖皮质激素能作为退热剂常规用于儿童退热 ✓

B 解热镇痛药不能有效地预防热性惊厥发作

C 不推荐对乙酰氨基酚联合布洛芬用于儿童退热，也不推荐对乙酰氨基酚与布洛芬

交替用于儿童退热

D 虽然在对乙酰氨基酚退热基础上联合温水擦浴短时间内退热效果更好些，但会明显增加患儿不适感，因此不推荐使用温水擦浴退热，更不推荐冰水或乙醇擦浴方法退热

E 因发热出现了不舒适和情绪低落的发热儿童，推荐口服对乙酰氨基酚或布洛芬治疗

46.关于儿童重症肺炎的快速评估，描述错误的是（）[单选题]*

A.重症肺炎病死率高，可能遗留后遗症，需要尽早识别

B.对于 5 岁以下儿童，可以在家中或者门急诊进行快速临床评估，以便于早期识别有潜在风险的肺炎危重患儿 ✓

C.临床实践中，若发现肺炎患儿面色苍白或发灰，对周围环境反应差，应该视为极重度肺炎的表现

D.在 WHO 标准中，肺炎儿童出现下胸部吸气性凹陷、鼻翼扇动或者呻吟，为重症肺炎

E.若肺炎儿童出现中心性紫绀、严重呼吸窘迫、拒食或脱水征，为极重度肺炎

47.以下说法不正确的是（）[单选题]*

A 一般情况良好的病因不明急性发热的新生儿，发热 12 h 之后较 12 h 之前行血常规检查诊断严重细菌感染的敏感度和特异度更优

B 一般情况良好的病因不明急性发热的新生儿，发热 12 h 之后较 12 h 之前行 CRP 检查诊断严重细菌感染的敏感度和特异度更优

C $WBC < \text{临界值 } 15 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 或 $ANC < \text{临界值 } 10 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 时，诊断严重细菌感染的可能性小

D 1 月龄至 3 岁病因不明急性发热、没有感染中毒症状的儿童，发热 8h 内行 PCT 检查较 CRP 和血常规检查诊断严重细菌感染价值更大

E CRP> 临界值 $80\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，诊断严重细菌感染的敏感度、特异度均高 ✓

48. 关于重症肺炎的治疗，描述不准确的是哪一项？（） [单选题] *

A. 对于重症病毒性肺炎，即使在发病初期无细菌感染的证据，也可以使用抗菌药物 ✓

B. 在抗菌药物应用前，应尽早进行病原学检查

C. 重症肺炎患者应用抗菌药物的剂量可以适当加大，有条件可以测定血药浓度

D. 抗菌药物要根据药代动力学、药效学、组织部位浓度以及不良反应等来选择

抗菌药物的选用原则应为安全有效

49. 做 PPD 皮试时，注射皮丘直径为：B [单选题] *

A、3-5mm ✓

B、6-10mm

C、3-5mm

D、5-8mm

E、10-15mm

50. PPD 皮试的哪项不正确：（） [单选题] *

A、前臂掌面肘关节下方 2-4 英寸；

B、前臂掌面中下三分之一交界处；✓

C、避免局部溃疡、伤疤处进行皮试；

D、PPD 皮试结果的解读必须结合患者年龄、免疫状态等进行解读

51. 重症手足口病早期预警因素不包括：（） [单选题] *

A、持续高热；

B、高血糖；

C、白细胞总数增高；

D、神经系统受累；

E、皮疹多、密集 ✓

52. 下列哪一项不是儿童重症肺炎的高危因素？（） [单选题] *

A. 患有先天性心脏病

B. 患有支气管肺发育不良

C. 患有神经肌肉疾病

D. 患有胃食管反流 ✓

E. 小于 3 个月的婴儿

53. “TORCH” 是一组病原微生物的英文名称缩写，其中“R”代表：（） [单选题] *

A. 弓形虫

B. 风疹病毒 ✓

C 巨细胞病毒

D. 单纯疱疹病毒

E. 梅毒螺旋体

54. 婴儿期易患消化紊乱、营养不良的原因是：（） [单选题] *

A. 生长发育最迅速，但消化功能未成熟 ✓

B. 母乳不足

C. 婴儿偏食

D. 未及时添加辅食

E. 呕吐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656234233233011100>