

全科医学住院医师：眼科题库知识点（题库版）

1、单选 流行性角结膜炎的病原体不包括（）。

- A. 腺病毒 7 型
- B. 腺病毒 8 型
- C. 腺病毒 19 型
- D. 腺病毒 29 型
- E. 腺病毒 37 型

正确答案：A

参考解析：腺病毒 3、4、7 型引起咽（江南博哥）结膜热。

2、单选 在青光眼导致眼压升高的病理生理过程中，临床上绝大部分青光眼是哪一种因素导致的（）。

- A. 房水外流阻力增加
- B. 眼球变小
- C. 睫状突生成房水的速率增加
- D. 表层巩膜的静脉压增加
- E. 葡萄膜巩膜途径阻力增加

正确答案：A

3、多选 急性闭角型青光眼临床前期包括（）。

- A. 具有浅前房，房角窄等特点，但尚未发生青光眼的患眼
- B. 具有眼压急剧增高，视力明显减退的特点
- C. 具有明确的另一眼急性闭角型青光眼发作史，而该眼却从来没有发作过
- D. 具有视神经凹陷性萎缩的特点
- E. 有急性闭角型青光眼家族史，眼部有急性闭角型青光眼的解剖特征，没有青光眼的发作史

正确答案：A, C, E

参考解析：急性闭角型青光眼临床前期指具有浅前房，房角窄等特点，但尚未发生青光眼的患眼，有两种情况：一类是具有明确的另一眼急性闭角型青光眼发作病史，而该眼却从来没有发作过，另一类是有急性 闭角型 青光眼家族史，眼部有急性闭角型青光眼的解剖特征，没有青光眼的发作史。

4、单选 前房角是指（）。

- A. 虹膜之后与睫状体之间的间隙
- B. 角膜之后的周边部分
- C. 巩、角膜与虹膜睫状体之间的隐窝
- D. 角膜与虹膜睫状体之夹角
- E. 巩膜与虹膜睫状体之夹角

正确答案：C

5、单选 美开朗的作用机制（）。

- A. 阻断睫状体色素上皮细胞 β 1 受体，减少房水生成

- B. 阻断睫状体色素上皮细胞 β_2 受体，减少房水生成
- C. 阻断睫状体非色素上皮细胞 β_1 受体，减少房水生成
- D. 阻断睫状体非色素上皮细胞 β_2 受体，减少房水生成
- E. 增加葡萄膜-巩膜途径房水引流

正确答案：D

6、单选 结膜炎的治疗中哪项是错误的（）。

- A. 冲洗结膜囊
- B. 冷敷
- C. 局部点用抗生素
- D. 全身应用抗生素
- E. 遮盖患眼

正确答案：E

7、填空题 淋菌性结膜炎在成人主要是（）所致，在新生儿则是（）时所感染。

正确答案：急性淋菌性尿道炎的自身感染；通过产道

8、单选 下列说法错误的是（）。

- A. 乳头中央有扩张的毛细血管通过
- B. 腺病毒导致的结膜炎易出现结膜下出血
- C. 耳前淋巴结肿大是病毒性结膜炎的一项重要特征
- D. 乳头是结膜炎的特异性体征
- E. 滤泡中央无血管通过

正确答案：D

参考解析：乳头增生是结膜炎的非特异性体征。

9、单选 先天性青光眼发病机制为（）。

- A. 眼轴短
- B. 大角膜
- C. 房角结构发育不全
- D. 房角窄
- E. 瞳孔阻滞

正确答案：C

参考解析：先天性青光眼发病机制是房角结构发育不全。

10、单选 睑内翻，倒睫最常见于（）。

- A. 上睑下垂
- B. 淋球菌性结膜炎
- C. 沙眼
- D. 急性卡他性结膜炎
- E. 春季角结膜炎

正确答案：C

参考解析：沙眼晚期并发症可有睑内翻、倒睫、上睑下垂、角膜浑浊等。

11、单选 正常 24 小时眼压波动范围（ ）。

- A. 10~21mmHg
- B. ≤ 5 mmHg
- C. ≤ 8 mmHg
- D. > 5 mmHg
- E. > 8 mmHg

正确答案：C

12、单选 患者女性，24 岁，左眼红 5 天后就医。检查：右眼下方球结膜充血，相应部位见一疱疹样结节，角膜透明，最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性卡他性结膜炎
- B. 泡性结膜炎
- C. 滤泡性结膜炎
- D. 慢性结膜炎
- E. 过敏性结膜炎

正确答案：B

参考解析：泡性结膜炎多见于女性、青少年、儿童，早期为实性、隆起结节，周围有充血区，是迟发型免疫反应性疾病。

13、单选 泪道冲洗时，水由下泪小点进入，自下泪小点流出，未见脓性分泌物，其诊断为（ ）。

- A. 泪小管阻塞
- B. 泪小点闭塞
- C. 泪小管炎
- D. 慢性泪囊炎
- E. 鼻泪道阻塞

正确答案：A

14、单选 患者男性，右眼红肿，分泌物增多 3 天，检查：右眼睑红肿。结膜囊内大量黄白色分泌物，结膜充血，水肿，耳前侧淋巴结肿大压痛，角膜透明，伴有尿急，尿频，尿痛症状。最可能诊断为（ ）。

- A. 淋球菌性结膜炎
- B. 慢性结膜炎
- C. 沙眼
- D. 流行性角结膜炎
- E. 病毒性结膜炎

正确答案：A

参考解析：淋球菌性结膜炎，大量脓性分泌物，眼睑水肿，结膜充血，耳前淋巴结肿大压痛，可有泌尿系统症状。

15、单选 正常眼压值（ ）。

- A. 11~20mmHg
- B. 10~20mmHg
- C. 11~21mmHg
- D. 10~21mmHg
- E. 11~22mmHg

正确答案：D

16、单选 原发性闭角型青光眼和原发性开角型青光眼的根本区别是（）。

- A. 眼压升高的快慢
- B. 眼压升高的程度
- C. 眼压升高时房角是开放还是闭合
- D. 眼压控制时房角是开放还是闭合
- E. 视功能损伤的程度

正确答案：C

17、单选 患者，女性，19岁，双眼充血、疼痛、畏光、流泪、异物感20天，检查：双眼结膜充血，滤泡增生，中央部角膜可见散布的白色斑点状浑浊（）。

- A. 沙眼
- B. 泡性结膜炎
- C. 腺病毒性结膜炎
- D. 春季卡他性结膜炎
- E. 淋球菌性结膜炎

正确答案：C

18、单选 流行性角结膜炎的分泌物为（）。

- A. 脓性
- B. 黏液性
- C. 水样
- D. 丝状
- E. 黏液脓性

正确答案：C

19、单选 以下治疗青光眼的药物中，哪一种的降压机制是使阻塞房角开放（）。

- A. 醋唑磺胺
- B. 甘露醇
- C. 噻吗心安
- D. 甘油盐水
- E. 毛果芸香碱

正确答案：E

20、单选 目前，结膜假膜最主要见于（）。

- A. 腺病毒性结膜炎
- B. 白喉杆菌性结膜炎
- C. 泡性结膜炎
- D. 春季结膜炎
- E. 单纯疱疹病毒性结膜炎

正确答案：A

21、填空题 彻底治疗慢性泪囊炎必须依靠（）治疗。

正确答案：手术

22、多选 抑制房水生成（）。

- A. 缩瞳剂
- B. β -受体阻滞剂
- C. 肾上腺素
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：B, E

23、单选 在 40 岁个体眼压超过正常的约有（）。

- A. 5%
- B. 7%
- C. 10%
- D. 15%
- E. 25%

正确答案：B

24、多选 高眼压症包括以下几点（）。

- A. 眼压高于统计学正常上限
- B. 长期随访会出现视盘和视野损害
- C. 房角开放
- D. 长期随访不会出现视盘和视野损害
- E. 房角关闭

正确答案：A, C, D

25、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最新的药（）。

- A. 拟胆碱药
- B. 缩瞳剂
- C. β 受体阻滞剂
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：D

参考解析：Marfan 综合征出现晶状体脱位可以导致晶状体源性青光眼。

26、单选 急性闭角型青光眼最主要的发病机制为（）。

- A. 眼轴短
- B. 小角膜
- C. 小梁网功能不全
- D. 房角窄
- E. 瞳孔阻滞

正确答案：E

27、多选 关于高眼压症描述正确的（）。

- A. 高眼压症主要与原发性开角型青光眼相鉴别
- B. 大部分的高眼压症发展为青光眼
- C. 大约 10%的个体发展为青光眼
- D. 高眼压症主要与原发性闭角型青光眼相鉴别
- E. 需要手术治疗

正确答案：A, C

参考解析：高眼压症主要与尚未出现视盘损害和视野缺损的早期原发性开角型青光眼相鉴别，长期随访不出现视盘和视野损害，仅有大约 10%的个体发展为青光眼。

28、多选 泡性角结膜炎属于一种微生物蛋白引起的迟发型过敏反应，常见的致病微生物包括（）。

- A. 结核杆菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 腺病毒
- D. 白色念珠菌
- E. 莫-阿双杆菌

正确答案：A, B, D

29、单选 原发性开角型青光眼晚期视野（）。

- A. 生理盲点扩大
- B. 旁中心暗点
- C. 环形暗点
- D. 管状视野
- E. 相对暗点

正确答案：D

30、单选 急性闭角型青光眼在急性发作期哪项不能作为诊断要点（）。

- A. 视力急剧下降
- B. 恶心、呕吐
- C. 眼压升高、眼球坚硬如石
- D. 混合充血、角膜水肿、瞳孔散大
- E. 眼底可见明显青光眼杯

正确答案：E

31、单选 睫状环阻塞性青光眼治疗不包括（）。

- A. 睫状肌麻痹药
- B. 高渗剂脱水剂和减少房水生成药物
- C. 晶状体玻璃体切割手术
- D. 糖皮质激素
- E. 缩瞳剂

正确答案：E

32、多选 玻璃体积血引起的并发症有（）。

- A. 视网膜毒性作用
- B. 血影细胞性青光眼
- C. 玻璃体视网膜的增殖性病变
- D. 牵拉性视网膜脱离
- E. 角膜血染

正确答案：B, C, D

33、多选 容易出现球结膜下出血的是（）。

- A. 春季结膜炎
- B. 慢性细菌性结膜炎
- C. 腺病毒性角结膜炎
- D. 沙眼
- E. 流行性出血性角结膜炎

正确答案：C, E

34、填空题 我国人眼球突出度的正常值为（），两眼相差一般不超过（）。

正确答案：12~14；2

35、单选 碱性烧伤的特点为（）。

- A. 使组织蛋白凝固
- B. 使组织坏死
- C. 能溶解脂肪和蛋白质，使细胞分解坏死
- D. 角膜上皮点状脱落
- E. 破坏内皮细胞的脂肪外膜

正确答案：C

36、单选 流行性出血性结膜炎是由（）引起的。

- A. 7 型腺病毒
- B. 70 型肠道病毒
- C. 8 型腺病毒
- D. 10 型肠道病毒
- E. 以上均可引起

正确答案：B

参考解析：流行性出血性结膜炎是由 70 型肠道病毒引起的。

37、单选 包涵体性结膜炎潜伏期（）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周
- E. 10~12 周

正确答案：A

38、单选 正常人大约多少的房水经葡萄膜巩膜途径外流（）。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%
- E. 25%

正确答案：D

39、单选 眼压调节主要的因素是（）。

- A. 晶状体
- B. 玻璃体
- C. 房水
- D. 血容量
- E. 血渗透压

正确答案：C

40、单选 虹膜睫状体炎继发青光眼的治疗不正确的是（）。

- A. 激素
- B. 散瞳孔
- C. 抑制房水生成
- D. 缩瞳剂
- E. β -受体阻滞剂

正确答案：D

参考解析：虹膜睫状体炎继发青光眼的治疗包括激素、散瞳、抑制房水生成、 β -受体阻滞剂。缩瞳剂可能加重虹膜睫状体炎，不能使用。

41、单选 青光眼黄斑功能改变除外（）。

- A. 获得性色觉障碍
- B. 图形视网膜电图改变
- C. 视诱发电位改变
- D. 眼电图改变
- E. 视觉对比敏感度改变

正确答案：D

42、单选 高眼压症经过长期随访，可能发展为青光眼的比例约（）。

- A. 5%
- B. 7%
- C. 10%
- D. 15%
- E. 25%

正确答案： C

43、单选 下列属于恶性肿瘤的是（ ）。

- A. 结膜色素痣
- B. 结膜鳞状细胞癌
- C. 结膜乳头状瘤
- D. 结膜皮样瘤
- E. 以上均是

正确答案： B

44、单选 正常双眼眼压差异（ ）。

- A. 10~21mmHg
- B. ≤ 5 mmHg
- C. ≤ 8 mmHg
- D. > 5 mmHg
- E. > 8 mmHg

正确答案： B

45、多选 慢性细菌性结膜炎发病原因包括（ ）。

- A. 急性结膜炎治疗不当
- B. 毒力不强的细菌感染
- C. 不良环境刺激
- D. 慢性泪囊炎
- E. 慢性鼻炎

正确答案： A, B, C, D, E

46、多选 增加葡萄膜巩膜通道房水外流（ ）。

- A. 缩瞳剂
- B. β -受体阻滞剂
- C. 肾上腺素
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案： A, C, D

47、单选 巨大乳头是指结膜乳头直径大于（ ）。

- A. 0.5mm
- B. 1mm
- C. 2mm

D. 2.5mm

E. 3mm

正确答案：B

参考解析：>0.3mm 为大乳头，>1mm 为巨大乳头。

48、单选 急性前葡萄膜炎的治疗最好首选（）。

A. 1%阿托品眼膏

B. 2%后马托品眼膏

C. 5%去氧肾上腺素

D. 0.1%肾上腺素

E. 1%阿托品眼药水

正确答案：B

49、单选 建立房水外流通道的术（）。

A. 周边虹膜切除术

B. 睫状体光凝术

C. 小梁切开术

D. 睫状体冷凝术

E. 小梁切除术

正确答案：E

50、单选 青光眼滤过手术后两年失败率是多少（）。

A. 小于 5%

B. 5%~15%

C. 15%~25%

D. 25%~35%

E. 大于 35%

正确答案：C

51、多选 急性沙眼感染的临床表现包括（）。

A. 学龄前儿童，起病迅速

B. 轻度异物感、烧灼感、视物疲劳症状

C. 较多黏液或黏液脓性分泌物

D. 结膜明显充血

E. 上睑结膜少许滤泡增生

正确答案：C, D

参考解析：急性沙眼感染的临床表现包括：学前和低年学龄儿童缓慢起病，畏光、流泪、异物感，较多黏液或黏液脓性分泌物，眼睑红肿，结膜明显充血，乳头增生，上下穹隆布满滤泡，可合并角膜上皮炎及耳前淋巴结肿大。

52、单选 超急性细菌性结膜炎发病在（）。

A. 12 小时内

B. 24 小时内

- C. 3 天内
- D. 7 天内
- E. 14 天内

正确答案：B

53、单选 眼局部长期应用皮质类固醇，可引起的副作用是（）。

- A. 结膜炎
- B. 点状角膜炎
- C. 视神经炎
- D. 角膜溃疡
- E. 青光眼

正确答案：E

54、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最广泛的药（）。

- A. 拟胆碱药
- B. 缩瞳剂
- C. β 受体阻滞剂
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：C

参考解析：Marfan 综合征出现晶状体脱位可以导致晶状体源性青光眼。

55、多选 春季角结膜炎患者可选用的药物（）。

- A. 色甘酸钠
- B. 埃美丁
- C. 典必殊
- D. 氧氟沙星
- E. 0.05%FK-506

正确答案：A, B, C, E

参考解析：春季角结膜炎可应用血管收缩剂、抗组胺药、细胞膜稳定剂、糖皮质激素及免疫抑制剂。

56、单选 春季卡他性结膜炎的细胞学检查有哪些改变（）。

- A. 单核细胞增多
- B. 多形核白细胞增多
- C. 嗜酸性粒细胞增多
- D. 细胞质内有包涵体
- E. 中性粒细胞增多

正确答案：C

参考解析：春季卡他性结膜炎的细胞学检查可见嗜酸性粒细胞增多。

57、单选 患者男性，52岁，右眼傍晚出现雾视2个月。检查：右眼视力1.0，右眼周边前房1/3CT，房角功能性小梁开放2/3圆周，右眼底视神经乳头和视野正常。最恰当的手术方式（）。

- A. 周边虹膜切除术
- B. 节段性虹膜切除术
- C. 小梁切除术
- D. 非穿透滤过手术
- E. 小梁切开术

正确答案：A

参考解析：急性闭角型青光眼先兆期手术方式为周边虹膜切除术。

58、单选 高眼压症在测量眼压时充分注意测量误差，眼压测量时的主要误差因素（）。

- A. 患者的配合
- B. 中央角膜厚度
- C. 测量的方法
- D. 巩膜的厚度
- E. 眼球内容物的多少

正确答案：B

59、多选 沙眼和包涵体性结膜炎敏感的有效治疗药物包括（）。

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 四环素
- D. 利福平
- E. 氧氟沙星

正确答案：A, C, D

60、多选 增加小梁网通道房水外流（）。

- A. 缩瞳剂
- B. β -受体阻滞剂
- C. 肾上腺素
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：A, C

参考解析：增加小梁网通道房水外流肾上腺素和缩瞳剂，缩瞳剂能直接兴奋虹膜括约肌，缩小瞳孔和增加虹膜张力，解除周边虹膜对小梁网的堵塞。

61、单选 关于 β 受体激动剂，错误的是（）。

- A. 地匹福林属于 β 受体激动剂
- B. 兴奋 β_1 受体
- C. 既降低小梁网房水流出阻力，又增加葡萄膜-巩膜途径房水引流

- D. 禁用于闭角型青光眼
- E. 血管收缩和散瞳均为其主要不良反应

正确答案：B

参考解析：β受体激动剂兴奋β₂受体。

62、单选 细菌性角膜溃疡中最严重的致病菌是（）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 流感嗜血杆菌

正确答案：D

63、多选 一般可以选择治疗哪些具有危险因素的高眼压症病人（）。

- A. 眼压超过 30mmHg
- B. 阳性青光眼家族史
- C. 高度近视
- D. 具有心血管疾病
- E. 具有糖尿病

正确答案：A, B, C, D, E

参考解析：一般可以选择治疗那些具有危险因素的高眼压症病人，如眼压超过 30mmHg、阳性青光眼家族史、高度近视、具有心血管疾病、具有糖尿病。

64、单选 患者，女性，18 岁。有轻微异物感，右眼鼻侧可见隆起红色小病灶，约 3mm，周围有充血区。最可能诊断为（）。

- A. 沙眼
- B. 泡性结膜炎
- C. 腺病毒性结膜炎
- D. 春季卡他性结膜炎
- E. 淋球菌性结膜炎

正确答案：B

65、填空题 动脉硬化分为（）硬化、（）硬化以及（）硬化 3 种。

正确答案：动脉粥样；老年性纤维性；高血压增殖性

66、单选 眼压升高同时出现羊脂状角膜后沉着物常见于（）。

- A. Marfan 综合征
- B. 溶血性青光征
- C. 青光眼睫状体炎综合征
- D. 广泛视网膜缺血所致青光眼
- E. 虹膜角膜内皮综合征

正确答案：C

67、单选 新生血管性青光眼（）。

- A. Marfan 综合征
- B. 溶血性青光征

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657112022165006110>