妇产科护理考试题与答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、患者女，妊娠 35 周，B 超检查诊断为羊水过多。羊水过多的并发症哪项应除外

A、易并发妊娠期高血压疾病

B、破膜后羊水快速外流，可致胎盘早剥

C、宫缩乏力

D、易导致子宫破裂

E、易导致产后出血

正确答案：D

2、初孕妇,37 岁,妊娠 35 周,诊断为妊娠期高血压疾病(子痫前期重度),枕左前位,胎心 140 次/分,骨盆外测量正常。本例恰当处理应是( )

A、积极治疗 24-48 小时病情无好转,应终止妊娠

B、立即行剖宫产术

C、积极治疗一周后病情无好转,应终止妊娠

D、立即引产

E、积极治疗,等待产程自然发动

正确答案：A

3、24 岁已婚妇女，停经 6 周，尿妊娠试验阳性，因高热一周，曾服多种药物，要求人流。人流时出现恶心呕吐、出汗，面色苍白。查体：血压 80/60mmHg，心率 46 次/分。本例正确处理应是（ ）

A、静脉注射阿托品

B、肌注肾上腺素

C、终止手术，待病情好转再进行

D、静脉滴注间羟胺

E、立即输液并输血

正确答案：A

4、某女士，妊娠 30 周，前来医院行产前检查，医生叮嘱其注意胎动，如胎动减少要及时来医院。胎动减少是指胎动 12 小时少于

A、20

B、5 次

C、3 次

D、15 次

E、10 次

正确答案：E

5、患者女、27 岁、孕 1 产 0，人工流产术后 3 个月，出现不规则阴道流血。检查 HCG 异常增高，B 超检查可见子宫肌壁有不均匀密集光点或暗区蜂窝状。患者最可能是

A、葡萄胎

B、异位妊娠

C、吸宫不全

D、侵袭性葡萄胎

E、绒毛膜癌

正确答案：E

6、过期妊娠不会出现下述哪种情况

A、胎儿窘迫

B、羊水量减少

C、胎死宫内

D、胎盘老化

E、羊水量过多

正确答案：E

7、某女士,孕 2 产 0,妊娠 31 周。主诉自感胎动过频,于翌日凌晨急诊入院。护士告诉其正常胎动为

A、3-5 次/小时

B、12-16 次小时

C、5-8 次/小时

D、1-3 次/小时

E、8-12 次/小时

正确答案：A

8、葡萄胎清宫术后要求定期随访，随访的时间是

A、3 年

B、2 年

C、6 个月

D、5 年

E、1 年

正确答案：E

9、某孕妇，26 岁。停经 6 个月，因小腿水肿半月就诊，查体：体温 36.9℃，血压 154/97mmHg,脉搏 90 次/min。该病的治疗原则不正确的是

A、镇静
B、降压
C、适时终止妊娠
D、解痉
E、无论何种情况都要保胎到足月
正确答案：E
10、患者女 33 岁初次妊娠，妊娠 18 周出现心慌气短，心功能二级。经过加强产前检查，严密监测，妊娠期经过等处理，目前妊娠 37 周自然临产。该产妇的体位最好是
A、半卧位
B、头低足高位
C、右侧卧位
D、左侧卧位
E、平卧位
正确答案：A
11、24 岁已婚妇女，停经 6 周，尿妊娠试验阳性，因高热一周，曾服多种药物，要求人流。人流时出现恶心呕吐、出汗，面色苍白。查体：血压 80/60mmHg，心率 46 次/分。本例最可能的诊断应是（ ）
A、Turner 综合征
B、宫腔粘连综合征
C、多囊卵巢综合征
D、人工流产综合反应
E、希恩综合征
正确答案：D
12、″患者女性，30 岁。已婚，生育史:1-0-1-1，宫内节育器避孕，因″停经 45 天，阴道少量流血 1 日伴下腹隐痛 8 小时″就诊。体检:神智清，心肺(一)，生命体征正常，尿妊娠试验弱阳性。若确定是宫内妊娠，最合适的处理措施是（ ）″
A、取环后行人工流产
B、黄体酮保胎治疗
C、药物流产
D、水囊引产术
E、取环后继续保胎治疗
正确答案：A

13、患者女，45 岁。行宫颈癌根治手术后第 10 日。护士在拔导尿管前开始夹闭导尿管，定期开放，以训练膀胱功能。开放导尿管的时间为

A、每 6 小时 1 次

B、每 4 小时 1 次

C、每 2 小时 1 次

D、每 5 小时 1 次

E、每 3 小时 1 次

正确答案：C

14、某健康妇女，进行查体，其骨盆型态各径线均属于正常人的平均值。其中骨盆平面前后径为（ ）

A、13cm

B、11cm

C、12.5cm

D、11.5cm

E、12cm

正确答案：D

15、患者女,29 岁,妊娠 31 周。因少量阴道出血 2 小时就诊,诊断为中央性前置胎盘,目前行期待疗法治疗,下述护理措施哪一项错误

A、指导孕妇胎动计数

B、做好心理护理,陪孕妇散步

C、监测胎心

D、加强会阴护理,预防感染

E、观察阴道出血情况

正确答案：B

16、预防本病发生最有意义的项目是（ ）

A、妊娠期间避免长时间仰卧和腹部外伤

B、加强定期的产前检查

C、避免宫腔内压力骤然降低

D、避免多次刮宫、多产及产褥感染

E、积极防治妊娠期高血压疾病

正确答案：D

17、对该患者错误的护理措施是（ ）

A、保持外阴清洁，每日会阴擦洗 2 次

B、卧床休息，左侧卧位

C、遵医嘱使用宫缩抑制剂、镇静剂等
D、持续吸氧，加强胎儿的供氧
E、监测胎心、胎动，了解胎儿有无缺氧
正确答案：D
18、患者女，26 岁，患风湿性心脏病，前来咨询是否可以妊娠。护士应告诉她做决定的依据主要是心功能分级。下述哪种情况可妊娠
A、心功能三级
B、心功能六级
C、心功能二级
D、风湿热活动者
E、既往有
正确答案：C
19、患者,女性,已婚,27 岁。停经 50 日,阴道少量流血 1 日。今晨 5 时无原因出现下腹剧痛,伴恶心呕吐及一过性晕厥。查面色苍白,血压 70/40mmHg,脉搏 120 次/分,妇科检查:宫颈举痛明显,后穹隆触痛(+),盆腔触诊不满意。该患者初步考虑哪项诊断( )
A、异位妊娠
B、葡萄胎
C、难免流产
D、完全流产
E、先兆流产
正确答案：A
20、某女士, 24 岁,妊娠 35 周,诊断为子痫前期(重度),在用药治疗 24 小时后,孕妇突然感到腹部持续性疼痛,伴有少量阴道出血。立即检查:血压 110/60mmHg,子宫板状硬,考虑最可能并发了
A、先兆早产
B、胎盘早剥
C、先兆流产
D、先兆临产
E、临产
正确答案：B
21、患者女 29 岁，宫内妊娠 38 周，妊娠合并心脏病，心功能二级自然临产。关于分娩期护理措施，下列叙述正确的是
A、如产后子宫收缩乏力，可注射麦角新碱

B、尽量避免阴道助产，以免疼痛加重心脏负担
C、第二产程阴道助产以缩短产程
D、遵医嘱使用强心药物，预防心力衰竭
E、分娩过程中尽量避免使用抗生素
正确答案：C
22、某孕妇，妊娠 32 周，因子痫前期重度入院治疗，4 小时后出现持续性腹痛，阴道无流血。查体：面色苍白，血压 80/50mmHg，子宫大于妊娠周数，硬如板状，有压痛，胎心、胎动消失。该孕妇最可能的诊断是（ ）
A、前置胎盘
B、胎盘早剥
C、先兆子宫破裂
D、先兆早产
E、妊娠合并急性阑尾炎
正确答案：B
23、患者女，28 岁，妊娠合并风湿性心脏病产后，心功能 IV 级。护士应建议其
A、哺乳期结束做绝育术
B、产褥期使用避孕套避孕
C、产后 24 小时做绝育术
D、产后 1 周做绝育术
E、哺乳期结束采用避孕套避孕
正确答案：D
24、某初产妇 36 岁。自然分娩产程延长，手取胎盘。出院时，责任护士告知其预防产褥感染的措施。错误的内容是
A、注意卫生.
B、禁止盆浴
C、防止感冒
D、不能外出
E、加强营养
正确答案：D
25、28 岁绒毛膜癌患者，下列解释错误的是（ ）
A、凡葡萄胎、产后或流产后出现不规则阴道出血应警惕本病的发生
B、化学治疗效果一般不好
C、产后或流产后 hCG 阳性，阴道又有转移结节应高度注意绒毛膜癌

D、脑转移一般继发于肺转移之后
E、如能早期诊断及时治疗预后较好
正确答案：B
26、患者女，25 岁。子宫内膜异位症患者，咨询目前既能诊断又能治疗该疾病的最佳方法，护士应回答
A、分段诊断性刮宫
B、盆腔 X 线摄片
C、双合诊检查
D、腹腔镜检查
E、阴道 B 超
正确答案：D
27、某葡萄胎患者，46 岁。妇科检查子宫小于妊娠 14 周大小。处理的方法是
A、先行止血治疗
B、直接化疗
C、直接切除子宫
D、切除附件
E、清宫后放疗
正确答案：C
28、某女士，26 岁，妊娠 24 周。来医院产前检查,进行了骨盆外测量。骶耻外径反映的是
A、骨盆入口横径
B、出口平面前后径
C、中骨盆平面横径
D、中骨盆平面前后径
E、骨盆入口平面前后径
正确答案：E
29、患者女，44 岁。因子宫肌瘤入院。护士在评估健康史时，应重点追溯的内容是
A、饮食习惯
B、是否长期使用雌激素
C、肿瘤家族史
D、是否有早婚早育史
E、高血压家族史

正确答案：B

30、某产妇，27 岁，妊娠 39 周，今晨自娩一男婴，胎盘娩出 30 分钟后，阴道出现多量流血。1 小时后产妇出现心慌、气短，查体：P 112 次/分，BP80/50mmHg。面色苍白，子宫软，轮廓不清，阴道有多量血凝块。该产妇最不可能出现的护理问

A、有受伤的危险

B、潜在并发症:心力衰竭

C、组织灌注量不足

D、活动无耐力

E、有感染的危险

正确答案：B

31、某 26 岁产妇，两日前经阴道分娩，一女婴。今日查房发现其乳头皲裂。为减轻母乳喂养时的不适。正确的护理措施是

A、哺乳前用毛巾和肥皂水，清洁乳头和乳晕

B、为减轻疼痛应减少喂哺的次数

C、哺乳时让婴儿含吮乳头即可

D、先在损伤较重的一侧乳房哺乳

E、喂哺后挤出少许乳汁涂在乳头和乳晕上

正确答案：E

32、某女士，29 岁，孕 1 产 0。现停经 38 周，阴道不自主流液 5 小时，疑为胎膜早破,破膜超过 12 小时仍未分娩，应遵医嘱用哪种药物

A、诺氟沙星

B、缩宫素

C、麦角新碱

D、青霉素类抗生素

E、维生素 K

正确答案：D

33、常规行人工破膜术时,见有“血性羊水”,应首先考虑可能是

A、凝血障碍

B、前置胎盘

C、误伤胎盘

D、宫内感染

E、胎盘早剥

正确答案：E

34、某产妇，29 岁。足月临产 17 小时人院，腹部见病理性缩复环。下述哪种情况最可能发生

A、宫缩乏力

B、软产道异常

C、头盆不称

D、胎儿畸形

E、臀位

正确答案：C

35、患者,女性,25 岁。停经 45 天,阴道少量流血 2 天,伴下腹部轻度酸痛,尿妊娠试验(+),妇科检查:宫口闭,子宫 6 周妊娠大小。该患者考虑哪项诊断( )

A、难免流产

B、完全流产

C、先兆流产

D、不全流产

E、稽留流产

正确答案：C

36、患者女，27 岁。停经 9 周,妊娠试验(+),曾经发生过 3 次自然流产,均在妊娠 3 个月时,目前无出血及腹痛。下列哪项护理措施是正确的

A、预防性口服硫酸沙丁胺醇(舒喘灵)

B、有宫缩时卧床休息

C、宫颈内口缝扎术

D、有出血情况时再处理

E、绝对卧床休息

正确答案：E

37、患者,女性,25 岁。停经 45 天,阴道少量流血 2 天,伴下腹部轻度酸痛,尿妊娠试验(+),妇科检查:宫口闭,子宫 6 周妊娠大小。对确诊最有价值的检查项目应是( )

A、黄体酮试验

B、诊断性刮宫

C、测量基础体温

D、尿妊娠试验

E、B 型超声检查

正确答案：E

38、孕妇，妊娠 33 周，无诱因阴道出血约 150ml，腹部检查：腹软，无压痛，胎位清楚，胎心 148 次 / 分，阴道可见少量血液。本例目前的处理应是（ ）

A、催产素引产

B、期待疗法

C、口服止血药物

D、人工破膜

E、行剖宫产术

正确答案：C

39、某产妇,妊娠 38 周,规律宫缩 2 小时入院。新生儿出生后,经检查心率每分钟 98 次,呼吸浅慢不规则,全身皮肤青紫,吸痰器清理呼吸道时喉部有轻微反射,四肢肌张力稍有抵抗,该新生儿 Apgar 评分应为( )

A、6 分

B、7 分

C、5 分

D、3 分

E、0 分

正确答案：C

40、患者女，33 岁，妊娠 34 周，妊娠合并糖尿病。关于其妊娠期护理，下述哪项错误

A、胰岛素控制血糖

B、给予抗生素预防感染

C、必要时终止妊娠

D、饮食控制

E、加强产前检查

正确答案：B

41、患者女，35 岁，已婚。主诉近日白带增多，外阴瘙痒伴灼痛 1 周。妇科检查：阴道内多量灰白泡沫状分泌物，阴道壁散在红斑点。该患者初步考虑为（ ）

A、外阴瘙痒症

B、萎缩性阴道炎

C、滴虫性阴道炎

D、外阴阴道假丝酵母菌病

E、细菌性阴道病

正确答案：C

42、某女士，妊娠 27 周复查时，发现血红蛋白 90g/L。行高危因素评估后正确的措施是

A、进行骨盆胎心测量

B、嘱 12 小时胎动计数

C、建立孕期保健手册

D、进行唐氏综合症筛查

E、列入高危专案管理

正确答案：E

43、患者女，30 岁，分娩后 12 日发生阴道大量出血入院，护士对患者进行健康评估时，与病情最不相关的是

A、了解患者的孕产史

B、母乳喂养情况

C、评估患者阴道出血量

D、了解子宫复旧情况及有无压痛。

E、评估患者的生命体征，神志情况

正确答案：B

44、患者女,29 岁,妊娠 31 周。因少量阴道出血 2 小时就诊,诊断为中央性前置胎盘,如该孕妇在期待疗法过程中出现大量阴道出血，下述护理措施哪项不正确

A、做好剖宫产术前准备

B、送入产房准备接生

C、建立静脉通路,输液,必要时输血

D、做好新生儿抢救准备

E、吸氧

正确答案：B

45、下列关于早产叙述错误的是

A、遵医嘱给予镇静药

B、避免刺激宫缩的活动

C、分娩前 2-3 天连续给予糖皮质激素

D、绝对卧床休息

E、早产儿较小,分娩时不能行会阴切开术

正确答案：E

46、患者女，35 岁。5 日前于游泳池游泳后出现白带增多及外阴瘙痒，

医生诊断为滴虫阴道炎。护士告知患者滴虫阴道炎白带的典型特征是

A、稀薄泡沫状

B、烂鱼腥臭味

C、豆渣样

D、均匀一致稀薄

E、黄色水样

正确答案：A

47、患者女，65 岁。因宫颈癌晚期需行子宫动脉栓塞化疗。术后护士应协助医生对穿刺点

A、加压包扎 2 小时

B、加压包扎 4 小时

C、加压包扎 24 小时

D、加压包扎 6 小时

E、加压包扎 8 小时

正确答案：C

48、患者女，30 岁。系绒毛膜癌患者，住院进行化疗，为了配合治疗，家属咨询护士给患者吃哪种食物。护士指导的饮食为

A、进食低脂防、高维生素，易消化的饮食

B、进食高蛋白，高维生素，易消化的饮食

C、进食低蛋白，高维生素、易消化的饮食

D、进食高热量、高维生素，一般饮食

E、进食高蛋白、低维生素、易消化的饮食

正确答案：B

49、某孕妇,末次月经不详,第一次来医院产前检查,发现子宫底位于脐与剑突之间。该孕妇咨询护士,妊娠足月孕妇的体重平均增加多少,回答正确的是( )

A、10.5kg

B、8.5kg

C、12.5kg

D、14.5kg

E、16.5kg

正确答案：C

50、某孕妇诊断为妊娠合并心脏病，妊娘 34 周出现胎儿窘迫入院。其胎儿窘迫的原因可能为

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658056076055006033