

2024 年河北省《执业药师之西药学专业二》 资格考试通关秘籍题库附答案（模拟题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（ ）

- A: 甲氧氯普胺
- B: 奥美拉唑
- C: 颠茄
- D: 多潘立酮

答案：B

2. 下列描述正确的是（ ）

- A: 根据病变部位不同选择不同浓度和强度的药物
- B: 手掌损害应选择低效的制剂
- C: 外用药经皮吸收后不会产生不良反应
- D: 有刺激性的药物应从高浓度开始逐渐递减

答案：A

3. 起效缓慢，可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是（ ）

- A: 瑞格列奈
- B: 艾塞那肽
- C: 罗格列酮
- D: 利拉鲁肽

答案：C

4. (2019 年真题) 患者首次使用西妥昔单抗，为减轻其不良反应，常规预处理使用的药物是 ()

- A: 抗组胺类药物
- B: 质子泵抑制剂
- C: 化疗止吐类药物
- D: 维生素类药物

答案：A

5. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 埃索美拉唑钠
- C: 替米沙坦
- D: 美托洛尔

答案：A

6. (2017 年真题) 维 A 酸软膏治疗痤疮时,合理的用法是 ()

- A: 一日一次,睡前使用
- B: 一日二次,早晚使用

C: 一日一次, 固定时间使用

D: 一日一次, 晨起使用

答案: A

7. (2018 年真题) 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

B: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药

C: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

答案: C

8. 可用于烧伤及伤后感染的是

A: 磺胺甲

B: 磺胺米隆

C: 磺胺嘧啶

D: 柳氮磺吡啶

答案: B

9. 重症甲状腺功能亢进症病情未控制者不宜使用

A: 小剂量碘制剂

B: None

C: 甲状腺素

D: 大剂量碘制剂

答案: B

10. 近期末用过唑类抗真菌药且临床情况稳定的念珠菌(光滑和克柔念珠菌除外)感染，首选()治疗

- A: 氟胞嘧啶
- B: 氟康唑
- C: 伏立康唑
- D: 卡泊芬净

答案：B

11. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 西格列汀
- C: 二甲双胍
- D: 罗格列酮

答案：D

12. 甲氧苄啶联用甲氨蝶呤使

- A: 肾毒性增加
- B: 白细胞减少风险增加
- C: 半衰期缩短
- D: 抗凝作用增强

答案：B

13. (2021 年真题) 属于短效避孕药，但其埋植剂可作为长效避孕药使用的药物是()

- A: 孕二烯酮
- B: 左炔诺孕酮
- C: 氯地孕酮
- D: 去氧孕烯

答案：B

14. 长期合用下列哪个药物能使口服避孕药的主要成分炔诺酮和炔雌醇的代谢加快，血液中的药物浓度降低而导致避孕失败()

- A: 利福平
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 四环素
- D: 氨苄西林

答案：A

15. 长期大量服用维生素 K

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- D: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大

答案：D

16. 抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 谷丙胺
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 法莫替丁

答案：A

17. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是

- A: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫
- B: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

C: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及杀虫的作用

D: 克罗米通具有局部麻醉作用

答案: B

18. 维 A 酸类药物不能用于下述哪种疾病()

A: 银屑病

B: 扁平疣

C: 光敏性皮肤病

D: 角化性皮肤病

答案: C

19. 有明显的镇痛作用，可用于肿瘤骨转移所致的高钙血症和痛性骨质疏松症治疗的药物是

A: 降钙素

B: 骨化三醇

C: 雷洛昔芬

D: 阿仑膦酸钠

答案: A

20. 奥昔布宁、托特罗定与索利那新的代谢酶是

A: CYP3A5

B: CYP3A7

C: CYP3A4

D: CYP2C9

答案: C

21. 洋地黄中毒时的信号为

A: 胃肠道症状

- B: 色觉障碍
- C: 定向力丧失
- D: 眩晕

答案：A

22. 新生儿出血宜选用

- A: 维生素 B12
- B: 肝素
- C: 香豆素类
- D: 维生素 K1

答案：D

23. 关于复方氢氧化镁的叙述，下列哪项是正确的

- A: 中和胃酸作用强而迅速
- B: 对溃疡面有保护作用
- C: 口服易吸收
- D: 不影响排便

答案：A

24. 与可待因合用，不仅加重便秘，还可增加麻痹性肠梗阻和尿潴留危险的是

- A: 阿托品
- B: 美沙酮
- C: 硫酸镁
- D: 哌替啶

答案：A

25. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 修复消化道黏膜
- B: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- C: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动
- D: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能

答案：C

26. 阿米卡星与万古霉素合用()

- A: 药理作用拮抗
- B: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- C: 不良反应叠加
- D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：C

27. 对抗香豆素过量引起的出血可选用()

- A: 维生素
- B: 维生素 K
- C: 鱼精蛋白
- D: 垂体后叶素

答案：B

28. 叶酸可用于巨幼细胞贫血治疗时，为改善神经症状，应同时并服

- A: 维生素 B12
- B: 烟酸

C: 叶酸

D: 维生素 B6

答案: A

29. 高血压伴甲状腺功能亢进者宜选用

A: 普萘洛尔

B: 利血平

C: 硝苯地平

D: 尼莫地平

答案: A

30. 辅助治疗不孕症的维生素是

A: 维生素 E

B: 维生素 B6

C: 烟酸

D: 维生素 B2

答案: A

31. 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

A: 长春新碱

B: 曲妥珠单抗

C: 甲氨蝶呤

D: 环磷酰胺

答案: A

32. 关于达比加群酯的描述，错误的是

A: 为直接凝血酶的抑制剂

- B: 用药期间应监测凝血功能、肝功能
- C: 长期口服安全性较好
- D: 与阿司匹林联用不会增加出血风险

答案：D

33. 可与阿司匹林发生相互作用的是

- A: 伐地那非
- B: 丙酸睾酮
- C: 坎利酮
- D: 呋塞米

答案：C

34. 阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

- A: 非那雄胺
- B: 依立雄胺
- C: 度他雄胺
- D: 普适泰

答案：D

35. 对胰岛素产生耐受者选用

- A: 二甲双胍
- B: 胰岛素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 格列本脲

答案：D

36. 毒性较大，尤其对第Ⅷ对脑神经和肾损害严重的药物是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 卡那霉素

答案：D

37. 属于钙通道阻滞剂，静脉注射用于终止阵发性室上性心动过速的是（）

- A: 利多卡因
- B: 普鲁卡因胺
- C: 维拉帕米
- D: 苯妥英钠

答案：C

38. 用于治疗射血分数低的慢性心力衰竭

- A: 沙库巴曲缬沙坦
- B: 阿利吉仑
- C: 阿托品
- D: 胺碘酮

答案：A

39. 对磺胺类药物有严重过敏史的患者可选择的利尿剂是（）

- A: 托拉塞米
- B: 依他尼酸
- C: 布美他尼
- D: 呋塞米

答案：B

40. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是

- A: 便秘
- B: 胆绞痛
- C: 低血压
- D: 躁狂

答案：C

41. 专供糖尿病患者使用的肠内全营养制剂的是

- A: 视黄醇
- B: 视黄酸
- C: TP
- D: TPF-D

答案：D

42. 注射用二磷酸果糖 5~10g 稀释于 5%~10%葡萄糖注射液 100ml 中，滴速应控制在

- A: 10~40mg / min
- B: 60~100mg / min
- C: 100~300mg / min
- D: 400~1000mg / min

答案：D

43. 具有负性肌力、负性频率、负性传导作用的药物是

- A: 卡托普利
- B: 硝酸甘油
- C: 维拉帕米
- D: 哌唑嗪

答案：C

44. 以肠内营养乳剂（TPF-D）作为唯一营养来源的患者，推荐剂量为一日

A: 10ml/kg

B: 20ml/kg

C: 30ml/kg

D: 40ml/kg

答案：C

45. 强心苷中毒引起的室性心律失常首选

A: 利多卡因

B: 普萘洛尔

C: 苯妥英钠

D: 胺碘酮

答案：C

46. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是

A: 呋塞米

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 氨苯蝶啶

答案：D

47. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

A: 西沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案：A

48. 可产生严重的低血压、皮疹、高钾血症的肾素抑制剂是()

- A: 利血平
- B: 哌唑嗪
- C: 甲基多巴
- D: 阿利克仑

答案：D

49. 乙酰半胱氨酸的祛痰作用机制是

- A: 增强呼吸道纤毛运动，促使痰液排出
- B: 直接分解痰中的黏蛋白，降低痰的黏性，易咳出
- C: 使痰量逐渐减少，产生化痰作用
- D: 恶心性祛痰作用

答案：B

50. 对四环素不敏感的病原体是()

- A: 螺旋体
- B: 肺炎衣原体
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 肺炎支原体

答案：C

51. 阿托品在使用中应注意

- A: 对食管有刺激性，需整片吞服
- B: 糖尿病患者避免使用
- C: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用
- D: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

答案：C

52. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

- A: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药
- B: 酮康唑为咪唑类抗真菌药
- C: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药
- D: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

答案：A

53. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

答案：D

54. 属于短效苯二氮类的药物是

- A: 三唑仑
- B: 劳拉西泮地收育
- C: 艾司唑仑
- D: 替马西泮

答案：A

55. 患者，男，57岁，身高175cm，体重87kg，诊断为2型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 随餐服用
- B: 餐后2小时
- C: 餐后半小时

D: 餐前半小时

答案: A

56. 常引起体位性低血压的是

A: 十一酸睾酮

B: 普适泰

C: 哌唑嗪

D: 非那雄胺

答案: C

57. 主要抑制排卵的长效口服避孕药是

A: 庚酸炔诺酮

B: 苯丙酸诺龙

C: 丙酸睾丸素

D: 炔诺酮

答案: A

58. 以下关于非磺酰脲类促胰岛素分泌药使用的叙述，错误的是

A: 常见不良反应是低血糖和体重增加

B: 对磺酰脲类敏感性差或效果不佳者可换此类药物，也可与磺酰脲类联合应用

C: 可以作为初始治疗，用于不能耐受二甲双胍或磺酰脲类药物或存在使用这些药物的禁忌证患者，尤其是有低血糖风险的慢性肾脏病患者

D: 瑞格列奈无肾脏功能不全者使用的禁忌，在体内无蓄积，适用于老年和糖尿病肾病者

答案: B

59. (2016 年真题) 鼻减充血药所致的典型不良反应是

- A: 共济失调
- B: 心率减慢
- C: 血压升高
- D: 血管舒张

答案：C

60. 危重哮喘患者治疗时，剂量过高可引起严重低钾血症的药物是

- A: 孟鲁司特
- B: 吸入性糖皮质激素
- C: 沙丁胺醇
- D: 噻托溴铵

答案：C

61. 属于阴道杀精药的是

- A: 氯地孕酮
- B: 米非司酮
- C: 壬苯醇醚
- D: 左炔诺孕酮

答案：C

62. 前列腺素类似物的降眼压机制是

- A: 浓缩玻璃体
- B: 增加巩膜葡萄膜通路房水外流
- C: 减少房水生成
- D: 开放小梁网

答案：B

63. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 普伐他汀
- C: 依诺肝素
- D: 拉西地平

答案：C

64. 以下关于 5 型磷酸二酯酶抑制剂的描述，正确的是

- A: 代谢产物不具有活性
- B: 主要经过肾脏代谢
- C: 口服吸收迅速
- D: 口服后生物利用度较高

答案：C

65. 属于 5-HT₂ 受体阻断剂的止吐药是()。

- A: 阿瑞吡坦
- B: 甲氧氯普胺
- C: 托烷司琼
- D: 维生素 B

答案：C

66. 下列属于非选择性 β 受体阻断药的是()

- A: 阿替洛尔
- B: 普萘洛尔
- C: 美托洛尔
- D: 比索洛尔

答案：B

67. 引起睫状肌麻痹，适用于治疗虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查的药物是

- A: 奥布卡因
- B: 阿托品
- C: 20%甘露醇
- D: 碘苷

答案：B

68. 哮喘急性发作首选的药物是

- A: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 孟鲁司特片
- D: 羧甲司坦口服液

答案：B

69. 使用多塞平治疗无效时可换用的抗抑郁药是

- A: 阿米替林
- B: 丙米嗪
- C: 吗氯贝胺
- D: 氯米帕明

答案：C

70. 下列抗心律失常的药物中，有较明显肝代谢首关效应的是

- A: 奎尼丁
- B: 胺碘酮
- C: 普罗帕酮
- D: 普鲁卡因胺

答案：C

71. (2016 年真题) 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

- A: 异戊巴比妥
- B: 阿普唑仑
- C: 地西洋
- D: 佐匹克隆

答案：A

72. 下列关于胺碘酮的叙述错误的是

- A: 可以用于窦房传导阻滞
- B: 对室上性和室性心律失常均有效
- C: 适用于合并器质性心脏病的心率失常
- D: 促心率失常反应少

答案：A

73. (2019 年真题) 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是 ()

- A: 低蛋白血症
- B: 糖尿病
- C: 癫痫
- D: 重症肌无力

答案：D

74. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 胰岛素皮下注射
- B: 艾塞那肽
- C: 二甲双胍
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：D

75. (2020 年真题) 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

- A: 预防癌症复发
- B: 预防过敏反应
- C: 预防出血过多
- D: 预防粒细胞缺乏

答案：D

76. 关于莫西沙星作用特点的说法，错误的是()

- A: 莫西沙星组织分布广泛，但不能透过血脑屏障
- B: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物
- C: 莫西沙星抗菌谱广，对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性
- D: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗

答案：A

77. 关于氟喹诺酮类药物的说法不正确的是

- A: 与其他药物有交叉耐药性
- B: 抗菌谱广，抗菌力强
- C: 不良反应少
- D: 口服吸收好，组织药物浓度高

答案：A

78. 属于人体必需、人体不能合成或合成速度不能满足人体需要

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 复方氨基酸(18AA)

C: 赖氨酸

D: 精氨酸

答案: C

79. 西地那非引起的不良反应有

A: 低血糖

B: 嗜睡乏力

C: 视觉异常

D: 出血

答案: C

80. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的抗菌药是

A: 甲硝唑

B: 苯唑西林

C: 喹诺酮类

D: 四环素

答案: C

81. 具有中枢和外周抗多巴胺双重作用的是

A: 莫沙必利

B: 西沙必利

C: 多潘立酮

D: 甲氧氯普胺

答案: D

82. 不易发生耐药株，是目前治疗原虫和厌氧菌的重要药物是

A: 多黏菌素

B: 克林霉素

C: 呋喃妥因

D: 甲硝唑

答案: D

83. 代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂的药物是

A: 阿昔洛韦

B: 阿糖腺苷

C: 奥司他韦

D: 干扰素

答案: C

84. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

A: 环丙沙星

B: 灰黄霉素

C: 克霉唑

D: 咪康唑

答案: A

85. 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是

A: 泼尼松片 30mgq

B: 泼尼松片 50mgqD

C: 地塞米松片 10mgqD

D: 泼尼松片 20mgqD

答案: B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/658065116045007022>