## 精神病学课后练习题

- 1. 精神疾病的概念
- A. 受精神创伤后的情绪悲观
- B. 精神疾病等同于心理疾病
- C. 精神疾病实际上是思想病
- D. 未达到个人目的的内心矛盾
- E. 以精神活动失调为主要就表现的疾病(正确答案)
- 2. 幻觉的定义是
- A. 对客观事物的正确认识
- B. 对客观事物的正确感受
- C. 客观刺激时的思维过程
- D. 缺乏相应的客观刺激时的感知体验(正确答案)
- E. 客观刺激作用于感觉器官的感知体验
- 3. 关于妄想,下列说法正确的是
- A. 可被说服的不现实想法
- B. 在智力缺损时出现的离奇想法
- C. 在意识障碍时出现的杂乱思维
- D. 在意识中占主导地位的正确观念
- E. 在意识清晰的情况下的病理性歪曲信念(正确答案)
- 4. 患者感到地球上各种客体都比原来小,这属于
- A. 幻觉
- B. 幻想
- C. 妄想
- D. 猜测
- E. 知觉综合障碍(正确答案)
- 5. 焦虑是一种具有紧张、恐惧的感情,常伴有

- A. 幻觉
- B. 意识模糊
- C. 疑病妄想
- D. 幻想
- □. 自主神经反应(正确答案)
- 6. 精神分裂症最常见的幻觉是
- A. 运动幻觉
- B. 触幻觉
- C. 视幻觉
- D. 言语性听幻觉(正确答案)
- E. 嗅幻觉
- 7. 幻觉是
- A. 一种真实的知觉体验
- B. 一种在幻梦中的感觉
- C. 对客观事正确的知觉
- D. 客观事物留下的印象
- E. 没有客观事物作用于感官时(正确答案)
- 8. 思维形式障碍不包括
- A. 失语
- B. 失读
- C. 失认
- D. 思维中断 (正确答案)
- E. 思维化声
- 9. 关于谵妄病人的说法,正确的是

配不会产生被害妄想

- B. 主要是意识范围障碍(正确答案)
- C. 不会有自伤
- □不会伤人

- □. 不会有冲动行为
- 10. 下列症状对精神分裂症的诊断最有意义的是
- A. 被害妄想
- B. 嫉妒妄想
- C. 被控制感 (正确答案)
- □夸大妄想
- E. 罪恶妄想
- 11. 急性脑病综合征的临床表现中,下列描述错误的是
- A. 近事遗忘(正确答案)
- B. 恐怖性幻觉
- 。. 不会出现遗忘、幻觉
- D. 情绪紊乱非常突出
- E. 时间及地点定向障碍
- 12. 关于遗忘综合征,说法准确的是
- A. 意识障碍
- B. 智能障碍
- C. 计算力障碍
- D. 时间及地点定向障碍(正确答案)
- E. 恐怖性幻觉
- 13. 阿尔茨海默病最常见的妄想是
- A. 嫉妒妄想
- B. 关系妄想
- C. 被害妄想(正确答案)
- D. 被窃妄想
- E·夸大妄想
- 14. 以下疾病最常见出现智能障碍的是
- A. 焦虑症
- B. 抑郁发作

- C. 睡眠障碍
- D. 强迫症
- E. 脑器质性精神障碍(正确答案)
- 15. 患者男, 25岁, 某天引用一两白酒之后出现意识不清, 怀疑同行者欲加害于他, 言语行为狂暴, 随后将同行者打伤, 数分钟后进入酣睡, 醒后不能回忆。 幼年时受过脑外伤。该患者最可能的诊断是
  - A. 病理性醉酒 (正确答案)
  - B. 遗忘综合征
  - C. 妄想
  - D. 脑外伤所致精神障碍
  - E. 焦虑症
  - 16. 物质的滥用中的耐受性是指(中
  - A. 机体产生的一种心理上的适应性改变
  - B. 明知有害仍持续使用精神活性物质
  - C. 物质使用者停止使用也能达到原先的效果
  - D. 物质使用者减少剂量也能达到原先的效果
  - E. 物质使用者必须增加剂量方能达到原先的效果(正确答案)
  - 17. 精神分裂症的阳性症状不包括
  - A. 幻听
  - B. 妄想
  - C. 思维破裂
  - D. 失语(正确答案)
  - E. 紧张性木僵
  - 18. 不属于精神分裂症常见症状是
  - A. 阳性症状
  - B. 冲动行为
  - C. 偏瘫 (正确答案)

D. 阴性症状

- E. 情感症状
- 19. 病人表现为不言、不动、不食,面部表情固定,对外界刺激缺乏反应,肢体可随意摆动,诊断为何种症状
  - A. 幻觉
  - B. 痴呆
  - C. 焦虑
  - D. 抑郁
  - E. 情绪低落(正确答案)
  - 20. 精神分裂症单纯型与神经衰弱的鉴别要点是
  - A. 有无自知力(正确答案)
  - B. 病程是否迁延
  - C. 起病有无精神因素
  - D. 有无工作学习能力的下降
  - E. 有无神经衰弱综合征的表现
  - 21. 言语性的听幻觉最常见于
  - A. 癔症
  - B躁狂症
  - C. 强迫症
  - D. 抑郁症
  - E. 精神分裂症(正确答案)
- 22. 患者, 男, 18岁, 近一年对家人变得冷淡, 不去上学, 不洗澡, 不主动更换衣服, 对与自己有关的事情表现得无动于衷。最可能的诊断是
  - A. 强迫症
  - B. 恐怖症
  - C. 焦虑症
  - D. 精神分裂症(正确答案)

E. 创伤后应激障碍

- 23. 患者, 女, 53岁。近1年来怕脏,不倒垃圾,不上公共厕所,在街上遇到垃圾车也害怕、回避,反复洗手,自己知道不应该,但是不能控制,感到苦恼而就诊。该患者的主要症状是
  - A. 抑郁症状
  - B. 焦虑症状
  - 。. 躁狂症状
  - D. 强迫症状(正确答案)
  - E. 癔症
  - 24. 分离 (转换) 性障碍的主要治疗方法是
  - 配心理治疗(正确答案)
  - B. 不需治疗
  - C. 体育锻炼
  - D. 休息治疗
  - E. 电休克治疗
  - 25. 焦虑症不应出现下述哪一条症状
  - A. 焦虑
  - B. 紧张
  - C. 恐惧
  - D. 幻听(正确答案)
  - E. 植物神经系统症状
  - 26. 下列药物最常用于焦虑症的治疗是
  - A. 奥卡西平
  - B. 苯妥因钠
  - C. 地西泮 (正确答案)
  - D. 五氟利多
  - E. 卡马西平
  - 27. 下列哪项是神经症的特点是

## A. 智力发育障碍

- C. 强烈的自残行为
- D. 强烈的自杀意念并有自杀行为
- E. 患者对自己的病有相当的自知力(正确答案)
- 28. 男性 20岁,半年来情绪高涨,自觉思维敏捷,讲话增多,富有感染力,精力旺盛,爱管闲事,做事有头无尾,举止轻浮,睡眠减少,体重下降,体检T3T生常。

## 该病人主要表现为

- 入.躁狂
- B. 幻觉幻想
- C. 明显的思维联想松散
- D. 协调性精神运动性兴奋(正确答案)
- E. 不协调性精神运动性兴奋
- 29. 其精神症状不包括
- A. 情绪高涨
- B. 思维奔逸
- C. 语言增多
- D. 活动增多
- E. 罪恶妄想(正确答案)
- 30. 若无禁忌症, 该病人治疗首选药物是
- A. 碳酸锂 (正确答案)
- B. 地西泮
- C. 氯丙嗪
- D. 奥卡西平
- E. 卡马西平
- 31. 关于病理性象征性思维,下列哪项是正确的是
- A. 不属于思维形式障碍

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/66500001403">https://d.book118.com/66500001403</a>
<a href="https://d.book1332">0011332</a>